



29,8418/2 54975
IOANNIS HVXAMI
MEDICINAE DOCTORIS, REGIAE SOCIETATIS
LONDINENSIS ET COLLEGII REGII MEDICORVM
EDIMBURGENSIS SOCIJ


OPERA
PHYSICO-MEDICA
TOMVS PRIMVS

CVRANTE
GEORGIO CHRISTIANO REICHEL
PHILOS. ET MEDIC. DOCTORE AC FACVLT
MEDIC. LIPS. ASSESSORE



LIPSIAE
IMPENSIS IO. PAVL KRAVS
BIBLIOPOL. VINDEBONENS
C1D1DCCLXIIII

JOHN H. HANLEY
PHYSICIAN
OF THE
PHYSIC-MEDICAL
TOMAS PRIMVS



LIBRARY
IMPRINTS TO PUBLISHED
AND
TO PUBLISHED

SERENISSIMO
PRINCIPI ELECTORI
DOMINO
D O M I N O
FRIDERICO AVGVSTO

DVCI SAXONIAE, IVLIACI, CLIVIAE
MONTIVM, ANGARIAE ET WESTPHALIAE, SACRI
ROMANI IMPERII ARCHIMARESCHALLO ET ELECTORI
LANDGRAVIO THVRINGIAE, MARCHIONI MISNIAE
ET LVSATIAE, BVRGGRAVIO MAGDEBVRGENSI
PRINCIPALIS DIGNITATIS COMITI HENNEBERGAE
ITEM MARCAE, RAVENSBERGAE, BARBY ATQVE
HANOVIAE COMITI, RAVENSTEINII
DYNASTAE, CAETERA

DOMINO MEO CLEMENTISSIMO
S A C R V M

SEVERISSIMO

PRINCIPIS ELECTORI

DOMINO

D O M I N O

FRIDERICO AUGUSTO

DUCI SAXONIAE, IVLIACI, CLIVIAE

MONTIVM, ANSARIAE ET WITTMALIAE, SACRI

ROMANAE IMPERII ARCHICAMERARII ET ELECTORI

THURINGiae, MARCHIONI MISNIAE

ET LYSATIAE, EVANGELICO MAGDEBURGENSI

PRINCIPALIS SEDIVITATIS COMITI HENNERBERGAE

ITEM MARCAE, RAVENSBURGAE, BARRY ATQUE

HAUPTLAGE COMITI, RAVENSTERNI

DYKSTADT, CASTRA

DOMINO MEIO CLEMENTISSIMO

S A C R V M

SERENISSIME PRINCEPS

ELECTOR

DOMINE CLEMENTISSIME



uae TVVM ad pulvinar de-
ferre sustineo opera physico-
medica, eorum ipse auctor fi-
duciam mihi aliquam inspirat.

Anglus est, vir tum doctrina et modestia, tum
meritis etiam erga Principes non minus, quam
in reliquum genus humanum dignus visus, qui
in TVAM aulam, DOMINE, deduce-
retur. Quamvis enim non imperandi consilia,
verum valetudinis curandae restituendaeque tra-

didit sanitatis praecepta, ad rerum tamen
publicarum salutem augendam multa omnino con-
tulit. Quid enim statum imperii magis firmat?
quid propius ad felicitatem eius tuendam perti-
net, quam cura salutis publicae et sanitatis ci-
uium incorruptae? Cuius quidem rei idoneam
prae caeteris rationem Huxhamus inter Anglos
ostendisse videtur, utpote qui non aëris et tem-
pestatum solum mutationes attente obseruauit, et
varios inde prouenientes morbos artemque illis
medendi curate descripsit, sed in reliquis etiam
libris, quae maxima viri virtus existimatur,
auertendorum morborum methodum eorumque
vim publice infringendi demonstrauit. Quae,
etsi potissimum populo Anglicano proposita, quia
sunt salubria uniuersa et facile in cuiusuis uti-
litatem populi conuertenda, ut notiora ciuibus
TVIS, DOMINE, et ad usum paratio-
ra redderentur SERENISSIMI TVI
NOMINIS inscriptione, summo et ad glo-
riam consequendam aptissimo ornamento putauì
efficiendum esse. Neque vero quod de medicinae
disciplinis et rebus naturalibus disputatur, ideo
minus dignus est liber, qui magno Principi offe-
ratur, nisi forte contemni abs TE opinemur
eos, qui istis rebus scrutandis et scientiae suae ad
salutem hominum transferendae maximam rei fa-
miliaris et haud raro vitae suae partem impen-
dunt.

dunt. Quod ut quisquam putare queat, tantum
abest, ut in TE potius omnes, SERENIS-
SIME PRINCEPS ELECTOR
incredibilem demiremur amorem ac studium lit-
terarum, quibus TE pateris erudiri duce ex-
cellentissimo Victore, atque in spem patriae sic
felicissime adolescis. Huic praeterea libro satis
commendationis est apud TE, CLEMEN-
TISSIME DOMINE, publicatum es-
se civium TVORVM gratia, quorum
salus TIBI non minus, quam SERE-
NISSIMAE MATRI TVAE et
REGIAE STIRPIS PATRVO,
ditionum TVARVM SAPIENTIS-
SIMO ADMINISTRATORI, in
eam indulgentissime excubantibus, curae cordique
est. Quae cum ita sint, accipies, SERENIS-
SIME PRINCEPS ELECTOR,
illo vultu, quo vincula liberis soles iniicere ani-
mis, quicquid hoc in opere meum est, tanquam
specimen exile laborum, quibus in hac TVA
litteraria uniuersitate civium TVORVM
studia adiuuare cupio. Quorum cum una omni-
um salus in TVA, DOMINE, CLE-
MENTISSIMAEque SAXONVM
MATRIS, ac SERENISSIMI
PRINCIPIS REGII PATRVI
TVI, XAVERII manu atque incolumi-

*tate posita sit, uniuersae autem REGIAE
DOMVS flore ac perpetuitate certissime ful-
ciatur, TVAM TVORVMque salutem
vnice in votis habemus, VESTRAEque fe-
licitatis constantiam rogamus Deum optimum
sempiternum. Sic vero meae patriae, sic artibus
atque litteris honor et praesidium nunquam dee-
rit, TVAque sub tutela meam ego vitam tran-
quille ac felicissime transigam*

*SERENISSIME PRINCEPS
ELECTOR
DOMINE CLEMENTISSIME
CELSITVDINI TVAE*

*Lipsiae
Idibus Maiis
CIC MDCLXIII.*

devotus

GEORG. CHRIST. REICHEL.



LECTORI BENEVOLO ET AEQVO

S. D

GEORGE CHRISTIAN. REICHEL



Offero Tibi, LECTOR BENEVOLE, virum natione Anglum, auctorem praestantissimum, naturae indagatorem sagacissimum, medicum sapientissimum prudentissimumque, HVXHAMVM. Quis enim est, qui vel a limine, quod aiunt, hanc artem nostram salutauerit, quem magnum illud HVXHAM I nomen fugiat? Quamquam vero huius nomen fere neminem latet, eius tamen scripta apud populares edita paucorum Germanorum in manibus versantur et rebus ibidem occurrentibus iisque eximiis carendum est plurimis. Quorum praestantiam si Tibi velim commendare, idem

P R A E F A T I O.

fecero, quod qui hederam vino suspendunt generoso et bono. Ne autem omni omnino testimonii laude destitutum et veluti indotatum hunc scriptorem emittam, audias velim, quid in commentationibus Societatis Regiae Anglicanae philosophicis * de observationibus ipsius de aëre et morbis epidemicis iudicatum sit, vbi THOMAS STACK M. D. et Soc. Reg. Socius ita de iis pronunciat, vt hunc de morbis epidemicis librum omnium recentiorum eiusdem argumenti optimum esse censeat; et paulo post, vbi totius operationem methodumque, qua hae observationes propositae fuerunt, declarauerat, his omnibus, inquit, (loquitur autem de HUGH-HAMO) morbos grassantes vel potius epidemicos, methodumque illis medendi subiungit, et simul egregias medicas observationes, tam theoreticas quam practicas de rebus nouis vel minus frequentibus affert. Quemadmodum vero eius praestantiam et scientiae copiam non potest non admirari ac magni facere, quicumque eius scripta cognouit,

* An. 1738. Num. 451. p. 429. seq.

P R A E F A T I O.

uit, ita in primis H V X H A M V M nemo non aestimat, nisi qui ignorat, quanta cum solertia quantaque industria eius observationes de aëre et morbis epidemicis factae et compositae sint, quantoque cum iudicii acumine et quam exquisita artis notitia reliqua sua monumenta conscripserit atque ex plurimis eruditae antiquitatis scriptoribus, in primis HIPPOCRATE, CELSO, ARETAEO aliisque collegerit variisque exemplis illustrauerit. Ita enim egit, vt non solus sibi scaperet, sed aliorum quoque illorumque optimorum in arte salutari virorum sententias et commemorandas et ad trutinam rationis et experientiae exigendas arbitraretur, semper hac vsus modestia, vt, licet vbique non tam scriptorum auctoritatem, quam generis humani salutem ob oculos haberet, nullius tamen merita deprimeret et vituperaret, multo magis extolleret ea atque laudaret. Cum quoque huic diligenti rerum naturalium indagatori in oppido *Plymuthi*, ad littora alti Oceani sito medicinam exercenti, plura morborum genera occurrerent rariora, ea non egregie solum descripsit, sed et methodum

P R A E F A T I O.

dum illis medendi accuratius tradidit. De quibus omnibus plura proferrem, nisi Te, LECTOR BENEVOLE, haec ab ipso HVXHAMO, quam a me discere malletm. Eadem vero inprimis fuere, quae me impellerent, vt praestantissimi huius scriptoris libellos non ubique obuios colligerem atque coniunctim ederem; praesertim cum KRAVSIVS bibliopola Viennae clarus, vir honestus et senex quoque iuuandae rei literariae cupidus, me adiret peteretque, vt omnia HVXHAMI scripta collecta digererem, vt ipse aliquando in lucem edere posset.

Verum plura occurrebant obstacula, quam ab initio existimaueram. Cum enim plurima eius scripta diuersis voluminibus distracta, diuersisque temporibus edita, haud pauca quoque Societatis Regiae Anglicanae commentationibus philosophicis inserta essent, omnia illa prius colligenda et describenda erant, in quo haud parum molestiae nobis deuorandum fuit. Accedebat alia difficultas, eaque haud scio, an maior, quae ab ipsius linguae, de qua multa pensa conuertenda

P R A E F A T I O.

uertenda nobis erant, indole atque ingenio proficisceretur. Etenim partim verba occurrebant, Anglicae linguae, ut fit, ita propria et peculiaria, ut latinitatis usus vix admittere ea videretur, partim tota orationis forma erat eiusmodi, ut, antequam ad ipsum laborem accederemus, familiari quasi consuetudine cognoscenda et penitus imbibenda esset.

Ordo, quem in describendo hoc opusculo secuti sumus, hic est. Observationes de aëre et morbis epidemicis praemisimus, his subieciimus librum de febribus, quem tandem opuscula varia, partim seorsim edita, partim in commentationibus philosophicis dispersa et hic collecta excipiunt. Hic vero locus est, ut non minus favorem singularem Viri Magnifici D. D. LUDWIGII, Patroni maxime colendi, laudibus iustis extollam et gratias ei pro benevolentia ista eximia agam, qua, ut ex eius Bibliotheca locupletissima commentationes modo commemoratae in usus meos cederent, liberaliter indulgit; quam ut a LECTORE BENEVOLO magnopere

P R A E F A T I O.

gnopere petam, vt, si ipsi plura, quam hoc opusculum complectitur, H V X H A M I scripta nota sint, ea vel nobis indicet, vel quod ad gratum animum eo efficacius erit, nobiscum communicet.

Atque vtinam ab aliis erroribus haud maiori cum difficultate cauere nobis potuissimus, quorum tamen veniam, speramus fore, vt eo facilius impetremus, cum et ipsi volentes nostroque consilio neminem laedere, errorem suum exprobrare nemini, neque in aliorum merita inuehere conati sumus. Praeter ea vero idonei harum rerum arbitri eo aequius nobiscum agent, quod per totius operis decursum tanta negotiorum et multitudine et varietate fuimus perturbati, vt non vna serie et iusto otio hanc telam pertexere potuerimus, sed saepius filum abrumperere et intermissum laborem repetere fuerimus coacti.



OBSER-

OBSERVATIONES
DE AERE
ET
MORBIS EPIDEMICIS
AB ANNO MDCCXXVIII
AD FINEM
ANNI MDCCXXXVII
PLYMOUTH FACTAE

- - τοῖσι δ' αὖ θνητοῖσιν ἔστος αἴτιος (ὁ Ἄρης, sc.)
τῆτε βίη, καὶ τῶν νοσέων τοῖτι νοσέσσι.

HIPPOCRAT. *de Flatibus.*

- - *Nisi persuadere nobis volunt, sanis quidem con-
siderandum esse, quod cælum, quod tempus anni sit;
aegris vero non esse.*

CELSVS *in præfat. ad libr. I.*



PROLEGOMENA.



OMNIUM animantium vitæ nihil æque necessarium est ac ipse aër communis, quo sine ne vel per paucula momenta protrahenda est. Cum vero maximas is variasque subeat mutationes, harum notatio & historia non potest non esse medicis summopere utilis: quod optimus ille quidem, artisque nostræ vetustissimus magister, Hippocrates, nobis præcepit, atque præclaro commendavit exemplo; quippe qui, in genuinis epidemiorum libris, aëris constitutionem morbos vulgares antecedentem accurate præscripsit. Idque jure sanè merito: causæ namque morborum fere omnium epidemicorum sunt constitutiones atmosphæræ depravatæ; etiam ipsorum, qui proprie contagiosi vocantur, incrementum & duratio ex eadem causa maxime pendent. Nonne enim uno anno, in hac urbe, aut hoc oppido, unum tantum, alterumve, variolis nempe, aut morbillis, correptum videmus, alio autem, ab uno incipientem, labem in innumeros disseminatam? Ita ut aër ipse arcere, aut fovere videatur ipsum contagium: Ignis veluti scintilla, fomiti injecta idoneo, immensum quantum flammæ accendit undique! humidæ contra occurrens materiei extinguitur protinus.

Quid sit quidem τὸ Θεῖον istud Hippocratis veterumque medicorum, pro causa morborum pestilentium acceptum, haud probe scio. Si velint vero, nonnullis ut placet, peculiare aliquid ab irato numine rebelli inflictum populo, in vindictam violatæ legis, id utique precibus humillimis, facta certe, non ficta, pœnitentia averendum est: quandoquidem vix ullus medicinæ locus, aut spes sit ulla.

Sed hoc mittamus, utpote paulo abstrusius, & videamus breviter certos & manifestos aëris effectus in corpora nostra; unde, quam necessaria sit medico *atmosphææræ* consideratio & observatio, facile patebit.

Primo igitur respiratio, in qua quasi vita ipsa consistit, ope aëris perficitur omnino: vesiculas nempe pulmonis dilatando vias facit patulas toti circulanti sanguini, qui hic maximam subit mutationem. Factus enim lentus nimis & crassus ob tardum admodum per venas majores motum, *chylō* etiam crudo refectus, e dextro cordis ventriculo minus aptus *circulationi* & corporis nutritioni expellitur. At per innumerales minimasque pulmonis *arteriolas*, reticulari plexu vesiculas pulmonares texentes, distributus omnigenam ibi patitur compressionem; partim ab inspirato aëre, a renitente sanguine partim, & ab ipsa partim vasculorum contractione; iisque omni momento variè agentibus; ita ut in pulmonibus misceatur omni modo & conquassetur sanguis, atque *moleculæ* ejus crassiores inde comminuantur maxime. Hic etiam præcipue globuli sanguinis rubri componi videntur e sex (uti per microscopium patet) minoribus, sive *serosis*, more quo globulum argenti vivi majorem e minoribus formamus: quod
ipsum

i

psum quoque vim quandam quasi & compressio-
nem postulat. Ibi porro recentis *chyli* particulæ
conteruntur, ita ut globosæ tandem fiant, ac ani-
malem induant naturam: quæ omnia ulterius
perficiuntur actione expirationis, pulmone
nempe se corrugante, atque costis collabentibus
presso.

Adeo ut hoc viscus præcipuum *sanguificatio-
nis* organum æstimari debeat: non mirum ideo
fi, qui infirmitate pulmonum laborant, *câche-
ctici* fiant & hydropici, nec si, qui corruptum
inspirant aërem, morbidi.

Comminutio hæc & attritus, ac ipsius *chyli*
sanguificatio (sit venia verbo) in pulmonibus sunt
omnino necessaria ad usus naturæ, cum ad nu-
tritionem, tum ad motum musculorum; quia
neutrum horum perfici videmus ab ullo sangui-
ne, nisi postquam pulmones tranaverit: hoc
enim notandum est ab *arteriis coronariis* ad ulti-
mos usque ramos *aortæ*: ad hunc finem animal-
cula quædam spiracula habent pulmonalia a ca-
pite ad Caudam usque.

Secundo. Aer non solum ab *effluviis* noxiis
purus esse debet, sed & justæ insuper gravitatis
& *elasticitatis*, ut pulmones distendat satis; nec
tamen enormis, ne eos opprimat. Utcunque
enim gravem valde, vel levem, *atmosphæram*
commode satis ferant robustiores; montesve in-
colant, imasve valles integri: non ita tamen in-
firmi, quibus harum rerum paulo curiosior de-
betur æstimatio. In medicina utique facienda
vides & quibus boreas, *mercurium* in *barometro*
attollens, officit maxime; vides & quos, cum
mercurio, deprimit humidus auster. Sed de his
infra; hic solum obiter notans altiores habita-
tiones illis eligendas esse, his humiliores, cætera

A 3 si paria

si paria sint: pro ratione enim situs, aëris incumbentis columna magis, minusve, producitur; adeoque pressura ejus magis, minusve, intenditur: hinc aliqui prope mare melius se habent, alii locis in montanis.

Tertio. Aer etiam Respirationi idoneus non nimis calidus esse debet, nec ultra modum frigidus: est enim aëris inspirati temperare sanguinis calorem, qui aliter fervendo putresceret cito, ut patet ab experimento præcellentissimi Boerhaavii in hypocaufto capto (vide Chem. capit. de igne experim. xx. corollar. 16.) Si aër enim fit magis, aut æque calidus ac sanguis alicujus animalis, intra pauxillum tempus moriatur necesse est.

Nec solum sanguinem refrigerat aër, sed, ne nimium ebulliendo vasa perrumpat, impedit, eum nempe condensando. Atque hoc utique permagni est momenti, si cum doctissimo * Helvetio supponimus dextri cordis ventriculi capacitatem majorem esse cavitate sinistri, eamque pariter arteriarum *pulmonicarum* multo excedere istam venarum respondentium: nam consequitur inde, quod sanguis debeat ab aëre inspirato esse valde densatus, ut æqualis cruoris quantitas æquali eodemque tempore recipi possit a venis *pulmonalibus* & ventriculo cordis sinistro; pulsus scilicet corde dextro per capaciores pulmonis arterias. — Hoc quidem plurimi negant contrarium omnino statuentes. Est tamen necesse prorsus, ut aorta ex ventriculo cordis sinistro tantum recipiat sanguinis, quantum e ventriculo dextro per arteriam pulmoneam pellitur, idque æquali eodemque tempore: fatale aliter diluvium

* Vide *Eclaircissmens concernant la maniere dont l'Air agit sur le Sang dans les Poulmons.* Paris, 4to, 1728.

vium pulmones obrueret brevi; quoniam utriusque ventriculi systole est synchronica. Aortam ideo & arteriam pulmonarem invenimus semper diametro quam proxime æquales, modo sint in statu naturali. Ob hanc igitur causam ventriculorum quoque capacitates debent esse æquales, ut eodem etiam & æquali temporis spatio æquas possint recipere sanguinis quantitates. Eadem perinde ratio necessaria videtur inter arterias & venas pulmonares (quod enim protrudunt arteriæ, transmittunt venæ). Nulla saltem datur necessitas, cur hæ venæ factæ sint arteriis capaciores: nam aer ipse communis, quatenus sanguine frigidior multo, eique per omnem intimumque pulmonem inspiratione applicatus, non potest non sanguinem condensare: tantum utique, ut reprimere sufficiat nimiam ejus effervescentiam; cui quidem propter magnam cruoris agitationem, ac proinde calorem, alias foret obnoxius valde. Hinc asthmatici auram quam frigidam haurire coguntur, urgente paroxysmo: (ubi nempe sanguis nimis in pulmonibus turgescit) ne protinus accederet suffocatio. Sic qui febre ardente laborant, qui cursu, aut luctatione valida, perturbant humores, longe frequentius solito respirant: ut frigido novoque aëre, creberrime attracto, ebullientem sanguinem refrigerent satis, eumque debitos intra cancellos coerceant.

Vis adeo inspirati aëris tantum condensare sanguinem in pulmone debet, quantum vehemens ibidem particularum attritus, ac massularum comminutio, istum expandit: nimiam aliter in molem assurgeret rarefactus sanguis; quod idem est fere, ac si redundaret ipsa quantitas. At cum ventriculus cordis sinister par solum est

dextro, qui capere potest auctam hanc molem? Si non, quæ inde ruinæ?

Quod ratio suadet, fida docet cadaverum inspectio, ubi vasa cordis & pulmonis, sicut descripsi, inveniuntur, si sanis in animalibus, recentissime demortuis, quærentur. Inique vero admodum, diu post mortem comparantur venæ & arteriæ ejus congruæ diametri; huic enim ob structuram longe magis *elasticam* inest contrahendi vis maxima, illi autem longe minor; hinc arteriæ sanguinis, saltem *serosi*, vacuæ fere inveniuntur & constrictæ; imo si siphone, injecta nempe cera, replentur utræque, arteriæ multo magis quam venæ resistunt, nec ideo æqualem admittunt distensionem. Idem de ventriculis cordis dicendum est, quandoquidem sinister crassior multo est, adeoque longe fortior dextro.

Ex iis jam, quæ supra dicta sunt, liquet satis, quam utile sit, ægris, præcipue febricitantibus, auram frigidiusculam, fervente potissimum æstate, subministrare. Vidi ego multoties anxietates & languores *febriles* momento fere depulso, fenestris tantum apertis, quibus imprudens nutricula spiritibus (uti dicitur) *volatilibus* perperam omnino mederi satagit; imo tunc adeo non juvant *cardiaca* calidiora, ut etiam maxime noceant; longe melius enim inspiratione auræ frigidæ, & missione nonnunquam sanguinis, abiguntur: quia ortum habent sæpissime a congestione & nimia sanguinis rarefactione in pulmonibus. Oportet vero ut aer, pectori saluber, non sit nimium frigidus. Josephus d'Acosta refert, aërem ita frigidum esse altissimum quendam super montem peruvianum, ut uno solum flamine sanguinem sæpe in pulmone congelet.

Imo

Imo hyberna frigora Europæ, in plagis potissimum borealibus, *pulmonias* exitiales inferunt sæpissime; quin etiam aliquando, non tantum pulmones, sed & artus etiam ipsi, ex frigoris vehementia, gangræna corripuntur. Peregrinantibus igitur per frigidam valde *atmosphæram* opportunum est maxime, liquores tepidos eorumque vapores sorbere frequenter; ad debitam nimirum laxitatem vasorum *pulmonalium* & sanguinis fluorem conservandum: haud utique auram gelidiorem impune respirant jejuni, diras inde profecto novi peripneumonias.

Hæc hætenus de aeris potentia in pulmone; jam quæ sit in totum corpus, paucis videamus.

Primo itaque consideremus ærem, quatenus grave quoddam fluidum in nos perpetuo incumbens, haud minore quidem pondere hominem mediocris staturæ premens quam librarum 32000, immane quantum pondus! quod ex nobis quicquid est liquoris exprimeret, ni pressura foret æqualis undique, ni ex æquo resisterent inclusi humores. Hoc autem sapientissimus nostrum omniumque conditor, DEUS, nobis fecit salutare maxime; nam & totam corporis compagem confirmat, & humores ejus coercet; imo vel hac ipsa pressura (ut ego sane sentio) haud parum promovet ipsius sanguinis circuitum: siquidem totum corpus ab incumbente *atmosphæra* comprimitur assidue, totus ideo ejusdem cruor per venas versus cor urgeatur necesse est, quum non possit, per arterias, cor petere retrorsum propter obstantes valvulas. Tam parum utique motus originalis a corde accepti, in venis majoribus, sanguini restat, ut vix cor adusque ab imis pedibus, ni ad æquilibrium tantum perficiendum, ascenderet; (per venas nimirum

cum arteriis continuatas, quasi per siphonem inversum, cujus crura æqualis sint altitudinis) ita tardus sane ibi est sanguinis progressus, ut in venis artuum valvulæ frequentes occurrant, ad onus nempe incumbentis sanguinis excipendum, ne forte relaberetur. Haud ergo ex se solo polleret (ut mihi videtur) vim propriam constringentem cordis superare, ne dicam irruere in ejus ventriculum, eumque dilatare.

Sanguinis ideo momentum adjuvat assidua *atmosphærae* pressura, more velut *antagonistæ* agens contra vim cordis insitam & valide constringentem, quod plus, minusve, omni *sphincteri* musculo proprium est. Cum primum enim, ope inspirationis, explicatus pulmo locum dat expellendo e corde sanguini; facto nempe in ductibus pulmonum sanguineis momentaneo quasi vacuo, continuo in cor dextrum impellit sanguinis, quantum facile capit pondus *atmosphærae*, totum corporis habitum comprimens semper. Eodem porro ipso momento irruens, undique premeus, & *elasticus* aer haud exiguum addit impetum rapidissimis, per pulmonem currentibus, sanguinis rivulis, ejusque momentum tantum adauget, ut vel vim cordis sinistri subigere possit: longe enim * longeque velocius currit sanguis per pulmones, quam per *aortæ* ramulos.

At de his fatis; cum non sit hujus opusculi accuratam circumacti sanguinis historiam perscribere: hoc solum hic obiter denotare volebam, compressionem *atmosphærae* esse unam ex multis, eamque haud contemnendam causam circuitus sanguinis, quantumque immoderata gravitas aeris aut levitas, accelerare sanguinem, aut retardare, potest.

Quum

* Vide Hales's *Hæmstatics*, *Experim.* x.

Quum vero ab historia *barometri* clarissime pateat, quod *atmosphærae* pondus uno tempore majus est quam alio, ratione fere $\frac{1}{10}$ totius columnæ *baroscopicae*; non potest non esse quin tanta differentia nos, sub ea versantes, afficiat maxime: quandoquidem haud minoris est ista quam pondo librarum 3200, cujus dimidium sane, vel perpauca intra horas, sentimus sæpissime. Supra vero monstratum est, pondus *atmosphærae* multum conferre ad *circulationem* sanguinis promovendam: major ergo ejusdem gravitas motum cruoris auget, minor autem minuit. Hinc fit, quod, dum cælum ficcum sit atque serenum; id est, quando debita gravitate & *elasticitate* præditus sit aër, alacres nos vegetosque percipimus: aucta namque sanguinis velocitate, cæteris paribus, secretiones nostræ naturales & *evacuationes* augentur, præcipue *perspiratio* (ut dicitur) *santoriana*, quam, modo sit ordinata probe, consequitur corporis & animi vigor. Major porro in corpora nostra pressura vasa sanguinea coarctat per totum habitum corporis externum, quod effectum idem est, ac si sanguinis ipsius quantitas fuerit adaucta: nam non solum motos humores incitat, sed & etiam quo magis premittur habitus exterior, eo plus sanguinis ad interiores & maxime vitales corporis partes adigitur, unde fortior evadit earum actio. Ideo non solum in pulmone melius lentescentem subigit sanguinem crudumque *chylum* purus & *elasticus* aër, sed per totum quoque *Systema* vasorum. Verum enimvero si permagna gravitas aëris & *elasticitas* longo perdurat tempore, morbos producit ab aucto nimium sanguinis motu; cujusmodi sunt pleuritides, peripneumoniæ, anginae, febres ardentes, atque id genus alia: idque potissimum

tiffimum accedentibus aliis aëris qualitatibus, frigoris scilicet, aut caloris; ut videbimus infra.

Secundo; contra omnino contrarias corporis affectiones infert aër debitæ gravitatis & *elasticitatis* expers: nam sequitur inde tardior sanguinis *circulatio*, diminutæ secretiones, impedita *perspiratio*, lentorque tandem nimius humorum. Hinc ille corporis & animi languor, quo fere afficimur omnes, dum talis adest *atmosphærae* constitutio; quæ porro, persistens usque, ista omnia auget indies: imo vel ipsa mala, causæ originali succedentia, se mutuo promovent assidue: demumque his omnibus accedunt affectus *hysterici* & *hypochondriaci*, febres intermittentes, remittentes, putridæ, lentæ, *nervosæ*, *petechiales*; morbi denique omnes a nimio lentore sanguinis & segni ejus circuitu pendentes.

Quoniam vero omnes *atmosphærae* effectus, qui a gravitate ejus, aut levitate, oriuntur, vim plurimam ab ipsius secundariis qualitatibus, frigore puta, aut calore, humiditate, aut siccitate accipiunt; pauca quoque de his dicenda sunt.

I. De aëre frigido & sicco.

Omnia, quæ saltem attingit, corporis vasa frigus coarctat: idem iste annulus, quem æstate vix digito induis, hyeme frigida excutitur facillime: supputa jam a contractione parvulæ istius partis, quantum patiatur totum. Vasa autem contracta longe fortius vibrant in contenta fluida, quam si sint relaxa; a frigore nempe fibrarum *elasticitas* augetur, adeoque major contractio vasorum & humores magis atterit, & eorum simul accelerat motum: nam ut sunt vasorum capacitates inter se, per quæ eadem cruoris quantitas, eodem temporis spatio, fluere debet; sic sunt quoque

que, inversa ratione, liquidi istius velocitates; diminuta adeo capacitate velocitas augetur.

Quod vero sanguinem attenuat, ejusque velocitatem adauget, Secretiones fluidiores & excretiones debitas promoveat necesse est, unde functiones omnes animales evadunt validiores. Quoniam vero hæc eadem facit gravis & *elasticus* aër, cui frequentissime quoque adjuncta est & frigiditas *atmosphærae*, & siccitas, unita vi effectus edunt majores; adeo ut, dum conspirant una, sæpe demum subsequatur vis vitæ, quam vel par est, fortior; quæ tandem proinde suis & ipsa viribus ruit. Tam validus enim solida inter & fluida oritur attritus, tam rapidus sanguinis cursus; corrugata insuper a frigore cute, tanta dissipatio humidissimi, crassissimi autem retentio, donec fit cruor aëris valde & maxime viscosus: dumque in vasa urgetur inepta morbos omnigenos *inflammatorii* generis parit. Idque præsertim, cum immodica *atmosphærae* siccitas nec moderantem fibræ, nimium rigidis, fœtum præbet, nec sanguini diluentis humiditatis satis, quæ, dum suppetit, per cutis *poros* attrahitur assidue.

Quod tamen quibusdam nocumento est maximum, plurimis inservit maxime, dumque hos febres acutæ, *pleuriticæ*, *peripneumonice*, alios graves asthmatis, *rheumatismi*, aut arthritidis, paroxyismi corripunt; illos, firmosque fere omnes, alacres magis sanosque reddit aër ponderosus, frigidus, ac ficcus: nec incitat aliquid magis grave Belgarum vulgus quam rigidum, diuque durans gelu; tunc temporis enim vel cum lepidissimis Gallis festivitate concertant. Hoc olim notavit Celsus senex, aphorism. 17. sect. 3. quem sic vertit Cornel. Celsus: „aquilo sanum corpus „spiffat, & mobilius atque expeditius reddit.”

2. De aëre frigido & humido; qui nobis quidem officit multum, quatenus frigus ejus corporis *poros* constringit, eosdemque humiditas occludit; horum alterutrum *perspirationem* impedit plurimum: etiam ipsa corpora *electrica* in aëre humido longe parcius, quam in sicco, *effluvia* emittunt. Quam noxia sint madida frigidaque indusia, & lodices, nemo non norit.

Imbrica porro & pluvia tempestas gravitatem *atmosphærae* minuit, humor ejus nimius vim fibrarum enervat; utraque impetum sanguinis impediunt, ac debitas proinde secretiones & excretiones. Hinc gignitur serosa colluvies, destillationes inde sequuntur & tumores faucium, tussis & anginae, aliaque multa. denique, si talis tempestas manet diu, febres *catarrhales*, intermittentes, putridæ, lentæ, *nervosæ*, ingruunt; ni per cutim (quod optimum) aut urinam, aut per alvum, exterminentur tempestive retenti humores: priusquam scilicet putrescere incipiunt.

Nec more solum descripto nocet algida udæque aëris temperies, sed & ipsa gelida humiditas in ipsum corpus attrahitur. Vel ipse medicinae parens, Hippocrates, hanc corporis imbibentem facultatem, bis mille abhinc annis asseruit; dum scilicet ὅλον τὸ σῶμα non solum ἐκπνοον sed & εἰσπνοον, esse pronunciavit: quæ verba ipse Galenus de aëris ingressu per cutis *poros* interpretatur. Id vero abunde experimenta probant, neque enim alia patet via argenti vivi, aut terbinthinæ particulis in sanguinem, nisi per ipsos cutis *poros*; modo sint illitæ solum, aut vel sub forma vaporis allecæ. Hoc idem satis superque confirmant tentamina acutissimi Jacobi Keilei nostri; quinimo humoris gelidi absorptionem,

summa

summa cum probabilitate, posuit pro causa frequentissima istius corporis invaletudinis, quæ vulgo *susceptum frigus* nominatur: ipsis nimirum particulis frigorificis (si placet nitro-aëreis) una cum humore absorptis, quæ sanguinem lymphamque vitiant.

An vero datur revera principium aliquod frigorificum, sal nempe nitro-aëreus, ut a Mayow vocatur, sive ullo alio vocabulo id nominabis, eximios inter philosophos dubitatur: causam nempe omnis frigoris ponentes in privatione solum motus & caloris. Hæc tamen sententia haud mihi hercle prorsus arridet: nam posce modo, num in calore aliquid magis positivum est quam in frigore? nonne utriusque æque subitanea & æque certa sensatio est? quod forsan non adeo est explicatu facile a sola motus cessatione: nec ex mera privatione, aut relatione, positivi fluunt effectus, at e frigore plurimi: corporum quorundam expansio, quorundam condensatio, permanens mutatio & sexcenta alia. Aqua, dum congelatur, expanditur, argumentum sane materiei alicujus ab extra receptæ; aliter enim a sola caloris & motus absentia condensaretur: Sicut metalla, quæ fusa quidem dilatantur, rigescentia vero, minus occupant spatium.

Porro aqua, ex gelu resoluta, longe frigidior est, quam quæ prius congelata non fuerat, restatque diu ad plurimos usus inepta, ad quos ante congelationem idonea fuisset; hoc vel mulierculæ notant. Imo, qui gelu resolutum perpotant, sunt pluribus morbis obnoxii; ideo poeta — *Quis tumidum guttur miratur in Alpibus?* Parum utique video, cur aquæ congelatio obmeram motus privationem efficeretur, si cum
sum.

summis philosophis, particulas suas constituentes *sphaericas* esse statuimus; quod maxime videtur probabile, quia nullus excitatur calor utcunque vehementer agitetur aqua: minima enim intervenit frictio (causa nempe caloris) motas inter *sphaerulas*. Nam sequitur hinc plane, seu in motu, seu in quiete, quod in punctis solum se mutuo contingere possunt; unde ne major quidem ob quietem cohæsiō: quæ tamen infinite major est in gelu, quam in aqua. Porro autem aqua in vacuo difficillime, si unquam, congelatur; ubi tamen satis certe quietis: at ipsissima ista aqua, ad contactum gelidi æris effusa, dicto citius, etiam inter effundendum, in glaciem abit; notante diligentissimo viro, Fahrenheit. Act. Philosoph. Anglic. No. 382: requiritur ideo ab aëre aliquid ad congelationem efficiendam.

Magis adeo probanda videtur eorum opinio, qui congelationis causam arbitrantur *spiculas* esse quasdam frigorigicas, ab extra admissas: quæ, utcunque globulos aqueos a se invicem dimoveant paululum, quantitatem tamen contactus hos inter & illas adaugent, & proinde mutuam eorum cohærentiam. Ni ex hac forsan *hypothesi*, vix alia datur methodus, insignem istam aquæ expansionem, dum congelatur, explicandi: quæ vero aquæ gelatæ expansio evenit semper, siue aëris fuerit expers, siue non.

Quoniam vero congelatio omnis artificiosa, sale quodam mediante, perficitur, haud absurdum est credere, *spiculas* has frigorigicas salinæ esse naturæ.

Quod vero datur salinum aliquod principium, per universam *atmosphæram* disseminatum, vero simile est admodum a vitrioli generatione in ipso

ipſo colcothare, utcunque ſale fit deſtillatione, aut ullo alio modo, privatum. * Nitrum porro de novo producitur, ex ipſa terra damnata, ex ipſis infulſiſſimis cineribus, modo hæc inter & apricum aërem libera detur communicatio. Unde oritur nitrum, ut dicitur, calcarium, niſi ab hoc ſale aereo? Nonne ferrum, etiam ſuper altiffimas turres, ferruginem contrahit? quod ab eodem omnino evenit principio. Plurima item mineralia, & glebæ metallicæ, priſtinam recipiunt naturam; licet vi ignis omni fuiſſent orbata ſale, ex ipſo nimirum fonte. Sal hoc univerſum agnoſcit illuſtriſſimus Newton; utique ex analyſi chemica clariffimi Hombergii ſolus videtur & idem parens & origo omnigeni ſalis; prout ſcilicet fit hac vel illa matrice receptum, huic vel illi materiæ coadunatum.

Atqui non prorſus alienum eſt credere, hoc ſal nitroſæ eſſe proſapiæ, dum obſervamus & nitri aciculas, & ſpiculas glaciales, imo ſalinas ipſius roris particulas, forma eſſe ſimillimas. Quinetiam ſi reputamus, quæ referuntur a digniſſimis fide ** viris, de Armenia, Tartaria, China, &c. terris nimirum nitro quam maxime abundantibus; quod ibi ſcilicet, quamvis æſtate ſol interdiu omnia quaſi adurit, noctu tamen ſævitur rigidum gelu: magna adeo copia decidente ſale nitroſo, quem ſolis ardor elevaverat. In noſtra etiam regione, poſt diem calidiorem, verno præſertim tempore, obſervamus ſæpe mane ſequente ſtagna, camposque omnes, glacie, ac pruina, obductos: quod quidem vel ipſa æſtate

* Vid. *Frid. Hoffman. Hiſtoriam, &c. Nitri.*

** *Tournefort, Voyage du Levant, Lettr. 18. Le Comte Itinerar. Chinenſ.*

æstate contingeret, nisi vis solis, tunc temporis vehemens, particulas nitrofas, hic non æque ac in Oriente abundantes, diffringeret & proinde dissiparet. Hæc sane arguere videntur, quod abundantia nitri aërei plus faciat ad congelationem efficiendam, quam sola paucitas ignis: media enim hyeme, cum *thermometrum* longe majus denotet frigus, nusquam sæpe apparet vel minima glacies. Gradus utique frigoris, quo glacies producitur, minime quidem stabilis & certus est; glaciem namque sæpe notavi mense Martio, aut Aprili, cum spiritus thermometri Hauksbeiani fuerit ad 55 tantum: e contra nullam omnino mense Decembri, cum descenderit usque ad 65. Sed de his satis.

3. Itaque de calore aëris, eique accedente humiditate. Calor omnia, vel ipsum ferrum, expandit, multo magis ideo humores corporis humani eiusque vasa; sanguinis autem rarefactio, & vasorum relaxatio, de momento circulantium humorum detrahit: secretiones hinc deficient & vires; hac ergo de causa non æque sumus agiles æstate, ac hyeme, aut tempore verno. Qui torridas habitant regiones, vix sunt, nisi noctu, ad munera vitæ obeunda habiles, tota fere die dormiunt, præcipue ardente sole.

At si æstuosa simul sit atmosphæra & humida nimis, sanitate periclitamur admodum. Est calidi, est etiam & humidi, laxare fibras; quid conjuncta? eas fere omnino resolvunt. Imo quandoquidem uda aeris temperies plerumque etiam levitate peccat, quod, ut vidimus supra, vim circulantem minuit multum, & quoniam humidus aër *perspirationem* insuper inhibet valde, merito prorsus, ab ultima antiquitate, talis *atmosphæra* constitutio reputata fuit pestilens.

Obstructi

Obstructi adeo humores fiunt indies magis magisque acres, ob defectum motus idonei lymphæ lentescit, cruor fere in grumos facessit, ejusque sales, se mutuo attrahendo, in noxias abeunt *moleculas*, brevique putrescunt humores. Morbi proinde quamplurimi oriuntur, & acuti, & *chronici*, cum durat diu gravis adeo & infelix cœli constitutio; in qua, brevis sit utcunque mora, vel validissimus homo, vim corporis & animi languidiorem fieri, cito persentit. Aër enim vaporibus, præsertim sulphureis (ut experimenta nobilis Boylei & acutissimi Halesii monstrant) onustus plurimum *elasticitatis* suæ protinus amittit; adeo ut vix explicandi pulmones vim retineat: unde paulo ante, & cum fulgura vibrantur, haud pauci spiritum difficulter admodum trahunt; *atmosphæra* tunc nempe vaporibus sulphureis æstuante. Hac porro de causâ imbecilliores quamplurimi, ne vel per diem unum, alterumve, sufferre queunt ingratum urbis aërem, fumis pollutum innumeris; qui tamen commode satis, imo alacrem rure degunt vitam. Ad rectam utique valetudinem tanti conducit purum & apicum respirare aërem, ut absque eo, in morbis quamplurimis, vix ulla alia medicina proficiat: quod tam sæpe notavi, ut non possim quin, cum elegantissimo poeta, clamem,

*O fortunatos nimium, sua si bona norint,
Agricolas! —*

quorum nempe & otia & negotia saluberrimis in agris peraguntur. Aura quippe rustica longe magis pura est, & *elastica*, quam quæ, infinitis urbanis sordibus contaminata, gravis admodum & insalubris evadit; æstivo præsertim tempore, cum solis ardor omnigenos excitat vapores. Est

insuper tunc frigida magis, ac halitu saluberrimo herbarum spirituque terræ vegetissima, at recreandas vires, & pulmones expandendos, sit idonea maxime: nec vero pinguibus fœdata vaporibus, vel minime, *perspirationi* officit; quin eam promovet plurimum. Tanta hinc nos perfundit alacritate purus & pergratus ruris aër, dum & respirationi, & *perspirationi*, tantopere simul inservit.

4. De aëre calido, & sicco; qui, licet constitutione modo descripta longe salubrior, tamen haud est innoxius; præcipue si diutius maneat. Aër namque ficcus magna plerumque gravitate pollet & *elasticitate*, quod motum sanguinis multum incitat: quatenus vero calidus est, humores perspirantes exhaurit maxime, unde *serosa* pars sanguinis dissipatur, & liquidissima corporis avolant: restat adeo cruor spissus nimium; nihil namque iam humidi ex *atmosphæra* torrida per cutis *poros* imbibitur. Hinc magnus sequitur & validus sanguinis attritus, ac proinde calor; qui, & ab extra item auctus indies, salinas & sulphureas humorum partes exacuit assidue, donec tandem fiunt acerrimæ: idque eo magis, quo minus jam in pulmone refrigeratur sanguis. Si suavissimum butyrum, vel quodvis oleum animale, intenso solis ardori exponis diu, brevi abit in liquamen *alcalinum* putridum & valde *corrosivum*: sic diuturnus æstatis fervor usque adeo torret humores animales, ut longe acriores sub autumnum sint, quam verno tempore. Hæc utique est adustio ista sanguinis, a veteribus toties memorata: siquidem magna hinc copia bilis acerrimæ generatur; inde cholerae, *dysenteriae*, colica biliosa, putridæ & (ut dicuntur) febres malignæ, ineunte autumno, ita sunt frequentes. Torridæ sane zonæ
vehemens

vehemens ardor usque adeo exhaurit incolarum humores, usque adeo crispat fibras, ut quasi perusti videantur. Imo ex relatione medicorum, qui fervidis in his regionibus artem exercuerunt, sanguis eorum longe magis crassus est & niger, quam in hominibus Europæis: hinc febres ardentissimæ & pestilenciales iis in locis *endemicæ* sunt, putrescentibus scilicet levissima de causa humoribus.

Magnus utique medicinæ dictator, Hippocrates, non solum morbos diversos, sed & temperamenta, imo & mores hominum, ab aëris varietate maxime pendere statuit, in pulcherrimo de aëre, aquis, &c. Libro: cum quo sane consentit omnino fide ejus interpretes, Galenus, in commentar. & alibi de temperatur. præcipue in capite *ὅτι τὰ τῆς ψυχῆς ἦδη*, &c. Hoc innuit etiam eleganter Lucretius, lib. 6.

*Nam quid Britannum cælum differre putamus,
Et quod in Ægypto si, qua mundi claudicat axis?
Quidve quod in ponto sit differre a Gadibus, atque
Usque ad nigra virum, percoctaque sæcla calore;
Quæ cum quattuor inter se diversa videmus,
Quattuor a ventis, & cæli partibus esse,
Tum color & facies hominum distare videntur
Largiter, & morbi generatim sæcla tenere.*

Horum autem paulo infra hanc reddit rationem,

— *varius concinnat id aër.*

Sin autem varia aëris diversorum climatum temperies varios omnino producit morbos, cur non & varia etiam, vel ejusdem regionis, tempestas diversos perinde gignat corporis affectus? atque ita se profecto res habet; verno nimirum tempore, si longi præcipue ac ficci venti boreales continuarint, febres *inflammatoricæ*, pleuritides,

peripneumoniæ, anginae certo certius invadunt. Autumno contra febres lentæ, putridæ, quartanæ, cholerae, dysenteriae, &c. fere sæviunt semper. Sic itidem alii prorsus oriuntur morbi sub humido tepidoque cœlo, alii autem omnino & diversi sub frigido siccoque. Observationes equidem hujusmodi perpetuæ fuerunt ab ævo Hippocratis huc usque; totam adeo superiorem doctrinam confirmare videntur. „Non quod „non omni tempestatum genere homines, per „omnia genera morborum & ægrotent, & moriantur; sed quod frequentius tamen quædam „eveniant.„ Sic latinus Hippocrates, lib. 2. præfat. — Ista dubio procul constitutio aeris est salutifera maxime, quæ, ex stabilita lege naturæ, propriæ anni tempestati respondet: ideo nec hyems tepida juvat, nec æstas pluvia.

Quoniam vero diversa atmosphæræ constitutio, diverso plane modo corpora humana afficit, ratio certe & modus hujus diversitatis semper a medicis est conspiciendus; &, quod de locorum differentia dixit Celsus, æque verum est de varietate tempestatum: „differre nempe, pro natura „locorum, genera medicinæ, & aliud opus esse „Romæ, aliud in Ægypto, aliud in Gallia.„ Hoc quidem abunde testantur medici diversarum gentium, diversis utentes methodis; quæ tamen omnes ad sanitatem ægros felicissime perducunt. Nonne ergo & ratio quoque habenda est variarum *atmosphæræ* constitutionum, vel in eadem regione? Optimus ille quidem, ac diligentissimus observator, Sydenhamius notavit; „qua methodo, currente anno, ægrotos liberaveris, eadem ipsa, anno jam vertente forsitan e medio „tolles.„ Uno proclamant ore medici, quod morbi vernaes multo felicius sanguinis missionem

nem admittant quam autumnales: & hinc illæ forsan Sydenhamii lacrymæ, qui fuit semper in venæ sectione multus admodum. Morbi sane, vel generis ejusdem (ut constanter observavi) largiorem longe poscunt sanguinis detractionem, eamque multo facilius ferunt ægroti, dum siccum adest cœlum, & elata perstat *barometri* statio, quam dum æstuosa aeris humiditas vim fere vasorum resolvit. Hoc utique perpetuum est, vel in ipsis morbis pectoris. Asclepiades olim, ut refert Cœlius Aurelianus, observavit „apud Athenas „atque urbem Romam, phlebotomia vexatos „(utor Aureliani verbis) vel peius acceptos esse „pleuriticos, in Pario vero atque Hellesponto re- „sumptos ac relevatos., Roma nimirum atque Athenæ humidiores longe & tepidiores gaudent aëre quem Hellesponti regio, sicco, ac sæpe perfrigido vento Asiatico perflata.

Robusti certe & firmi homines facile ferunt sanguinis missionem; flaccidi vero, etsi æque succidi, non ita: quia, propter debilitatem fibrarum, æquilibrium solida inter & fluida haud restituitur confestim; unde sequitur brevis quasi sanguinis stagnatio. Pondus autem *atmosphærae* magnum universum corporis habitum premit valide & corroborat, ac proinde sanguinis motum incitat. Frigus, siccitate præsertim adjuncta, vim fibrarum adauget plurimum; accedentibus adeo simul utrisque, vis vitæ fortior evadit, & vel ipse corporis habitus pro tempore velut mutatus videtur: unde, tali durante aëris *catastasi*, vel infirmiores ex facili tolerant venæ sectionem.

Non solum in morbis curandis plurimum valet *atmosphærae* consideratio, sed ad sanitatem etiam tuendam maximi est momenti. Contraria contrariis curantur, ut in adagio est: sic si ver

frigidum & siccum est, pleuritide, peripneumonia, angina, periclitamur; qui vero diæta humectante utuntur & potione tepida laxante, vitio tempestatis occurrunt, morbosque evadunt ut plurimum. Si frigori autem accedit humidum multum, *cardiaca* quædam admiscenda sunt, corpusque vestibis muniendum est probe, ne *perspiratio* inhibeat nimis. Æstuosa contra udaeque aëris temperies siccam omnino & alstringentem poscit diætam, vinum & austerum aqua frigida dilutum, denique quæ & vim fibrarum compriimentem firment, & a sanguine lentorem ac putredinem arceant. Balneum porro tunc frigidum idoneum est maxime. Quæ contra humore nimio & tepore pollent, aliena sunt prorsus; jurulenta ideo tunc vitanda sunt, & tepida muliercularum sorbitio.

Certe nullo non tempore anni morbi invadunt, autumno autem quamplurimi; nam tunc fere „meridianis temporibus calor, nocturnis atque matutinis, simulque etiam vespertinis frigus, est: corpus ergo, subinde meridianis caloribus relaxatum, subito frigore excipitur. Hæc recte Celsus, lib. 2. cap. 1. Sanctorius observavit insuper, quod ab æquinoctio autumnali ad solstitium hyemale, qualibet die, minus libra circiter perspiramus. Medicin. static. sect. 2. aphor. 41. tantopere nimirum prohibent *perspirationem* humida autumnii frigora: eoque magis tunc huic obnoxium est malo corpus, quo magis relaxata sint vascula æstivo calore, unde non satis valida propellebant contenta fluida, quæ majorem indies lentorem proinde contrahebant.

Si jam & his addamus, quantum æstatis ardor percoxerit humores, iisque majorem induxerit acrimoniam; haud mirum utique videbitur, si
autumnus

autumnus plurimos opprimat incautos: tunc enim humores sunt acriores solito, & eorum *perspiratio* impedita plurimum. — His vero *perpenfis*, methodus *prophylactica* manifesto apparet, quæ scilicet & fibras corroborare, ac debitam sanguinis fluxionem conservare potest; quibus nempe *perspiratio* pergat ordinata probe & satis constans. Interponi vero, si quid ego judico, debent *eccoprotica* quædam subinde, ad biliosam colluviem evacuandam: hoc sæpe alma molitur natura, ea nempe gravata, *diarrhæa*, cholera, seu *dysenteria*, excitatis: quibus autem tempestiva Rhei barbari dosi, repetita prudenter, occurrerit omnino, naturamque levaverit æque.

Sexcenta utique hujusmodi dicenda essent, ni prælonga forent & obvia satis lectoribus idoneis: quorum nemo jam forte dubitat, quin diligens *atmosphærae* contemplatio sit medicis perutilis admodum.

Quod ad Methodum attinet & medicinam, quas variis in morbis infra laudavi, non sunt equidem vana musei commenta; sed quæ, per multos jam annos comprobata, successerunt optime; imo (si id sit alicujus momenti) in splendidis sæpe personis: tanta scilicet remediis, mihi probe expertis, fuit fiducia.

Formulas quidem medicamentorum exhibui nullas, quod fane vix aliquid sapit præter ostentationem artis & pomposam scientiæ venditionem. Ille solum, cui natura morbi perspicitur, intelligit bene, quæ poscit remedia. Plures audivi totas blaterantes *pharmacopœias*, qui tamen ne intellexerint quidem quid vel ipse pulsus significabat. Concinnam utique ac simplicem præscribendi formulam laudo maxime, minime vero farraginem medicamentosam, ultra Garamantas

& Indos sæpe petitam, solo plerumque novitatis amore conscriptam. Longe vero, longeque magis, ridicula praxis eorum est, qui temeraria manu universalia porrigunt arcana; omnibus scilicet morbis accommodata: quasi nimirum esset in natura rerum, ut ipsissimum illud, quale demum cunque fuerit, stricto nimium, pariterque laxo, corporis habitui mederetur æque, ut rapidam æque contunderet febrem, lentumque hydropem. Sed *apage nugas! Si populus vult decipi, decipiatur.*

Hæc tu Romane caveto! — Sed Romæ Quis non? Perf.

Sequentes observationes factæ fuerunt omnino ad modum, quem præclarissimus noster JURINIUS in actis philosophicis, No. 379. descripsit; quemque jam omnes fere sequuntur, præ cæteris laudatissima societas Edenburgensis. *Barometrum* nempe ex tubo satis amplo & cisterna latissima constructum est: argentum vivum vero, quo implentur, purissimum destillatione præparaveram. *Thermometrum* idoneo situm est loco, quod fabricavit *Hauksbeius*. *Barometrum* ad mensem Julium, Anno MDCCXXXIII, supra maris infimi superficiem steterat 46 Pedes circiter; ab isto anno autem & mense, huc usque, fuit ad 30 Pedes tantum. Humiditatem aëris per varia *Hygroscoptu* notavi; præcipuum vero est ad formam D. D. Molyneux Act. Philosoph. No. 172. Infundibulo utor diametro 25 digitos lata, eoque circulari, ad pluviam excipiendam: ita vero positum est, ut æque pateat undique omni vento.

Sequens *schema* ventorum ex Plinio excerpti, ut notius foret de qua plaga cœli ventus spirabat, cum hoc, vel illo, nomine utor. Ubi vero & vis venti & directio notatur simul, literis usus sum

sum pyxidi nauticæ inscriptis vulgo, i. e. E. W. N. S. & compositis N E. N W. S E. S W. & sic deinceps.

Non sum nescius utique, quod Varro duodecim facit tractus ventorum; Vitruvius etiam viginti quatuor, illosque miris quibusdam vocibus, ut erat earum amantissimus, distinguit. Tabula vero * Plinii, seu, ut vocat, tympanum circinatum, ad generalem ventorum distinctionem facit satis; porro eorum nomina Pliniana diu fuerant civitate Romana donata.

Favorinus equidem, apud ** Aulum Gellium, discrepat a Plinio in verbis eurus, caurus five argestes, africanus five libs: eurus enim ad exortum æquinoctialem refert, Plinius vero & Seneca ad exortum hybernium, habentque auctoritatem Aristotelis, lib. 2. Μετεωρολογικ. capit. 6, qui expresse dicit εὐρος ἀπ' ἀνατολῆς χειμερινῆς πνεῖ; sic in libro Aristoteli perperam adscripto, περὶ κόσμου Capit. 4. Εὐρος δὲ ὁ ἀπὸ τῆς περὶ τὰς χειμερινῆς, &c. Dubitat porro *** Seneca, an argestes idem sit quod corus; imo Favorinus ait, quod argestes, seu corus, adversus aquilonem flat, & quod libs, five africanus, contra vulturnum: sed forte corruptus est hic Gellii locus. Nemo enim ante eorum pro vento inter meridiem & occidentem usurpavit unquam; & qui potest **** Africanus ex Africa ad Italiam spirare, nisi ex plagis australibus? idem de libe dicendum est, quod
ex

* Confer. caput. 47, lib. 2. cum capite 34. lib. 18.

** Lib. 2. capit. 22.

*** Vide Senecæ Quæstion. natural. lib. 5. cap. 16.

**** Vide Horat. Ode. 3. lib. 1.

— — nec timuit præcipitem Africum
Decertantem Aquilonibus.

ex Libya ad Græciam, unde ventus iste Δίψ dictus est. Audi iterum Aristotelem, loco supra citato de enumeratione ventorum, Ἀργέστης ἀπὸ δυσμῆς θερμῆς πνεῖ — Δίψ ἀπὸ δυσμῆς χειμερινῆς. Quid si corus a ῥ, frigus? semper enim inter ventos frigidos annumeratur. Sic Virgilius lib. 3. Georgic. v. 356.

— *Semper spirantes frigora cauri.*

Argestes itidem apud Ovidium libro 5. Fa-
storum.

Frigidus Argestes summas mulcebit aristas.

Plymuthum oppidum situm est ad ipsum finum portus amplissimi, qui longe lateque patet ventis australibus. Ex Oriente munitur & Occidente altissimis clivis, ad imum vero clauditur rupibus marmoreis: porro utroque eius a latere æstuarium longe porrigitur. Surgunt a tergo montes continui ad ipsas usque alpes Damnonienses, decimum circa lapidem distantes. — Oppidi situm ideo descripsi, ut magis forsan (inter cætera) pateret ratio tantæ pluviae, quæ hic ruit quotannis. — Ab alto nimirum Oceano, vaporibus nubibusque latissimus, duo inter promontoria excelsa, aditus panditur; quæ arduis proinde clivis utrinque coacta, ad intimum adiguntur finum, ubi scopulis montibusque impingentia condensantur, tandemque sub forma pluviae decidunt. — Neque hic jam memoro, quod huic haud parum adjicit articulo, hanc oram nempe Britanniae, in modum quasi isthmi, duo inter maria longe porrectam.

Eo quidem lubentius historiam *meteorologicam* sequentem edidi, quo magis utiliore eam fore judicavi: quandoquidem nihil hujusce modi, quan-

emper enim inter
Sic Virgilius lib. 3.

cauri.

um libro 5. Fa-

cevit aristas.

st ad ipsum finum
teque patet ventis
tur & Occidente
clauditur rupibus
us a latere æstua-
t a tergo montes
nnonienses, de-
—— Oppidi
forfan (inter cæ-
e, quæ hic ruit
Oceano, vaporibus
inter promonto-
e arduis proinde
num adiguntur
ue impingentia
orma pluviae de-
ro, quod huic
nc oram nempe
mi, duo inter

n meteorologicam
orem eam fore
hujusce modi,
quan-

quantum memini, in hac occidua parte Britanniae inceptum fuit antehac unquam. Atqui ex ipsa argumenti natura latinis ego potius literis, quam vernaculis, sequentia descripsi: quibus siquidem gens nostra cum exteris observationes suas communicare potest, illi pariter cum nobis vicissim. In hæc sane palæstra jam plurimi, ubique fere gentium, versantur: utinam tandem aliquando ex plurimis, diu continuatis, & toto pene terrarum orbe captis experimentis extaret demum generalis aliqua & perfecta *atmosphærae* historia! opus certe utilissimum, diu multumque desideratum! hunc ergo obolum in aerarium publicum conjicio, in quo quidem exarando diligentiae plurimum insumpsi, licet elegantiae parum, quippe medicum ago, non rhetorem.

*Non nobis licet esse tam disertis,
Qui musas colimus severiores.*

MARTIAL.



NOTÆ

NOTÆ sequentes, quæ in opere passim occurrunt, sic explicandæ sunt.

AB i. e. Lumen Boreale; viz. mense Martio, 1728, sic habes: *AB* 22. 10. P. M. W N W 1; ita porro legendum: lumen erat Boreale die 22^o Martii, hora noctis decima, vento W N W leniter spirante.

— Ad diei alicujus pluvii numerum superscripta significat isto die haud exiguum decidisse pluviam.

— multam;

— graviolem corruisse pluviam.

— gravissimam.

Ubi dierum numeri linea conjunguntur, viz. 12—16, significatur aliquam pluviam omni die, a 12 ad 16, decidisse.

x ad Caput figuræ, venti vim denotantis, indicat ventum istius ordinis fortem; ad Imum vero, lenem; adeo ut 4^x vehementem denotet procellam.

Per omnia stylo utor *Juliano*, five vetere.

Observationes factæ fuerunt bis die plerumque, scilicet hora fere octava matutina & sexta pomeridiana.

Literæ Romanæ, (A.) (B.) (C.) &c. ad notationes referunt.



OBSERVATIONES

DE

AERE ET MORBIS EPIDEMICIS.



ANNO MDCCXXVII, retorridæ æstati (majore quam antehac unquam erucarum numero infestæ) successit hyems pluvia fatis, nec intempesta valde, ni quod interfuit ficcus admodum mensis Novemb. crasso tamen valde nubiloque cœlo fœdatus. *Mercurius* interim in *barometro* ad stationem præaltam effectus est. Venti orientales plerumque, aut aquilonares, afflabant, haud vero insequiebatur tempestivum gelu. Delabente *barometro*, Decembris initio, quamplurima decidit pluvia, paulo post autem resurgente gelu rigidum invasit, a die decimo octavo scilicet ad vigesimum secundum: pluvia inde ad finem usque.

Morbilli, qui toto mense Julio Sextilique evanuerant, medio Septembri recurrebant, pluresque adoriebantur indies; malique admodum fuere moris Octobri & Novembri. Pari cum his passu progressa tussis *convulsiva* quamplurimos invasit pueros, donec uterque morbus caput subduxit mense Decembri. Porro durante Octobri & Novembri

vembri * febris lenta *nervosa* haud paucos corripuit; tussisque vehemens in omnes fere (A) equos grassata est, quæ ad finem usque Decembris perduravit, e qua tandem pars major evasit.

Ad hunc adeo modum definebat annus MDCCXXVII, cujus exeuntis historiam ergo attingi leviter, ut, siqua forsan per conjecturas liceret, sequentium morborum causas rimaremur: neque enim, *epidemicorum* naturam investigando, solum interfit cognoscere quales dies sint, sed & (B) quales etiam præcesserint ante; ut cum Celso loquar, libro secundo, capit. 1.

Totam pluvix quantitatem, quæ decidit hoc anno, sic habeto.

	Dig. Dec.		Dig. Dec.
Januario,	2.965	Februario,	4.452
Martio,	1.868	Aprili,	1.511
Majo,	5.902	Junio,	2.483
Julio,	1.080	Augusto,	0.209
Septembri,	3.867	Octobri,	2.490
Novembri,	0.826	Decembri,	4.172
			Dig. Dec.
		Summa quantitas,	31.915.

Breves quædam Notationes.

(A) In obsidione Trojana, primo canes, mox muli, post homines, peste correpti fuerunt. Haud semel observavi morbum inter pecora erupisse primo, dein eum ipsum paulo post tempore in homines *epidemice* sæviisse; quod & anno MDCCXXVIII, & MDCCXXXIII, fuit manifestissimum:

* Vid. *infra* Dissertat. de hac febre, pag. 147.

stiffimum: in quibus nempe tussis gravissima omnes pene equos corripuit uno, alterove, mense citius quam homines.

Quum nimirum hoc animantium genus maxime sub dio versetur, morbosæ aëris *diathesi* sit valde obnoxium necesse est, non tantum aërem inquinatum respirando, eumque per cutis *poros* imbibendo forsitan; sed, dum aquas hauriunt, & carpunt gramen, condensatam quasi sub specie roris *atmosphæram*, morbidis particulis contaminatam, exugunt: nam ut Lucretius libro VI.

*Aut in aquas cadit, aut fruges persidit in ipsas,
Pestilitas.*

Inde est fortasse, quod morbi huiusmodi *epidemic*i longe frequentius inter rusticos & paganos oriuntur, quam incolas inter urbium & oppidorum; in his quippe locis ignes perpetui, frequentia hominum, atque id genus alia, gravem noxiumque aërem mutant maxime, aut omnino depellunt: donec ita tandem sit onustus morbosa materia, ut, rupto quasi aggere, torrentis ad instar, irruat ubique. Hoc hisce sit argumento, quod, qui intra domicilia luculenta versabantur assidue, rarius *epidémico* anni MDCCXXXVIII & MDCCXXXIII, correpti fuerunt.

(B) Constat utique a primo autumno *atmosphæram* fuisse crassam admodum, & vaporibus plurimis onustam, quos ardor vehemens prægressæ tempestatis elevaverat: qui, licet hic ita condensati fuerint, ut, sæpe sub forma pluviae, durante Septembri & Octobri, deciderent, atque ita nostrum non inquinarent aërem; in aliis tamen locis & September & October fuere crassissimo aëre fœdati, & menses proinde insaluberrimi. Per Novembrem certe, aër, etiam hic,

fuit crassus admodum & gravissimus, omnigena nempe fuligine e retorrída tellure exhalata obscuratus: atque ab hac causa tanti fuit ponderis, non a pura sua *elasticitate* & gravitate propria, quæ vapores evehunt altius, eosque dispergunt æquabiliter.

Qui præsentem *atmosphæaræ* faciem, dum morborum *epidemicorum* causas disquirunt, intuentur solum, nec respiciunt elapsam, parum utique vident, aut eorum causas, aut naturam. Exemplo sit aëris constitutio sicca & frigida, quæ, non tantum uno, vel & altero, die durans, nimiam fibrarum rigiditatem generat, & morbidam humorum densitatem, nisi & per dies aliquot continuos duraverit. Rarissime vides graves & pestilentes febres fieri valde *epidemicas*, si non post eximiam aliquam *atmosphæaræ* qualitatem, diu persistentem.

Per constitutiones aëris mutabiles, fibras forte nimium corrugat hodie ficcus frigidusque Boreas, cras eas forte relaxat nimis humidus Austër: ita quoddam quasi æquilibrium, in quo sanitas consistit, servatur; atque id maxime profecto, si quis probe cavet subitas has mutationes. Haud raro hercle notavi, post procellas gravesque pluvias, febres *epidemicas* multum fuisse imminutas, & vi & numero; *effluviis nempe contagiosis & morbificis atmosphæaræ conspirationibus*, hoc modo, dispersis. Ideo forte divus Augustus, cum in Gallia moraretur; templum & vocavit & fecit Circio, vento vehementissimo; eique turbini, etsi ædificia sæpe diruenti, gratias publicas agebat gens Gallica olim, referente * Seneca: utpote cui salubritatem cœli sui deberet.

DE

* *Quæstion. Natural. lib. 5. cap. 17.*

DE
CONSTITUTIONE
AERIS ET MORBIS EPIDEMICIS,
ANNO MDCCLXXVIII.

Januario.

PLUVIOsa admodum (A) humidaque tempestas induxit annum; in ipso quippe mense Januario cecidit pluvia ad dig. 6, 108. immensa quantitas! fuit porro nivis aliquantum, gelu parum valde, procellæ utique fatis. *Mercurius* in *Barometro* depressus fuit maxime, ab ipso initio diem 21. adusque, sæpe infra 29, 0. Ventus ut plurimum australis erat, vel occiduus, isque sæpe nimbosus: sub finem mensis autem Subsolanus, flante nonnumquam Borea, cœlo apricitatem & columnæ mercuriali altitudinem dedit, nive subinde, aut gelu sequente. A 26 ad 28 haud parum pluvix decidit, etsi *Baroscopium* fuit ad 30.0 & altius, Vulturno spirante: argumentum sane, aërem onustum esse vaporibus adhucdum.

	$\frac{u}{1}$	$\frac{m}{6}$	$\frac{n}{8}$	$\frac{i}{10}$	$\frac{m}{13}$	$\frac{n}{14}$	$\frac{u}{16}$	$\frac{u}{17}$
Pluvia die	1	6	8	10.	13.	14.	16.	17.
$\frac{m}{18}$	$\frac{m}{19}$	$\frac{n}{22}$		$\frac{n}{26}$	$\frac{n}{28}$			

Vehemens grando corruit 15. p. m. S S W 3.
Nix gravis 23. a. m. E N E 3.

Tota quantitas adeo aquæ pluvix collectæ æquabat 6. 108.

(B) Maximi maris æstus inundantes 18. 19.
SSE 3^x. Barom. 28. 5.

☿ ii Altitudo maxima fuit die 31, viz. 30. 2. E b N. 2. }
 — — — minima — — 18. — 28. 5. S S E. 3^x. }
 Barometri media Altitudo 29.3 $\frac{1}{3}$ $\frac{7}{8}$. }
 Dies frigidissima fuit 25 Therin. Haukf. 69. N N W 1. }
 — tepidissima — 3, — — — 50. S W 1. }
 Temperies Aëris media 56 $\frac{5}{8}$ $\frac{1}{4}$. }

Ab incipiente mense tusses & *catarrhi* fuerunt valde frequentes, sæpe cum tumore faucium molesto, levi comitante febricula plerumque: *rheumatismi* & anginæ passim. Magnus adest undique spirituum languor, & creber *paroxysmus hystericus*.

Februario.

Altam tenuit stationem *mercurius* ab initio Februarii ad diem 18, spiraverunt ut plurimum interea venti aquilonares, qui cælum reddidere ficcum & apricum, terramque adstrictam gelu, ineunte præsertim mense. Post diem 18 nix, pluvia, ventusque ut plurimum australis: temperies aëris multo magis tepida & humida fiebat, gravi pluvia sub finem ruente.

			$\frac{''}{''}$	$\frac{''}{''}$	$\frac{''}{''}$	$\frac{''}{''}$	$\frac{''}{''}$
Pluvia, die	13.	18.	20.	21.	22.	23.	25.
Dig. Dec.							

Nix multa 19 == 1.924.

Levis fuit *AB* 26. Hora 9. p. m. E b N. 1.
 ☿ Altitudo maxima 2.30.3 E N E 3. } media Altitud. hoc
 — — minima 20.29.0 W S W 2. } Mense 29.8 $\frac{9}{29}$.
 Dies frigidissima, 1, 67. NE 2. } media Altitudo Ther-
 — tepidissima, 25. 47. S 1. } mom. 57 $\frac{15}{29}$.

(C) Tusses, quæ a primo Januario fuerunt valde frequentes, jam factæ frequentissimæ, plurimis, junioribus præcipue, infestæ sunt; quibus accesserunt destillationes maximæ, ac dolores faucium atque dentium, cum glandularum parotidum & maxillarum tumoribus. Hæc fere omnia

omnia in mense superiore, at jam cum his ingruit *febrilis* affectio & respiratio difficilis, imo pluribus, medio in hoc mense accidebant pleuritides & peripneumoniæ; quorum sanguis extractus fuit viscidus & parum *serosus*: cum tamen, durante Januario, vel ab ipsis *rheumaticis*, raro fuisset valde glutinosus. Tunc porro satis fuit exhibuisse spirit. volat. oleos. elix. asthmat. le Mort. aut tale quid ex lenioribus diluentibus, ad sudores eliciendos & tussim sopiendam; raro venam secantes, nec *epispastica* frequenter admoventes. Jam sanguinem mittere sæpe necesse erat, & repetitis *anodynis* vehementiam tussis lenire; *anacatharsin* & facilem respirationem larga pectorali & molli potione detergente moliri: ad quem quoque finem opus sæpe fuit medicamentorum ex oleosis, gum. ammoniac. oxymel. scillitic. &c. cum eo tamen, ut, dum hæc facta sunt, virium languor cardiaca leniora postularet; *epispasticis* interea crebro applicatis. Febris namque fuit lenta plerumque, urina neque rubra valde erat; nec lingua valde arida, nec urgebat importuna sitis. Hoc mense porro *variolæ* erant *sporadicæ* & mites; raro lethales.

Martio.

Ventus Martio regnans fuit occidentalis, subinde ad austrum, septentrionem subinde, vergens, consequente, ut solet, pluvia, seu aprica tempestate. *Mercurius in Barometro* inconstans, raro sublimis. Nebulæ sæpe, procellæ aliquando, nivis aliquid sub finem mensis. Temperies aëris crassa & humida, attamen non valde frigida.

Pluvia 1. 3. 6. 8. ^{''}9. [']11. 13. 14. 16—18. ^{'''}19.
^{'''}20. Dig. Dec.

20. 22. 24 — 26 — 29 = 3.317.

Procellæ 14. 15 S 4. cum maximis
 maris æstibus. Nix alto mane 27.

AB 22. 10. p. m. WNW 1. Levis AB 23. 8.
 p. m. NNW 1. Maximus halo circa lunam
 11. 12.

♂ Altitud. maxim. 3. 30. 2. Malacia. } media 29.6 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{9}$.
 — — minim. 14. 29. 1. S 4.
 Dies frigid. 27. 60. NNW 3. } media Therm. Altid. 49 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{8}$.
 — tepid. 17. 45. W 2.

Tuffes frequentissimæ toto hoc mense, levi
 plerumque cum febricula. Febres *rheumaticæ* &
catarrhales quamplurimæ; ægrotantes omnes ad
 sudores erant valde prompti.

(D) Tertianæ exquisitæ, ac semitertianæ, fe-
 bres, jam sunt frequentiores longe quam affo-
 lent in hac regione: in paroxysmis urgent
 maxime vomitus biliosus, æruginosus, cum im-
 mensa pituitæ tenacis copia; *cephalalgia* gravis,
 ac sæpe delirium. Perpauci nunc *variolis* labo-
 rant; aliqui *rubeolis* corripuntur & juniores
 & adulti.

Aprili.

Principio mensis multa pluvia, cadente *mer-
 curio*; assurgente vero, medio Aprili, apricitas,
 aër interim crassus & nebulosus. A die 19 ad
 finem usque humilem plerumque stationem tenuit
Baroscopium, plurima ruente pluvia, ita ut pau-
 cissimi intercurrerent dies aprici. Aër fuit valde
 crassus, humidus & subfrigidus toto fere mense;
 sæpe ventus occidentalis, persæpe furens Auster.
 Viæ publicæ omnes aqua & limo plenæ sunt.

Pluvia

Pluvia $\overset{''}{1} - \overset{''}{3} - \overset{''}{5} \cdot \overset{''}{8} \cdot \overset{''}{9} \cdot \overset{''}{13} \cdot \overset{''}{19} \cdot \overset{''}{20} \cdot \overset{''}{21} \cdot \overset{''}{22} \cdot \overset{''}{23} \cdot$
 $\overset{''}{25} \cdot \overset{''}{26} \cdot \overset{''}{28} - \overset{''}{30} = 4.153.$
 Dig. Dec.
 Grando $\overset{''}{11} \cdot \overset{''}{12} \cdot \text{WNW } \overset{''}{1}.$

☿ Altitud. maxim. 16. 30.0. Malacia. } media 29.5 $\frac{5}{8}$.
 — — minim. 29. 28.9. S b E. 3 $\frac{x}{8}$. }
 Dies frigid. 11. 55. N W 1. } media Therm. Altit. 45 $\frac{13}{30}$.
 — tepid. 18. 36. S S W 1. }

Morbi superioris mensis, jam vi & numero aucti grassantur maxime: imo febres intermittentes a levi sæpe errore in putridarum classem transfiliunt, haud contemnendo ægrotantium periculo; facillime porro recidivæ ~~corripunt~~, quos ex toto reliquerant ante.

Maior.

Aëris constitutio humida & ventus australis ad medium prope mensem duraverunt. Initio Barometer fuit depressus; a 16 Caurus, aut Septentrio, leniter spirans *mercurium* tenuit ad 29. 8. circiter fere ad finem usque: aër interim siccus erat & subtepidus.

Pluvia $\overset{''}{1} \cdot \overset{''}{2} - \overset{''}{5} \cdot \overset{''}{9} \cdot \overset{''}{10} \cdot \overset{''}{12} \cdot \overset{''}{15} \cdot \overset{''}{18} \cdot \overset{''}{20} \cdot \overset{''}{21} \cdot$
 Dig. Dec.
 = 1.633.

☿ Altitud. maxim. 21. 30.0. Malacia. } media 29 6 $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{8}$.
 — — minim. 3. 28.9. S S E 3. }
 Dies frigid. 1. 46. S b W 3. } media Therm. Altit. 35 $\frac{27}{31}$.
 — tepid. 23. 30. W N W 1. }

Febris *catarrhalis* ac tusses jam evanuerè penitus; at (E) febres intermittentes sæviunt adhuc. Vix ullæ nunc *variolæ*.

Junio.

Prior Junii pars ventos habuit australes & occidentuos, pluviamque haud exiguan; *atmosphæra* etiam plerumque crassa erat & humida: *Baroscopium* mediam fere tenuit stationem. Posterior mensis pars erat magis serena, sicca & calida; venti ab Oriente, aut plagis arctois.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{7}$. $\frac{1}{8}$. $\frac{1}{9}$. $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{12}$. $\frac{1}{17}$. $\frac{1}{20}$.
Dig. Dec.

25. 26 = 1.636.

Fulgur & tonitru, 17. 26.

☿ Altitud. maxim. 28. 29, 8. N 1. } media 29. $5\frac{17}{39}$.
— — minim. 8. 29, 2. S W b S 2. }
Dies frigida 10. 37. W N W 1. } media Therm. Altitud. $30\frac{14}{30}$.
— calida 29 23. E S E 1. }

Febres intermittentes adhuc passim; aliquæ putridæ, lentæ, *nervosæ*.

Julio.

Per initia mensis aër fuit apricus, ficcus & fervidus; ventus aut nullus, aut Subsolanus; ros plurimus: labente autem *mercurio* 9 & 10. multa pluvia, resurgente paulo post, serenitas: dein relabente magis 15 & 16. gravis pluvia: varia post tempestas ad finem usque Julii, vento plerumque ad Occidentem vergente: aër interea erat longe humidior, & ad finem valde crassus.

Pluvia $\frac{1}{9}$. $\frac{1}{10}$. $\frac{1}{15}$. $\frac{1}{16}$. $\frac{1}{17}$. $\frac{1}{18}$. $\frac{1}{20}$. $\frac{1}{25}$. $\frac{1}{26}$. $\frac{1}{28}$.
Dig. Dec.

39. = 3.179.

Die 2 hora 11. p. m. Malacia; permagnum observavi lumen boreale, cujus radii lucidi, at non colorati,

colorati, vibrantes, terminari videbantur in coruscante quasi umbella paulo ultra Zenith octo, decemve, fere gradus, meridiem versus. Centrum hujus lucidæ coronæ eodem fere intervallo distabat ab arcu meridiano, certissime ad Orientem: quod idem utique haud raro nuperis annis notavi. Durante splendore hoc boreali plurimus ros decidit; si ventus fuit aliquis, a septentrione venit.

Die 22. H. 9. p. m. N. 1. leve, at insolitum lumen boreale eluxit, cujus radii pyramidales, inverso plane ordine, vibrabant: horum enim vertex ad centrum, quasi paulo infra horizontem, sub ipso axe boreo tendebant. Die 4 & 17. W N W 1. parvæ *AB*, at nihil insoliti, Tonitru 8.

§ Altitud. maxim. 3. 29,9. Malacia. } media 29,6.
 — — minim. 16. 29,5. S W 1. }

Dies frigid. 23. 37. E. 1. } media Therm. Altitud. 28 $\frac{1}{3}$ $\frac{5}{6}$.
 — fervidus. 7. 18. E S E. 2. }

Febres tertianæ & duplices tertianæ adhuc, paucæ quoque putridæ. Languores graves a profusis sudoribus, quibus omnes infestantur maxime: laxis nempe & patulis cutis *poris* humores, a fervore tempestatis rarefactos, & colliquatos, immoderate transmittentibus.

Augusto.

Ineunte Augusto cælum fuit plerumque fudum, aër ficeus & fervidus, *Barometer* altum tenuit locum, venti septentrionales: exeunte autem aër fiebat humidior longe, & cum *mercurio* decidit pluvia; interim Zephyrus, Libs, aut Corus, perflabant assidue.

Pluvia 1. 11. 13. 17. 20 — 22. 24 — 27. 28.
Dig. Dec.

29. = 1.894.

AB. 18. 20. p. m, N N W 1. Fulgura & procella 20 nocte, S W.

Maximus maris æstus 27. S S W. 3 — 28. S W. 3^x.

☿ Altitud. maxim. 9. 30, 1. N b W 1. } media 29.62 $\frac{2}{3}$.
— — minim. 28. 29, 0. S W 3^x.

Dies frigid. 29. 38. N W 1. } media Therm. Altit, 30 $\frac{4}{3}$.
— fervid. 5. 20. W N W 1.

Febres intermittentes sub finem mensis frequentiores: *diarrhœæ* & morbi colici plurimi.

Septembri.

Corus fere spirabat quotidie ab initio Septembris ad diem 11, *Barometrum* attollens, nubesque dispergens pulcherrime. A 17 ad ipsum finem ventus ex Oriente, flectens subinde ad austrum, subinde ad septentrionem, furens, sæpe perflabat, & *mercurium* magis, quam quis crederet, deprimebat, haud multa nempe tunc decidente pluvia: interim humidus erat & frigidus aër.

Pluvia, 4. 6 — 8. 10. 16. 17. 18. 23 — 25.
Dig. Dec.

26 = 1.526.

Maximi maris æstus a 22 ad 25, perfurente Vulturno.

☿ Altitud. maxim. 10. 30, 0. N W 1. } media 29.52 $\frac{1}{3}$.
— — minim. 24. 28, 5. S E b E 3^x.

Dies frigid. 20. 46. E b N 3. } media Therm. Altitud. 38 $\frac{1}{3}$.
— tepid. 1. 27. Malacia.

Febres intermittentes passim & nonnullæ putridæ, *diarrhœæ* quamplurimæ; morbus autem colicus

colicus rarior solito hac tempestate: haud pauci *ophthalmia* & tumore colli fauciumque correpti sunt.

Octobri.

Libs fere perpetuus flavit a 2 ad 13 Octobris, *mercuria* multum cadente; pluvia interim continua decidit: post Boreas, aut Euronotus, 27 adusque, scandente *baroscopia*, & consequente apertitate; inde humidus Auster gravem perpetuamque pluviam demisit.

	$\frac{''}{2.}$	$\frac{''}{3.}$	$\frac{''}{6.}$	$\frac{''}{7.}$	$\frac{''}{8.}$	$\frac{''}{10.}$	$\frac{''}{12.}$	$\frac{''}{13.}$	$\frac{''}{20.}$	$\frac{''}{21.}$	$\frac{''}{24.}$
	Pluvia										
	Dig. Dec.										
$\frac{''}{28.}$	$\frac{''}{29.}$	$\frac{''}{30.}$	$= 5.386.$								

AB. 1. 8. p. m. N N E 1, levis *AB.* 14. 9. p. m. N E. 2 — 15, N N E. 1 — 22, E N E 1.

☿	Altitud. maxim.	16. 30. 2.	N N E 1.	} media 29.5 $\frac{4}{31}$.
	— — minim.	8. 28. 8.	S W 2.	
	Dies frigid.	16. 55.	N N E 1	} media Therm. Altitud. 46 $\frac{16}{31}$.
	— tepid.	2. 40.	S S W 2.	

Febres *Erysipelatodes* & *Petechiales* passim.

Novembri.

Pluvia adfuit perpetua, non tamen valde gravis, ad 9 diem Novembris, dum ventus ex austro plerumque fremuit maxime. Aër interea fuit humidus valde: tunc Aquilo discussit paululum nubes, flectens inde varie ventus ad occidentem, per austrum recurrebat tandem, donec orientem attigit, mutans interim assidue cœli faciem & *Barometri* stationem: post vero deflectens ad septentrionem, rigidam invexit brumam, cœlumque serenum.

Pluvia

Pluvia $\overset{''}{1.}$ $\overset{'}{2.}$ $\overset{''}{3.}$ — $\overset{''}{8.}$ $\overset{''}{9.}$ $\overset{''}{14.}$ $\overset{''}{16.}$ $\overset{'''}{18.}$ — $\overset{''}{20.}$ $\overset{''}{22.}$
 $\overset{'''}{24.}$ $\overset{'}{25.}$ = 3.535. Dig. Dec.

24. 25. = 3.535.

Procella 1. mane primo W S W — 15. Nocte. S b E — 18. H. 2. p. m. S S E. 4^x.

Levis AB. 22. Per magnus & vividus halo circa lunam 6. 10. p. m. S. 3. Maximus maris æstus 18. S S E. 4^x.

⌘ Altitud. maxim. 30. 30,2. Malacia.

— — minim. 25. 28,8. E S E 3.

Dies frigid. 30. 72. rigidissimum Gelu.

— tepid. 7. 42. S S W 3.

} media 29,5 $\frac{25}{30}$.

} media Therm. Altitud. 54 $\frac{24}{30}$.

Morbus pestilens inter boves. Coryzæ & tussés sunt valde frequentes.

Decembri.

Ab initio Decembris subsedit sensim *mercurius* in *Baroscopio*, multa ruente pluvia. Ventus fuit interim varius quotidie, aër autem maxime humidus; donec Aquilo mutavit rerum faciem, geluque rigidissimum protulit & nivem; eaque borealis ventus, aut orientalis, continuabat ad ipsum anni exitum.

Pluvia $\overset{'}{3.}$ $\overset{'''}{4.}$ $\overset{'}{5.}$ — $\overset{''}{7.}$ $\overset{'''}{8.}$ — $\overset{''}{10.}$ — $\overset{'}{12.}$ Nix 17. 18.
 $\overset{''}{21.}$ $\overset{''}{23.}$ $\overset{''}{24.}$ $\overset{''}{25.}$ = 2.273; Dig. Dec.

21. 23. 24. 25 = 2.273; Nive excepta, eam namque totam non potui ullo modo colligere, quum citò impleverit vas recipiens, ibique congelata remanserit, avolante reliqua: fuit autem ejus quantitas procul dubio haud exigua, cum alta fuisset undique sexdecim saltem digitos.

⌘ Altitud. maxim. 15. 30, 3. N 1.

— — minim. 8. 28, 8. S b W 3.

Dies frigidissimus 23. 75. N E 2.

— tepid. 7. 52. S S W. 3.

} media 29.7 $\frac{4}{31}$.

} media Therm. Altitud.

64.

Febres

Febres *rheumaticæ* passim, & paroxysmi (F) asthmatici frequentes: quamplurimæ tussis, æque sæpe graves, sub finem mensis præsertim.

Dig. Dec.

Tota, quæ decidit, pluvia hoc anno fuit 36.564.

Notationes aliquæ.

(A) Aër fuit ita humidus forte quod parum admodum gelu fuisset. Gelu certe atmosphæram reddit ficcam, condensando vapores, eosque terræ coagmentando; terra interim ipsa ita gelu contracta est, ut exhalationes impediat. Hoc in degelationibus est maxime conspicuum, ubi omne solum, quasi aqua perfusum, humescit, imo fere spumescit; data scilicet via vaporibus a calore subterraneo elevatis, at gelu ante ad terræ superficiem astrictis. Hinc est, quod gelu diu durans terram fecundet, retentis nempe salinis & sulphureis halitibus, ut agricolæ norunt: atque hinc forte post longum gelu, cum degelatio accedat, morbi *epidemic*i oriuntur, ut observatur sæpissime.

(B) Nonne hi maris æstus exundantes, partim fortasse, pendebant a maxima aëris levitate, has in regiones incumbentis, qui maria nostra longè minus premebat quam circumfusum oceanum; aquis nempe hic confluentibus ad æquilibrium restituumdum? quoniam aquam inter & argentum vivum interest differentia, quod ad pondera, 14 ad 1 quam proxime; sequitur manifeste *Barometro* in hac regione integrum digitum subsidente, aquas debere hic quatuordecim digitos altius assurgere, quam ubi, ex proportionem dicta, major est *atmosphære* pressura. — Annon porro hac ipsa

ipsa de causa forte violentissime urgente, displo-
 sis scilicet subito vaporibus, aëreque pro tempo-
 re maxime rarefacto, columnæ istæ aquarum
 (quas *Spouts* vocant) & immensi isti fluctus (quos
Boars) evehuntur nonnunquam? fulgetra nam-
 que semper fere hæc comitantur *phænomena*, quæ
 momentaneum quasi vacuum faciunt. Haud se-
 mel certe memini montem quasi aquarum (quem
 a *Boar* hic vocant) perbreve intra horæ qua-
 drantem, imo multo minore temporis spatio, in-
 undasse altitudinem perpendicularem pedum sal-
 tem duodecim, atque mox recessisse penitus:
 quod vix forte ulla alia ratione explicari potest.

(C) Humida valde frigidaque aëris intempe-
 ries semper gravedines, tusses, & morbos a *serosa*
 colluvie pendentes, gignit; idque non solum
perspirationem inhibendo, sed & insuper humidi-
 tatem noxiam, sale aëreo sive nitro gravidam,
 sanguini per ipsos cutis poros insinuando: nec
 dubito, quin ob has causas tusses Britannos no-
 stros longe magis infestent quam Gallicum, aut
 Hesperium Populum, qui sicciore gaudent &
 tepidiore *atmosphæra*. An aër ipse quidem
 corpora nostra subire potest sub aëris forma,
 dubito; per * cortices autem plantarum, imo
 arborum, penetrare certum est. Extra omne
 dubium vero aërea humiditas cutis *poros* permeat;
 nec mirum, quippe durissima ligna & saxa pene-
 trat. — Plura sane *experimenta* hanc aërei humo-
 ris attractionem confirmant; & quid quæso huic
 sit magis impedimento quam terebinthinæ, aut
 argenti vivi exhalationibus, quæ vel intimum in-
 trant corpus? ** Juvenis quidam sanus, jejunio
 & la-

* Hales's *Vegetable Statics*, cap. 5.

** Vid. *Jacob, Keil, Medicin. Static. Britan.*

& labore confectus, spatio unius noctis octodecim uncias imbibit per *poros*. Hoc, etsi non tanta quantitate, notant sæpissime, qui cursibus præfunt equestribus, ubi jejuniis ad certum pondus redigendi sunt equifones.

Tria hinc in regenda valetudine confectaria ducantur: 1. Ut jejunus nemo, nec fatigatus admodum, contagioso se committat aëri, aut febre maligna, aut pestilente, correptos invisat: pluribus, imo medicis hoc fuisse exitio memini: tunc enim ex facili *effluvia* morbida accipiunt.

2. Cavendum est maxime, ne quis diu in aëre inquinato versetur. Methodici olim, teste * Cælio Aureliano, vel cubiculi aërem medicabant: plurimum utique interest, an subfrigidam respirat auram ardente laborans febre, an æstuosam, liberam, an densam nimis; ideo, jubente ** Celso, in amplo conclavi tenendus est; si id quidem non est, eluceat modice focus, quo per caminum impura & morbida mephitis eliciatur, quæ diu aliter stagnans magis magisque in horas pestifera redditur; atqui hoc modo perflabile servetur cubiculum tutissime.

Hinc porro vides quanto discumbis periculo cum impuro lecti focio; quot tabidos, hac de causa, factos novi, sanissimos olim? quantum hinc cavenda lecti consortio? quantum hinc marcet formosa puella sicco admota feni; dum ille vigescit? Nec melior potuit inveniri modus refocillandi decrepitum Judæorum regem, David, quam consulendo, ut illum in sinu foveret perpulchra Shunamita virgo.

(D) Ex

* Lib. 2. cap. 36.

** Lib. 3. cap. 7.

(D) Ex humida valde & minus *elastica* aëris constitutione sanguinis lentor nimius produci-
tur facile; unde *circulatio* per vasa minima haud
expedita, per majora autem debito rapidior, ea-
que aucta plurimum a suscepto frigore, *perspira-
bile* subito reprimente. Unde paroxysmus sequi-
tur febriculofus; qui tamen brevi faceffit, amo-
tis nimirum repagulis, & consequente sudore,
nisi aut sanguis sit lentus valde aut viscidus: tunc
enim vel putrida ac lenta febris, vel ardens ac
vehemens, subsequitur; prout nempe fibrarum
tonus, magis minusve *elasticus*, & status humorum
disposuerit. Quamobrem monerem tyrones me-
dicos, ne nimium forent in exhibendo corticem
Peruvianum, *alexipharmaca* & *salia volatilia*, præ-
propere, in ipso præsertim initio febrium inter-
mittentium, nec nisi post debitas (prout fuerit
opus) *evacuationes*: Error namque talis haud raro
pleuritides & peripneumonias arcessit, aut febrem
cum delirio, vel comate, continuam. Febris
utique intermittens raro aliquem jugulat; si ta-
men, ex ea, facta est continua in malis æger est
(monente Celso Lib. 3. capit. 15. ad finem.)

In primis ideo accessionibus vix aliquid ægro
necesse est, nisi ut sorbeat affatim potum aliquem
diluentem, tepidum; quod & horrorem discutit,
& vomitum, si urgeat, promovet, finemque
tandem *febrili* paroxysmo facit, sudores eliciendo:
ad quod idoneum est maxime ut æger se in lectu-
lo contineat, durante Paroxysmo. Tunc de-
mum febre bene finita, ex medicamento vomat,
alvum purget denuo, aut saltem ducat, si cita
ante non fuerit; tunc enim, rhabarbaro exhibito
prius, eam comprimere licet.

Multum utique facit ad omnigenas febres ex-
tinguendas, post debitam (si sit necesse) sanguinis
missionem,

missionem, primarum viarum a putrida *cacochymia* purgatio. Neque hoc solum modo prodest vomitus, sed & ipsa ejus actio obstructions, vel in ipsis corporis penetralibus, referare apta est: ad utrumque igitur scopum eum provocare utile est; id ipsum quippe febres quasdam intermittentes sæpe sæpius curavit.

Post secundam, tertiamve accessionem, quod genus febris sit scire licet, atque exin medicinam aptare idoneam, in qua jure merito primum obtinet locum cortex Peruvianus: at nescio quo fato, utcunque seduli fuerimus in isto eligendo, ad has febres abigendas, opinione longe minus, profuit; nisi primo cinnabari, camphora, myrrha; post *stomachicis aromaticis & chalybeatis* adjutus. Tunc equidem *mercurii alkalizati* usus mihi haud innotuit, quem paulo post tamen mecum communicavit optimus ille, celeberrimusque medicus, D. D. Cheyne: hanc vero mercurii præparationem ad plurimos morbos maxime efficacem, esse millies inde inveni. Maximam profecto vim habent *mercurialia* contra sanguinis lentorem & obstructions vasorum; imo sine stimulo salino præparata non solum in febribus intermittibus esse utilissima, sed & in *pleuriticis, peripneumonicis & rheumaticis*, post debitam sanguinis missionem, plurimum prodesse novi: dum enim lentos attenuant humores, parum interim rarefaciunt sanguinem, aut exagitant, etsi pondere suo momentum ejus multum adaugent. Acutissimus IURINIUS demonstravit olim, * gravitatem globuli sanguinis rubri esse ad gravitatem feri, ut 1126 ad 1030: atqui tantæ potissimum gravitatis effecti videntur globuli, ut feri tenuitatem con-

fer-

* *Transact. Philosoph. Anglic. No. 361.*

servarent, & sanguineos tubulos præstarent meabiles; at cum magna adsit tenacitas humorum, & obstructio vasculorum pertinax, iis utique utendum est, quæ multo majore pollent momento.

Sub finem vero harum intermittentium *stomachica chalybeata* & *austero-aromatica* juvabant maxime, quæ sine tumor pedum *oetematofus* semper, & recidivæ febres accedebant sæpissime; imo cum morbus ex toto discussus fuisset, ad recidivam præcavendam commodum erat omnino, die scilicet octavo, vel decimo post, corticem peruvianum & *martiata stomachica* resumere, ad paucos saltem dies. Nonne ideo eadem hæcce, subinde assumpta, perbona sint ad *prophylaxin*, dum aër nimis humidus & parum *elasticus* sanguini lentorem inducit, & vim fibrarum enervat; idque præcipue debilioribus, ac *systasi* nervorum infirma affectis? Hæc utique methodus mihi optime cessit in *hystericis* & *hypochondriacis* sæpissime.—Hoc forsan haud absurdum erit monitum iis, qui haud prospera valetudine gaudent, aut illis, qui eorum sanitati prospiciunt. Delicatu-
lis, ac mollitiis fluentibus, haud injucundum, nec forte inefficax antidotus, erit malum auran-
tium Hispalense tostum, ex vino rubro generoso, post debitam infusionem.

Nihil sane ad febres intermittentes eradicandas facit magis, quam frequens vomitio, præcipue ubi nausea & vomitus urgent, quod in his fere accidit semper: dum namque stomachus, seu muco acido obrutus, seu biliosa colluvie, languet, quasi vas iners, fermento imbutum putrido, ingesta omnia corrumpit: hinc perpetuus morbi fomes, donec perpurgatur ventriculus.—Ad movendum autem vomitum, vel decoctum radicis Ipecacuanhæ, vel infusio ex vino,
exhibe-

exhibetur tutissime; si vis aliquid fortius, vini benedicti cochleare unum, alterumve, adjici potest. Perperam vero (quod suadent nonnulli) oleosa, aut immensa subtepidæ potione sollicitatur, quarum prior oblinat potius quam deterget ventriculum, eum altera onerat nimium: imo sæpe adeo non juvant immanes isti haustus, ut, stomachum nimio plus distendendo, vim ejus constringentem, omnemque actionem perdant omnino. Longe igitur longeque rectius promovetur vomitio modica potione tenuis infusus florum chamæmeli, sub finem vero vini rubri cum aquæ dimidio, duplo, aut triplo, prout res exigit, in quo lene aliquod aromaticum sit incoctum: Sustainet hoc quippe totius corporis vires, & naturalem ventriculi potentiam erigit plurimum, ita ut, quicquid plicis suis inhæret, exprimat, se nempe corrugando validius; adeoque tandem ventriculi tunicas corroborat, ut multo minus postea sit obnoxius illuviei nocenti. Hinc fit, quod vomitus ex vino rubro austero & aromaticis parato tantum arthriticis prodest, ubi morbus stomachum occupaverit.

* Provocabant olim Romani luxuriæ causa vomitum, quidni nos sanitatis? Quandoquidem vix aliquid subest periculi, modo descripta excitetur methodo, & post debitam, si commodum est, missionem sanguinis: nam si plus est injectum quam quod concoqui possit, periclitari ne corrumpatur nos. oportet; si jam corruptum est, nihil commodius est quam id, qua via primum expelli potest, ejicere. Haud alio utique modo expurganda est colluvies stomachi biliosa, aut pituitosa, multorum sane morborum origo & fomes:

D 2

* *Celsus*, Lib. I. cap. 3.

fomes: quicquid enim prima digestionē corrumpitur, haud quaquam emendatur in secunda concoctione, adeoque qualis efficitur *chylus*, talis fit sanguis.

Nec solum corporis vigorem conservat purus, firmusque stomachus, sed & animi etiam acumen; ideo * Carneades, academicus, scripturus adversus Stoici Zenonis libros, superiora corporis candido elleboro purgavit: perpauci sane philosophi ex Apicii schola prodire; vix aliquid certe cerebro officit magis, quam ingluvie distentus venter.

Audi ** Horatium, haud omnino Pythagoricum —

———— *Quin corpus onustum*

*Hesternis vitiis animum quoque pręgravat una,
Atque affigit humo divinę particulam aurę.*

Qui secum reputat nervi *intercostalis* & *pari vagi*, sive octavi, longas ambages, implexus, ramusculos, horumque concentum atque consensum; quorum alteruter veneno, aut acri aliquo tactus, vomitum ciet illico; qui porro spectat, actione vomitus, omnem intendi nervum, omnemque concuti fibrain; idoneus solum est iudex, quibus in morbis, quaque sub conditione, excitanda sit vomitio: in pluribus haud dubie utilis est admodum, quum & omnes corporis humores attenuet, omnesque promoveat secretiones.

(E) Haud ita multum in medendi methodo mutavi, ni quod opportunum esse invenerim medicamentis, supra laudatis, addere elixir vitrioli, & aquas Spadanas, aut Pyrmontenses, haurire quotidie. Nec pœnitendo utique eventu, tunc temporis, balneum frigidum commendavi;

* *A. Gellii*, lib. 17. cap. 15. ** *Sermon*. lib. 2. Satyr. 2.

davi; præcipue convalescentibus ab intermittente rebelli: ad fibrarum nempe tonum restituendum, & humores lentos comminuendos. Hinc didici tandem, quantum potest tale remedium, ubi vix alia proficit methodus, idque nonnunquam in pertinace quartana: novum hoc forsan & inauditum, mihi vero probe expertum.

(F) Dum Subsolanus afflat, seu Boreas, aër & elasticus valde & gravis evadit, plerumque porro frigidior; solito magis ideo distendit, premitque pulmones: quin etiam *atmosphæra* ponderosior externum corporis habitum comprimit, &, si sit frigidior, nervos fibrasque cutaneas constringit: minus hinc sanguinis *ἐἰς τὰ ἔξω, ἐἰς τὰ ἐντὸς* vero ejusdem congestio, & proinde motus rapidior. Non mirum ideo, si infirma pulmonum *crasi* laborantes talem aëris constitutionem male ferunt, vesiculis nempe pulmoneis aëre distentis nimium, vasculis sanguiferis cruore. His de causis quamplurimi, vento ad Orientem vergente, cerò certius fere asthmatis paroxysmo corripuntur. His præcipue asthmaticis convenit sanguinis missio, imo *dyspnœa* urgente maxime, necessaria est omnino; tunc lenia *antiphlogistica* purgantia, gas sulphuris, acetum & oxymel scilliticum, ex posca, mulso, aut potu tenui subacido, paroxysmum solvunt: porro pedes demittere in balneum ex aqua tepida hisce auxilio est, humores alliciendo ad partes inferiores. — Novi virginem elegantem uno, alterove, die ante menstrua, gravi spiritus difficultate corripì solitam, cui hoc certum semper subitumque attulit levamen.

Pituitosis contra, humidisque asthmaticis, vomitoria, *epispastica*, *volatilia*, purgantia, fortiora & detergentia acriora opitulantur.

DE AERE

ET

MORBIS EPIDEMICIS,

ANNO MDCCXXIX.

Januario.

INEUNTE & exeunte Januario aër fuit frigidus valde, venti aquilonares, permagna elevatio Barometri, nebulæ sæpe densissimæ, & nonnunquam foetidæ, gelu frequens & rigidum valde, Medio autem mense, subsidente mercurio, pluvia, ventusque varius, qui ab occasu vergebat plerumque ad Septentrionem. Ad finem orientales venti aërem desiccabant plurimum, quamvis fuerat ante multo humidior.

Pluvia 4. 12. 13 — 16. 19. 21. Nix 7 No-
Dig. Dec.

cte = 0.900.

AB. permagna die 6. H. II. noctis ENE. I. lucidam quasi nubem observavi, die 14. H. 9. p. m. inter Orionem, Taurum & Os Ceti, coruscantem undique radiis vibrantibus, lucidissimis, etsi ne vel minima alibi extiterunt signa luminis borealis, ista nocte.

§ Altitud. maxim, 9. 30, 4. Malacia. } media 29, 9 $\frac{30}{31}$.
— — minim. 14. 29, 1. WNW 2. }

Dies frigidissima 1. 74. ENE 1. } media Therm. Altitud.
— tepid. 19. 52. WNW 1. } 61 $\frac{1}{31}$.

Tumor faucium *anginosus*, & tusses, valde frequentes; perniones, etiam inter adultos, frequentissimi: pleuritides & febres *rheumaticæ* passim. — Prælargæ sanguinis missio *pleuriticos* juvabat

vabat maxime, potusque multus emolliens; eadem omnino methodus *rheumaticis* auxiliabatur: atroces vero artuum dolores plurimum levabant fomenta tepida laxantia, admota subinde.

Februario.

Initio Februarii *Baroscopium* indicavit 30. 2, flante Septentrione; post diem 7 ventus ab Occidente venit, flectens modo ad Austrum, mox quoque ad Arctum, pluvia cadente: a 14 ad finem usque flatus perpetui, ac sæpe vehementes, ex Oriente frigidam ficcamque *atmosphæram* fecere, surgente plurimum *mercurio*.

Pluvia 4. 7. 9. 10 — 12. Nix 5. 14. 24.
Dig. Dec.

= 1.814.

Ventus turbineus 23. 24. Fulgura 9. H. 8.
p. m. S W b S 3.

(A) Spiritus Thermometri Hauksbeiani sæpe ad 66 hoc mense subsidebat, cum tamen vix ulla uspiam visa fuerit glacies, a 17 ad præcipue.

☿ Altitud. maxima 25. 30. 3. E 3. } media 29. 7 $\frac{2}{8}$.
— — minima 10. 29. 1. W 3.

Dies frigid. 6. 71. N 1. } media Therm. Altitud. 62 $\frac{1}{8}$.
— tepid. 9. 56. S W b S 3.

Graves *rheumatismi* & *arthritidis* paroxyfmi, qui multo magis quam solito excruciant. Tussis ficcæ, laboriosæ, frequentes sunt. Sanguis, e quocunque fere detractus, est crassus valde, & perpaululum feri habet; ubi febris aliquid accessit, admodum est viscidus: Pleuritides tamen, ac peripneumonix, non æque frequentes sunt ac quis expectaverit. Multi adhuc asthmate laborant, & plurimi, imo adulti, pernionibus vexantur.

Martio.

Frequens perflavit Aquilo ad 14 usque Martii; 15 fremuit Vultur, plurima ruente pluvia; 16 & 17 Boreas furebat maxime; sub finem lenior spirabat ab Occidente ventus, cadente *mercurio*: Vehementissimus autem aderat turbo e Septentrione 24 circa meridiem. Aër fuit ficcus & frigidus.

Pluvia 1. 12. 13. 14. 15. 16. 22. 23. 24. 26.

Dig. Dec.

27. 28. 30. 31. Nix. 11 = 2.092.

Rigidum gelu 10 — 13. Ventus plerumque N E. Procellæ 16. 17. 24.

Altitud. maxim. 17. 30,2. NNE 3^x. } media 29.7 $\frac{7}{31}$.
minim. 15. 29,0. SE 3^x.

Dies frigid. 11. 66. N 1.

— tepid. 31. 49. WSW 1.

media Therm. Altitud. 54.

Gravis adhuc sævit *rheumatismus* & *arthritis*; nec cruciatus magis obstinatos memini nec *arthritidem* magis *anomalam*. Tusses *orthopnoicæ* molestissimæ, plurimos corripunt, lenta sæpe cum febre; spæta sunt maxime viscida & excreatu difficillima. His, venæ sectione peracta, portio larga, diluens, calida, detergentia dein ex oximelite scillino, Gum. Ammoniaco, Flor. Benzoes, &c. opitulantur, *epispasticis* non raro admotis. Nihil magis fuit tussi levamento, nihil tutius, elixir. asthmat. le Mortii & pilul. Mathæi. At hic notandum, quod perpetuum esse debet, ubi attenuantia & *volatilia* libere exhibentur, & *vesicatoria* iterum atque iterum applicantur, multis diluentibus utendum est: Lympha dissipatur aliter, cruor vero incrassatur nimis & acrior evadit, unde necessario inflammatio & febris augentur.

Aprili.

Aprili.

Siccus fuit & tenuis aër durante Aprili, ac sæpe frigidus, imo die 13 ipsa glacies: Ventus ab Oriente plerumque, medio quidem mense ad Septentrionem flectens, sub finem vero ad Austrum. Statio *Baroscopii* alte manebat ab 11. ad 29. Magna roratio, ac pruina nonnumquam a 13 ad 19, cælumque ferenum.

Dig. Dec.

Pluvia $\overset{iii.}{1.}$ $\overset{i.}{2.}$ 7 — 10. 25. 27 — 30. = 1.692.

AB. 11. 10. p. m. N N E. 2 — levis 21.

N W 1. Procella 9 Nocte S E. — 25. ESE.

♀ Altitud. maxim. 16. 30, 1. E N E 1. } media 29.6 $\frac{14}{30}$.

— — minim. 25. 29, 1. E S E 4. }

Dies frigid. 13. 57. Eb N 1. } media Therm. Altitud. 46 $\frac{29}{30}$.

— tepid. 29. 40. S S W 1. }

Erysipelas & pustulosa febricula frequens. *Variolæ* passim. Tempestas infesta tabidis, his præcipue, qui, elapsis mensibus, febre lenta pulmonaria correpti, ad phthisin olim fuerant proclives.

Maid.

Hujus mensis initio, labente *Barometro*, pluvia, frigidaque tempestas; die octavo, bene mane, etiam stagna glacie fuere astricta: vesperi autem ejus diei fulgura sæpe, at sine tonitru prorsus. Cælum deinceps varium, variusque ventus; a 16 ad finem usque Aquilo sæpe, Subsolanus sæpius, mercurium sustulerunt, *Atmosphæræ* porro siccitatem & apricitatem reddiderunt.

Pluvia. $\overset{iii.}{3}$ — $\overset{i.}{5}$. 6. 10. $\overset{i.}{12}$. 14. 19. 20. $\overset{i.}{24}$.

Dig. Dec.

= 1.560.

Levis AB. 6. 10. p. m. N b W 3.

D 5

♀ Al.

☿ Altitud. maxim. 8. 30,0. N W. 1. } media 29.6 $\frac{13}{31}$.
 — — minim. 5. 29,1. W S W 3. }
 Dies frigid. 8. 54. W N W 1. } media Therm. Altitud.
 — tepid. 28. 33. E b S 1. } 41 $\frac{26}{31}$.

Febres *peripneumonice* & *erysipelatosæ*. *Variolæ*,
 ac febriculæ cum *Pustulis rubeolosis* (vulgo the
Chicken-Pox) passim, tumores quoque *Pedum*
urentes, at *recedentes brevi*.

Junio.

Nulla fuit *Baroscopii* elevatio notabilis toto
 Junio: medio quidem mense statio humilis, haud
 exigua tunc ruente pluvia. A 12 ad 23 aër erat
 valde crassus, ac humidus, dum *Africus* sæpe af-
 flabat, intercurrente nonnunquam *Malacia*: Ini-
 tio autem & fine *Subsolanus*. Magna sub finem
 roratio.

Pluvia 2. 3. 7, 8. 11. 12 — 14. 16. 17.
 Dig. Dec.

22. = 1.662.

☿ Altitud. maxim. 16. 29,9. N 1. } media 29.6 $\frac{3}{30}$.
 — — minim. 13. 28,7. S 3. }
 Dies frigid. 4. 40. E 3^x. } media Therm. Altitud. 32 $\frac{16}{38}$.
 — tepid. 29. 29. E 1. }

Erysipelas & *Variolæ epidemicæ*. Febres inter-
 mittentes remittentes præcipue, lentæ, *nervosæ*,
 frequentes. *Cephalalgicæ* & *Mania* passim. *Tuf-*
ses inter pueros.

Julio.

Incipiente Julio serena satis effulsit tempestas;
 Ventus orientalis isque velox admodum; a 4 die
 ad 10, sæpe vehemens, fidente Mercurio; inde
 ad Austrum deflectens *Barometrum* usque depref-
 sit,

fit, *atmosphæra* facta nebulosa, ac humida valde: sub finem aliquanto resurgebat flante Favonio. Rara fuit apricitas post diem sextum, etsi tempestas erat æstuosa valde.

Pluvia $\overline{7. 9. 11. 16} - \overline{18. 21. 23. 24. 25.}$
Dig. Dec.

27. 28. 31. = 1.918.

Ventus turbineus & Tonitru 7. Nocte E.
Fulgura 15 nocte.

♀ Altitud. maxim. 3. 29,8. Eb N 1. } media 29,4 $\frac{2}{3}$.
— — minim. 25. 29,0. Sb E 3^x. }

Dies frigid. 8. 36. Eb N 3. } media Therm. Altitud. 28 $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{4}$.
— æstuos. 22. 22. Malacia. }

Variolæ multos invadunt. — Porro toto hoc mense febris putrida, lenta, sub finem remittens, tandemque intermittens, fuit maxime *epidemicæ* in hac regione. Caput, stomachus & lumbi laborabant potissimum, quasi ingruentibus *variolis*, magna cum oppressione pectoris, suspiriis & gravi languore: talis forte affectus nomen dedit feбри *variolosæ* * Sydenhamii. Pueri, juniores, fœminæ, infirmiores, hac febre præcipue fuere correpti. Sanguis eorum detractus raro viscidus erat; Urina cruda plerumque, ac subtenuis, cum cineritia, mucosa & imperfecta *hypostasi* sæpe, quasi ex polline farraceo (*υπόστασις κρηνώδης* Hippocratis:) quo sedimentum perfectius, eo major spes salutis effulsit. Lingua, non arida valde, glutinosa quodam & subfusco obducta fuit mucore. Sub morbi finem *diarrhœa*, aut cruenta nonnunquam *dysenteria* (præsertim si vomitus non fuerat initio arte promotus) urgebat maxime, imo

* Sect. 3. Capit. 3.

imo quibusdam erat exitio. Rubrae autem *petechiae*, pustulae *miliares*, rubrae, urentes, aut graves erumpentes sudores, morbum *sepe*issime solvebant penitus.

Venæ sectio raro, nisi morbi initio, profuit; Vomitoria vero erant pernecessaria: *epispastica* dein frequentia, & gradatim admota, lenia interea *cardiaca* cinnabar, *paregorica*, sero lactis Canariensi & potione diluta, subacida, largius epotis, fuere valde utilia. Quamprimum coctionis signa, urina nempe subsidente & remittente febre, apparebant, cortex Peruvianus juvabat apprimere. Sin autem statu morbi coma, aut delirium, accesserint, opus fuerit extemplo cucurbitulis scarificatis, humeris cervicibusque affixis, sanguinem detrahare, applicando mox *epispastica* pone utramque aurem præcipue, aut capiti derasso; injecto protinus *enemate* laxante.

Utcunque lenia purgantia, ex rhabarbaro potissimum, morbi reliquias putridas sub finem expurgabant percommode; *Drastica* tamen, aut *aloetica*, pestiferos omnino habuerunt effectus: quorum nempe usu intempestivo vim magnam sanguinis dejectam vidimus, & horrenda excitata tormina: imo post *catharsin*, etsi valde lenem, haustus *paregoricus* erat omnino necessarius.

Quamplurimi hoc morbo correpti fuerunt, pauci vero periire.

Augusto.

Parum utique pluviae durante Augusto; Initio quidem & sub finem aliqua decidit, tunc quoque e madido Noto crassus influxit & valde humidus aër. A 10° ad 24 fervida ac aprica tempestas, Subsolano plerumque afflante placide.

Haud

Haud insignis erat elevatio, aut depressio *Barometri* hoc mense.

Pluvia 1. 3. 5. ¹6. 9. 24. ¹¹26. 27. ¹29. 31.
 Dig. Dec.
 = 1.002.

Magna sæpe roratio mense medio. Tonitru
 e longinquo ab Occidente 20. 23.

☿	Altitud. maxima	16. 29,9.	E b N 1.	} media 29.6.
—	— minima	6. 29,2.	W N W 2.	
Dies	frigid.	8. 37.	N N W 1.	} media Therm. Altitud. 28 ⁸ / ₃₀ .
—	fervid.	23. 18.	Malacia.	

Febris *epidémica* perdurat adhuc: medio autem
 mense pustulæ rubræ, *miliares*, longe erant fre-
 quentiores quam mense proxime elapso. *Vario-*
læ mali admodum moris sæviunt. Scabies jam
 plurimos infestat, eos præcipue, qui ab *epidémica*
 febre convaluerant.

Septembri.

Hoc mense ruebant vapores, quos fervor
 æstatis excitaverat, in pluvias nempe graves et
 perpetuas resoluti; aër interim erat maxime cras-
 sus ac humidus: rara apricitas; *Barometer* demis-
 sus valde, Vulturnus fere assidue a secundo die
 ad decimum sextum, isque non raro vehemens;
 exin ad finem usque Libs furens sæpe.

Pluvia ¹¹¹1. ¹4. ¹¹¹6. ¹¹¹12. 15. ¹¹¹16 — ¹¹¹19. ¹¹¹21.
 Dig. Dec.
¹22. ¹¹¹23. — — — ¹¹¹30. = 6.498.

Procella 8. Nocte. S E b S — 21. S S W.
 — 22. W S W. Turbo 10. E b N. AB. 12.
 E b S.

☿ Altitud.

♂ Altitud. maxim. 3. 29,5. E b N 1. } media 29,2 $\frac{1}{4}$.
 — — minim. 16. 28,7. S S E 3.
 Dies frigid. 23. 42. W S W 2. } media Therm. Altitud. 32 $\frac{1}{4}$.
 — tepid. 1. 28. W 1.

Variolæ adhuc malignæ grassantur maxime cum maculis purpureis, sæpe etiam nigris, interspersis: Statu morbi pustulæ nigrescunt, aut crudo diffluunt *ichore*. Crustæ nigrae diu admodum, etiam convalescentibus, adhærescunt: *Crisis* in *confluentibus* difficillima, nec febris sæpe finis est nisi post 17, sæpe non nisi post 21, diem; Vermibus persæpe ex alvo dejectis. — (B) Febris *epidémica* etiamnum perdurat, rarius autem.

Octobri.

Initio pluvia, tunc apricitas, surgente *Mercurio*; derepente autem cecidit: a 15 ad 24 pluvia perpetua. Vento subinde ex plagis australibus furente: a 24 tamen ad ipsum finem inter Boream & Vulturum constitit, parca cadente pluvia.

Pluvia 1 — 5. 6. 9. 11. 12. 15. 16 —
 Dig. Dec.
 19. 20. 22. 23. — 26. 31. = 3.985.

Procella 11 Nocte. S W — gravis cum fulgure & tonitru 19 Nocte. S S W — mane E S E. Grando 12. 20. 21. AB. 14. N W. 1.

♀ Altitud. maxima 8. 30,0. Malacia. } media 29,4 $\frac{2}{7}$.
 — — minima 19. 29,0. S S W 4.

Dies frigid. 14. 55. N W b W 1. Pruina manc. } media
 — tepid. 9. 34. S W 3 } Therm.
 Altitud.
 43 $\frac{1}{2}$.

Sæviunt adhuc *variolæ Epidemicæ*, non hic solum, sed undique fere; æque sæpe malignæ & atræ.

atræ, quarum crustæ nigrae, diu adhærentes, faciem deturpant maxime.

Febris *secundaria* solito vehementius urget, ac perdurat diutius; non raro ad vigesimum usque diem & ultra, pluresque sub tartara mittit. Ad hanc vero arcendam nihil successit felicius, nihil optatius, repetitis *catharticis*, adjecto interdum calomelane! *Paregoricis* vero interpositis subinde. Hoc non solum in carissimis meis liberis expertus sum, sed in quamplurimis aliis, faustissimo utique eventu; sane vix ulla alia medicina profecit.

Qui vult de hoc argumento plura, adeat epistolas viri, dum viveret, undique perdocti, IOANNIS FREIND; nec non illustrissimi RICARDI MEAD, aliorumque doctissimorum medicorum, una conscriptas: etiamque, si non pigebit, quæ & * ipse de hac re olim differui.

Vix quicquam profecto in his *variolis* magis funestum observavi, quam rigores accedentes, aut horrores, in ipsa morbi ἀρχῇ: symptomata utique in isto morbo, isto tempore, atro semper carbone notanda!

Febris lenta, *nervosa*, jam fere cessavit penitus.

Novembri.

Totus mensis fuit procellosus admodum, ac maxime pluviosus; Libs sæpe furebat & Auster: hinc *Baroscopium* subsedit plurimum. Maximæ sunt inundationes undique.

Pluvia

* *Act. Philosophic. Anglic.* No. 390. & infra T. III.

Pluvia $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ — $\frac{4}{4}$ $\frac{6}{6}$ $\frac{7}{7}$ $\frac{8}{8}$ $\frac{9}{9}$ $\frac{11}{11}$ — $\frac{13}{13}$ — $\frac{16}{16}$.
 $\frac{18}{18}$ $\frac{19}{19}$ $\frac{20}{20}$ $\frac{23}{23}$ $\frac{24}{24}$ $\frac{25}{25}$ $\frac{26}{26}$ $\frac{27}{27}$ $\frac{30}{30}$ = 6.333 Dig. Dec.

Procella 2. S S W — 6. Nocte. S W — 18. & 19. Nocte. S S W 24. Nocte. S b W — 27. multo mane W N W. Magnum lumen boreale 5° H x. p. m. W N W 1.

♂ Altitud. maxim. 22. 30. 2. W N W 1. } media 29.4 $\frac{26}{29}$.
 — — minim. 25. 28, 7. S W 3. }
 Dies frigid. 21. 56. N W 1. } media Therm. Altit. 47 $\frac{14}{29}$.
 — calid. 3. 40. S S W 3. }

Variolæ epidemicæ adhuc. — *Febricula catarrhalis* cum importuna tussi, levi *dyspnœa*, *anorexia*, languore & doloribus *rheumaticis*, sævit passim; cum autem solito vehementior est, in notham abit pleuritidem, aut peripneumoniam: at ex facili abigitur plerumque missione sanguinis, ac *emetico* leni; unum, alterumve, postea applicando *epispasticum*, & tunc exhibendo diluentia, blanda *sudorifera*, *papaverina*, &c. inter quæ, Sp. Volat. Oleos. — C. C. Elix. Asthmat. ex fero lactis Canariensi diluto, tepido, profuerunt maxime.

Decembri.

Perduravit nimboſa valde & pluvia tempeſtas diem aduſque decimum Decembris, Libanoto fremente; inde vero fortis ab Oriente ventus *mercurium* erexit plurimum, ſudo nonnunquam conſequentē: a decimo nono deflexit ruruſ ad Auſtrum per aliquot dies, & multa pluvia cecidit. Ad finem menſis apricitas. Aër per totum craſſuſ maxime & humiduſ, ac ſolito tepidior, nempe ut in ſuperiore menſe fere.

Pluvia

Pluvia $\frac{''}{1} - \frac{''}{3} - \frac{''}{5} - \frac{''}{7} - \frac{''}{9}$. $\frac{'}{11} - \frac{'}{13}$. $\frac{''}{18} - \frac{''}{20}$.
Dig. Dec.

21. 23. 24. 25. 28. = 4. 180.

Grando vehemens 3. a. m. Nix. 16. E N E 1.
Gelu 15. 16. Procella 3. Nocte. S W — 5. S S W
Permagnus maris æstus 8. S S W 3.

♀ Altitud. maxim. 16. 30,2. E N E 1. } media 29.6 $\frac{2}{3}$.
— — minim. 1. 29,0. S W 3.
Dies frigid. 16. 63. } media Therm. Altitud. 51 $\frac{1}{3}$.
— tepid. 8. 44. S 2.

Tusses, febris *catarrhalis* & *variolæ* adhuc *epidemicæ*: Mania solito frequentior.

Tota pluviae quantitas, Anno MDCCXXIX.
Dig. Dec.
33.055.

Notæ breves.

(A) Haud raro equidem notavi, verno præsertim tempore, glaciem, etsi *Thermometrum Hauksbeianum* fuit ad 55 solum; media autem hyeme nullam, cum tamen ad gradum 65 & ultra descenderit: quod quidem, Februario elapso, diem inter decimum septimum & vigesimum primum contigit: tunc enim vix ulla, vel levissima, glacies erat, quamvis *atmosphæra* erat valde frigida, ventusque fortis ab Oriente spiritum *Thermometri* deprefferat ad 67 usque. — Notante clarissimo Cyrillo Act. Philosoph. Anglic. No. 424 & 450; cum spiritus Therm. Hauksbeian. est ad 55 tantum, gelu adest Romæ plerumque. — * Gradus adeo frigoris, quo glacies producitur, non videtur fixus & certus: quod sane haud leve argumen-

* Vide *Prolegom.* p. 16.

gumentum est, congelationem non a sola privatione motus, aut caloris, pendere *.

(B) Annon humida calidaque temperies aëris, æstate prægressa, fibras relaxando plurimum sanguinem atque lympham ad lentorem nimium disposuerat? Olea vero salesque corporis ad acrimoniam justo majorem? Idque præcipue cum & istis accesserit *atmosphære* pressura solito plerumque minor? Estne ergo manifesta satis febris hujus, & *variolarum* malignarum, una grassantium, causa?

Per talem *atmosphære* constitutionem morbi contagiosi haud dubio propagantur maxime; tunc enim latrinæ, mephitides & putrida omnia, longe pejus fœtent: imo animalium caro, bubula scilicet, aut ovilla, longe citius corrumpitur quam sicco durante, ac frigido aëre, qui impura & morbida *effluvia* excitat altius dissipatque. Cum vero circumvolitent, imo quasi terræ superficiem circumvallent, quantitate multo majore hauriuntur, non solum ipso cum spiritu, sed & per omnes etiam corporis *poros*: neque enim jam *atmosphære* pondus idoneum, & debita fibrarum vis, satis valide impellunt humores, aut contagia propellunt; quo plus virus autem excipitur, eo peiores edit effectus. Frigida contra, vel procellosa tempestas, aut contagem arcet, aut pestilentem dispellit auram.

Quinetiam perdurante aëris constitutione calida, ac humida, humores ipsi corporis lentorem nimium contrahunt & acrimoniam: unde contagii vim tunc accipiunt promptius. Multum
utique

* Vide *Prolegom.* p. 13.

utique facit instans sanguinis status ad promovendum, aut arcendum veneni effectum. Hunc vipera mordet, aut rabidus canis, illumque itidem; alterum cita mors abripit, alter vix quidem ægrotescit. Hinc hyberna frigora non solum febribus contagiosis obstant, quatenus aërem faciunt puriorem, sed & fibras fluidaque corporum nostrorum corroborando minus obnoxia pestilitati reddunt: atque ideo quoque medicamen, quod hoc efficere potest, quale quidem est cortex Peruvianus cum *alexipharmacis* idoneis & *stomachicis*, optimum procul dubio *prophylacticum* erit. Ego uti soleo tinctura quinquinæ cum cortice aurantiorum Hispalensium & radice serpentariæ Virginianæ ex vino Hispanico, aut spiritu vini Gallici.



CONSTITUTIO AERIS, etc.

ANNO MDCCXXX.

Januario.

INCIPIENTE anno insignis *Barometri* altitudo sudum fecit cœlum & Borea assidue perflante frigidum: *Atmosphœra* interim fuit tenuis & sicca, at nonnumquam glacialis quædam nebula omnia gelu quasi incrustabat, die duodecimo potissimum. Sub finem mensis, vergente ad occasum vento decidit *mercurius*: ad ipsum vero finem resurgebat, quod serenitatem reduxit & gelu.

Pluvia 14. 17. 20 — 24. 27. 28. 29. Nix 4.
Dig. Dec.

= 0.666.

☿	Altitud. maxim.	10. 30, 6.	E N E 1.	} media 30.0 $\frac{2}{3}$.
—	— minim.	28. 29. 4	SW 3.	
Dies	frigid.	12. 70.	Malacia.	} media Therm. Altit. 59.
—	tepid.	28. 52.	S. W 3.	

Variolæ sæviunt adhuc, haud tamen ita lethales: febris *catarrhalis* plures adhuc infestat. Paroxysmi graves asthmatici frequentes.

Februario.

Durante Februario ventus ab Occidente, aut Meridie, frequens pluviam demisit & *Baroscopium*; exeunte autem mense Aquilo glaciem, grandinem, nivem, miro quodam modo; pulchra nempe apricitate intercurrente subinde, maxima cum aëris tenuitate & siccitate, induxit: delabente tamen usque *Barometro*.

Plu-

Pluvia $\overset{u}{2}$ — $\overset{u}{4}$ — $\overset{u}{6}$. $\overset{u}{8}$. $\overset{u}{11}$. $\overset{u}{13}$. 15. 16. 18. 20.

Dig. Dec.

Nix 8—perpetua 27. Grando 14. 24. = 2.315.

Lumen boreale permagnum 23. H. 9. p. m.

N b E 1.

Altitud. maxim. 1. 30, 1. E b N 1. } media 29.5 $\frac{23}{8}$.
 — — minim. 27. 28, 8. E N E 2. }

Dies frigid. 1. 66. E b N 1. } media Therim. Altitud. 52 $\frac{7}{8}$.
 — tepid. 20. 48. W 1. }

Variolæ adhuc *epidemicæ*, sed distinctæ, & raro mortiferæ: pleuritis & peripneumonia passim. Morbi colici graves sub finem mensis, ab eadem forte (A) causa, quæ fuit pleuritidis; utrisque enim missio sanguinis profuit maxime; Cruorque æque viscidus ex colicis, ac ex *rheumaticis*, aut pleuriticis effluxit. Lenia tantum & *antiphlogistica purgantia* juvabant, nocebant prorsus *drastica* & medicamenta calidiora; imo horrenda sæpe excitabant tormina, ac urinam suppressabant penitus: *Clysmata* utique & fomenta emollientia inveni utilissima.

Martio.

A quarto Martii die octavum adusque Auster nimbosus mercurium maxime depressit, plurima ruente pluvia; inde ad decimum quintum nulla, nisi decimo, afflante plerumque Favonio: tunc cadente rursus Barometro pluvia quoque descendit usque ad vigesimum primum: sub finem vero resurgebat Barometer, licet ventus variabat quotidie.

Pluvia $\overset{u}{3}$. $\overset{u}{4}$. $\overset{u}{5}$. $\overset{u}{6}$. $\overset{u}{7}$. 10. 15. $\overset{u}{17}$. $\overset{u}{18}$. $\overset{u}{19}$.

Dig. Dec.

— 21. 25. 26. 28. 29. Grando 5. 23. = 3.432.

E 3

Levis

Levis *AB*. 9. H. II. p. m. Malacia. Procella gravisque pluvia 6. fera nocte. SSW.

$\begin{array}{l} \text{☿ Altitud. maxim. 31. 29,9. N. I.} \\ \text{— — minim. 7. 28,5. SbW } 3^{\times}. \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{☿ Altitud. maxim. 31. 29,9. N. I.} \\ \text{— — minim. 7. 28,5. SbW } 3^{\times}. \end{array}} \right\} \text{media } 29.4\frac{1}{3}\frac{2}{1}.$
 Dies frigid. 1. 63. NNW I. $\left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{☿ Altitud. maxim. 31. 29,9. N. I.} \\ \text{— — minim. 7. 28,5. SbW } 3^{\times}. \end{array}} \right\} \text{media Therm. Altit. } 49\frac{2}{3}\frac{2}{1}.$
 — tepid. 13. 42. Malacia.

Variolæ adhuc *epidemicæ*, at ruri maxime. Morbi colici graves passim; nec non peripneumoniæ affectibus *nervosis* stipatæ, sub finem mensis præcipue.

Aprili.

Ab ipso initio Aprilis ad decimum octavum diem varia fuit cœli facies ac tempestatis, variante paululum subinde *Baroscopio*: tunc Subsolani afflatus nubes dispulere & pluviam, *atmosphæra* quoque sicca facta est & tenuis valde.

Malacia interfuit frequens hoc mense, plurimo tum noctu decidente rore.

$\begin{array}{ccccccc} \text{Dig. Dec.} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} \\ \text{Pluvia} & 3. & 7. & 9. & 11. & 13. & 16—18 = 1.258. \\ \text{Tenuis glacies mane} & 20. & \text{Eb N} & 1. & \text{Levis } AB. & & \\ \text{I. Malacia — 3. WNW, I.} & & & & & & \end{array}$

$\begin{array}{l} \text{☿ Altitud. maxim. 20. 30,1. Eb N I.} \\ \text{— — minim. 17. 29,3. WSV } 2. \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{☿ Altitud. maxim. 20. 30,1. Eb N I.} \\ \text{— — minim. 17. 29,3. WSV } 2. \end{array}} \right\} \text{media } 29.7\frac{1}{2}\frac{9}{1}.$
 Dies frigid. 4. 52. NW b W 2. $\left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{☿ Altitud. maxim. 20. 30,1. Eb N I.} \\ \text{— — minim. 17. 29,3. WSV } 2. \end{array}} \right\} \text{media Therm. Altitud.}$
 — tepid. 28. 37. Malacia. $\left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{☿ Altitud. maxim. 20. 30,1. Eb N I.} \\ \text{— — minim. 17. 29,3. WSV } 2. \end{array}} \right\} 43\frac{6}{29}.$

Morbus colicus & *variolæ* adhuc passim. Febres *nervosæ*, remittentes, intermittentes, levi sæpe delirio accedente, frequentes. Tumores capitis *erysipelatosi*, medio præsertim mense: sub finem tussis, pleuritides, peripneumoniæ, & veræ, & nothæ.

Maio.

Maio.

Fremuit ab Oriente, aut Septentrione, ventus, accedente magna *atmosphærae* siccitate, donec octavo die, stagnante aëre, pluvia decidit: ab undecimo ad vicesimum incerta admodum & pluvia tempestas, declinante *Barometro*, humidoque facto aëre; dehinc, etsi pluvia fuit parca, tempestas haud aprica sequuta est.

Pluvia $\frac{1}{8}$. $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{13}$. $\frac{1}{14}$. $\frac{1}{15}$. $\frac{1}{17}$. $\frac{1}{18}$. $\frac{1}{19}$. $\frac{1}{23}$.
Dig. Dec.

25. 28. = 1.604.

♂ Altitud. maxim. 1. 29,8. E b N 3. } media 29.5 $\frac{7}{10}$.
— — minim. 19. 29,0. S 2.
Dies frigid. 3. 46. N b E 2. } media Therm. Altitud. 37 $\frac{2}{3}$.
— tepid. 31. 30. N W 1.

Febres intermittentes & remittentes cum profusis Sudoribus jam grassantur, quibus, in paroxysmis, accedit sæpissime aut delirium, aut *diarrhæa*: hæ, vel ex levi errore, in continuas malignas, nervosas, transibant haud infrequenter. Crebræ quoque hoc mense fuere febres *rheumaticæ*, pleuriticæ, peripneumonicæ; facile autem & abunde (B) expectorabant sputa flava, subrubicunda, eaque brevi *judicatoria*; adeo ut, nisi ipso morbi initio, venæ sectionem, saltem repetitam, haud desiderarent.

Junio.

Prævaluit hoc mense ventus occidentalis, nunc ad Austrum, nunc ad Septentrionem flectens; & medio & exeunte Junio aër valde humidus: nulla fuit notabilis *Barometri* elevatio hoc mense.

Pluvia 6 — 9. 10. 11. 12. 15. 17. 18. 24.
 Dig. Dec.
 26 — 28. = 1.715.

♂ Altitud. maxim. 1. 29,8. N W 1. } media 29.5 $\frac{16}{30}$.
 — — minim. 15. 29,1. S W 1. }
 Dies frigid. 10. 41. W N W 1. } media Therm. Altit. 83 $\frac{3}{30}$.
 — calid. 28. 28. Malacia. }

Jam fere vanescunt penitus febres συνεχέες:
 vix ullæ nisi de languore virium querelæ, quod
 inter omnes.

Julio.

Spiravit usque ab Occidente ventus, is vero
 lenis, & paulo magis vergens ad Austrum, toto
 Julio, Malacia sæpe interveniente: eadem pene,
 quæ in superiore mense, tempestas, ni quod *at-*
mosphæra magis humida esset, tepida & nebulosa,
 sub finem mensis præsertim.

Pluvia 1. 7. 8. 10. 16. 25 — 28. 29. 31.
 Dig. Dec.
 = 2.050.

Tonitru e longinquo 1. Fulgur & tonitru
 cum gravissima pluvia 7. W. 1.

♂ Altitud. maxim. 15. 29,9. Malacia. } media 29.6 $\frac{2}{31}$.
 — — minim. 29. 29,3. W S W 2. }
 Dies frigida 2. 40. N N W 3. } media Therm. Altitud.
 — calid. 22. 27. Malacia. } 31 $\frac{17}{31}$.

Variolæ mali admodum moris per totam fere
 Cornubiam: maximæ de languoribus querelæ un-
 dique, ac plurimi *hysterici* & *hypochondriaci* paro-
 xyismi. Exeunte mense icterus frequens valde,
 ac plures febres lentæ; aliquæ *miliares*. Jam lues
 bovina grassatur.

Augusto.

Augusto.

Ab initio Augusti ad diem decimum septimum ventus fuit varius, plerumque vero ab occidente; tunc orsus est Aquilo, fudo consequente cœlo: inde Boreas, aut Vulturnus ad ipsum finem. Aër fuit hoc mense humidus sæpe & nebulosus; a decimo septimo tamen ad vicefimum tertium satis ficcus.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 6. 9. $\frac{1}{14}$. 15. 23. $\frac{1}{26}$. 27. 29. $\frac{1}{30}$.
Dig. Dec.

= 1.538.

Magna AB. 28. E 2. Fulgur & tonitru e longinquo 26.

✂ Altitud. maxim. 18. 30,0. N. 1. } media 29,6.
— — minim. 26. 29,2. S S E 2. }
Dies frigid. 24. 39. E N E 1. } media Therm. Altit. 29 $\frac{3}{4}$.
— calid. 12. 22. Malacia. }

Morbus regius frequens etiamnum cum febricula & gravi nonnunquam hæmorrhagia. Variolæ adhuc in vicinia Cornubiensi; perpauci aliter morbi.

Septembri.

Multa pluvia decidit inter quartum & decimum quintum diem Septembris, vento interim variante quotidie; post id tempus Eurus fere perpetuus, at pluviae parum, quamvis cœlum fuit plerumque nubilum, & aër sæpe valde humidus. Maxima roratio a decimo septimo ad vicefimum quartum.

Pluvia $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{10}$. $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{12}$ — 15. 26. = 2.068. Dig. Dec.

E 5

Levis

Levis *AB.* 24. E b S 1 — 27. N N W 1 —
magis lucidum 26. Malacia.

♂ Altitud. maxim. 18. 30,0. E 1. } media 29,5 $\frac{2}{3}$.
— — minim. 11. 28,8. E S W 3. }
Dies frigid. 18. 45. Pruina. } media Therm. Altitud. 34 $\frac{1}{2}$.
— tepid. 6. 29. S 2. }

Plures *apoplexia* & *paralyfi* correpti sunt.
Mulieres multæ tumore crurum *erysipelatoso* ve-
xantur: Tusses & coryzæ sub finem frequentes.

Octobri.

Perflavit diem adusque octavum ventus orien-
talis violenter, quarto autem & quinto vehemen-
tissime, adeo ut omnes fere arbores, ictas quasi
fulmine, foliis spoliaverit; imo plures evertit
funditus. Postea multo lenior ab Occasu, aut
Meridie, successit ventus finem adusque durans,
multa interim ruente pluvia. (C) Tantos exci-
tavit vapores procella mensis initio, ut reddita
esset inde atmosphæra maxime humida; frondes
arborum gustu valde falsas deprehendi ad tertium
& ultra a littore lapidem: adeo mare perturbavit.

Pluvia 6. 7. 8 — 10. 12. 14. 17. 18 — 23.
Dig. Dec.
— 25. 28 — 30. = 3.372.

Procella 3. E 4^x — 4. E 4^x — 5. E b N 4^x.

♂ Altitud. maxim. 16. 29,8. W 1. } media 29,4 $\frac{8}{10}$.
— — minim. 5. 29, 1. }
Dies frigid. 6. 53. E 3. } media Therm. Altitud. 41 $\frac{5}{20}$.
— tepid. 15. 38. Malacia. }

Multæ tusses & affectiones *rheumaticæ* toto
hoc mense, at fere sine febre. Morbi colici,
diarrhæa plerumque comitante, quamplurimos
inva-

ad finem usque aër valde humidus, pluvia subinde cadente.

Pluvia 8. 10 — 12. 16. 23. 25. 26 — 28. 31.
Dig. Dec.

= 1.190.

⌘ Altitud. maxim. 3. 30.5. N b E 2. } media 30.0 $\frac{2}{8}$.

— — minim. 23. 29,5. S S E 2. }
Dies frigid. 2. 68. N N E 1. } media Therm. Altitud. 58 $\frac{2}{8}$.
— tepid. 27. 50. Malacia. }

Colica fuit frequens hætenus; *Rheumatismi* porro cum inflammatione multo majore, quam antea: Tusses ficcæ, laboriosæ cum tumore faucium: Peripneumonia passim, sub finem vero mensis præcipue. Febres lentæ, *nervosæ*, per viciniam, at in oppido rarius.

Tota pluviae quantitas, quæ hoc anno decedit, fuit 25.698.

Notationes aliquæ.

(A) Nihil sane in artem medicam pestiferum magis unquam irrepsit, quam generalia quædam nomina morbis imponere, iisque aptare velle generalem quandam medicinam. Ita videlicet omnis dolor ventris morbus colicus nuncupatur protinus; indito sic nomine, quid ultra empirici, balatrones, id genus omne, quam arcanum quoddam porrigere, aut *pharmacopoeice* cujusdam indicem evolvendo, quærere quid ibi ad colicen? Quid inde? Elixir salutis, Tinctur. sacra, Pil. Coch. min. vel e duob. aut tale quid, exhibetur illico; seu inflammata sint intestina, seu contracta *spasmo*: unde sæpe toxica potius, quam remedia,

dia, fiunt. — Prudentis autem est medici, primo æstimare morbi causam, eumque deinde solvere tentare. — Adeo nimirum ubi sævit abdominis dolor vehemens, fixus, pulsans & acris calor adest, pulsusque velox & tensus; non protinus exhibenda sunt acria *cathartica*: quo plus enim proceditur, *drastica* urgendo *pharmaca*, eo vehementius furit morbus, donec supervenit tantem *ileos* crudelis, *sphacelusque* demum lethalis. Sed ante omnia, sanguis mittendus est, nec parce nimis: post enim alvus vel leni respondebit *cathartico*, obserata secus validissimo. Ubi vero pituita tenax & acida dominatur, & colicos producit dolores, res longe aliter se habet.

(B) In morbis utique pulmonarlis, ubi excreatio facilis & expedita est satis, adeo non juvat sanguinis missio, ut eam sæpe supprimat omnino: nullo ideo modo indicatur ex usu fore, nisi evidens adsit *plethora*, aut vehemens aliquis dolor, aut *dyspnœa* gravis, aut sinceri sanguinis sputum, urgeat. Audi Coum senem, Πτύελον χρὴ ἐπὶ πᾶσι τοῖσιν ἀλγύμασι, τοῖσι περὶ τὸν πλεύμονα καὶ τὰς πλευράς, ταχέως τὲ ἀναπνεύσαι καὶ εὐπετέως. Hippocrat. Prognostic. vide & ibidem paulo infra: porto Coac. Prænotion. 13. Sect. de pleuritide & peripneumonia, ex editione Duretii: perpende etiam, quæ Ballonius in Epidemic. de hac re optime conscripsit; si is non est, quæ ex eo & Dureto diligenter congeffit Baglivius. Appendic. ad Pleuritidem. Tyroni certe medico consulo, ut non audeat tractare pectoris morbos, antequam iste probe perlegerit.

(C) Plures utique vapores excitat procella quam vel sol ardentissimus, potissimum si a mari venit:

venit: hinc post procellas graviores atmosphæra plerumque redditur nebulosa valde, & graves corruunt pluviae; condensatis scilicet modo vaporibus, quos vehementia tempestatis disperferat undique.

Minutissimæ quidem aquarum particulæ, sub forma vaporis, per aërem diffusæ se mutuo fugere videntur; at frigore condensatæ, vel adversis concurrentibus ventis congestæ, aut montibus impactæ obstantibus, in mutuos amplexus ruunt & decidunt illico.



CONSTITUTIO AERIS, etc.

ANNO MDCCXXXI.

Januario.

CUM novo anno frigidissima tempestas inva-
sit; omnia constricta gelu, nive omnia ple-
na! Asperam autem lenivit brumam continua
fere & pulchra serenitas. Venti aquilonares do-
minati sunt per totum Januarium, perdurante ad
finem usque rigidissimo gelu; aër interea fuit
valde purus & ficcus. Exeunte mense (A) *Baro-*
meter decedit plurimum, quod demirabar utique;
quoniam ex iisdem plagis flare peritabat ventus:
hoc vero accidebat forsan ob copiam nivis aliis in
locis delapsæ.

Nix 2. $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ 5. $\frac{1}{24}$ 26. Grando nivosa
Dig. Dec.

30. 31. Imbres 11. 12 = 0.622.

Forte vix dimidium nivis collectum fuit; nix
nempe in excipulo congelata, ibique restans, lo-
cum haud dedit succedenti, adeo ut plurima esset
diffusa.

§ Altitud. maxim. 12. 30,3. N E 2. } media 29,9 $\frac{2}{22}$.
— — minim. 28. 29,1. N I. }

Dies frigid. 31. 76. N 2. } media Therm. Altit. 65 $\frac{9}{22}$.
— tepid. 21. 58. Malacia. }

Sævit morbus colicus usque cum acerbis sæpe
dolore *rheumatico*. Tussis ficcæ, laboriosæ, &
accessiones graves *asthmaticæ*, frequentes, cum
tumore faucium *anginoso* sæpissime: his maxime
proffit *hydromel* tepidum, serum lactis *Canariense*
dilutius cum elix. *asthmat.* aut. pil. *Mathæi*; in-
terposito

terposito nonnunquam oxymelite scillino, & applicatis humeris cervicibusque *vesicatoriis*. Cruciatum plurimos plurimum arthritidis. Variolæ passim in Cornubia.

Februario.

Initio Februarii surrexit *mercurius*, at frigus remisit; octavo & nono, ab Austro procella *Barometrum* depresso plurimum: a decimo octavo ad finem usque venti septentrionales nubes abegerunt, nulla omnino decidente pluvia; surgente iterum *Baroscopio*.

Pluvia 3. 4. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 18.

Dig. Dec.

Nix 20. Grando gravis 1. = 1.706.

Lumen boreale parvum 19. H. 10. p. m.
N b E 1.

☿ Altitud. maxima 2. 30,3. ENE 1. } media 29.6 $\frac{1}{2}$ $\frac{8}{7}$.
— — minima 9. 28,9. SSE 4. }

Dies frigid. 1. 73. N N W 1. } media Therm. Altit. 57 $\frac{1}{2}$ $\frac{7}{7}$.
— tepid. 10. 53. W 1. }

Tussis *asthmatica* frequens adhuc. Pleuritides & peripneumonix hæd pauca. Morbus *anginosus* (*she Strangles* dictus) inter equos sævit plurimum.

Martio.

Statio *Baroscopii* toto Martio fuit valde sublimis, ventus ferme assidue borealis, Malacia tamen sæpissime intercurrente: Aër purus & maxime ficcus, exeunte mense præsertim: Pluvia parca admodum, at pulchra plerumque serenitas.

Dig. Dec.

Pluvia 4. 12. 18. 27. = 0.140.

☿ Altitud.

♂ Altitud. maxim. 2. 30,4. Malacia. } media 30.0 $\frac{20}{31}$.
 — — minim. 12. 29,7. Malacia. }

Dies frigid. 1. 62. Nb W 1. } media Therm. Altit. 50 $\frac{6}{31}$.
 — tepid. 14. 45. N N W 2. }

Tusses adhuc & angina valde frequens inter equos. Graves arthritidis paroxysmi, sævi quoque *rheumatismi*.

(B) Pleuritides, peripneumoniæ, pleuro-peripneumoniæ; tusses siccæ, asthmaticæ, laboriosissimæ, sunt valde *epidemicæ*; perparce admodum expuunt ægroti, anhelant maxime; multi moriuntur.

Aprili.

Boreas, isque sæpe velox valde, a primo ad duodecimum diem Aprilis perflavit; tempestas interea fuit admodum serena & pro anni tempore, frigida maxime & sicca: a decimo tertio ad vicesimum Libs, aut Favonius, pluvia cadente & *mercurio*: recurrebat dein ad Orientem ventus, vicesimo secundo & tertio valde procellosus, magis post vergebat ad austrum, humescente *atmosphæra*.

Pluvia 13. 15. 16. 18. 19. 23. 24. 26. 28.
 Dig. Dec.

= 1.254.

Gelu 7. 10. 11. Tonitru 18. Per magna AB.
 26. 10. p. m. N W 1.

♂ Altitud. maxima 7. 29,9. E N E 3. } media 29,5.
 — — minima 16. 28,8. S S W 3. }

Dies frigid. 10. 62. N E b N 2, rigidum Gelu. { media
 — tepid. 28. 43. E S E 2. — — — { Therm.
 — — — — — — — { Altit. 48 $\frac{2}{31}$.

Jam morbus inter equos evanescit. *Variolæ*
 passim: pleuritides & peripneumoniæ frequen-
 F tissime

tissime sæviunt, ob humorum tenacitatem & difficilem excreationem morbus evadit valde periculofus; ubi vero expuitur facile, brevi sedatur; præcipue si sputa mixta sunt rufo quodam sanguine: Spumantia sane & aquosa minime laudo.

Maior.

Hoc mense Subsolanus, aut Vulturnus, flabant majore ex parte, Libs aliquando, Caurus sæpius; ad finem vero fremebat Aquilo: a decimo nono ad tricesimum primum aër erat maxime ficcus.

2 Dig. Dec.

Pluvia 4. 5. 6. 8. 10. 16. 17. 22. 24. = 0.634.

Fulgur & Tonitru 22. 24. Malacia.

☿ Altitud. maxim. 30. 30,1. NNE 3. } media 29.7.
— — minim. 6. 29,3. SE 1.

Dies frigid. 1. 48. S E 1^x. } media 36⁸/₃₁.
— tepid. 23. 28. NW 1.

Morbi pectoris adhuc. *Variolæ sporadicæ*; passim *erysipelas*; Ischias solito frequentior: Tempestas autem ut plurimum salubris est.

Junio.

Procedente Junio aër fuit valde ficcus, ventus subsolanus, aut arctous, malacia non raro intercurrente; sensim autem delapsus est *mercurius*, aërque factus est sensim humidior. A vicesimo Libs plerumque regnavit, *atmosphæræ* temperiem, ut solet, reddens humidam valde, nebulosam, atque etiam frigidior.

Pluvia 10. 16 — ^h 19. ^{ml} 20. ^l 23. ^h 24. 25. 26.

Dig. Dec.

28 = 2.148.

☿ Altitud.

☿ Altitud. maxim. 1. 30,0. E 2. } media 29 4 $\frac{25}{26}$.
 — — minim. 20. 29,1. W S W 1. }
 Dies frigid. 7. 38. N 1. } media Therm. Altit. 32 $\frac{5}{28}$.
 — tepid. 20. 29. }

Variolæ epidemicæ æque sæpe mali moris; sub *crisin* aut humore crudo plenæ, aut nigram exhibentes faciem. Erysipelas frequens, cæteroquin mensis fuit saluber satis.

Julio.

Haud notabilis fuit *Barometri* ascensus, aut descensus, hoc mense; ventus inconstans, Malacia porro interveniebat sæpissime, multo decidentē rore: aër ut plurimum ficcus fuit & non raro valde calidus, præsertim exeunte mense.

Pluvia $\frac{u}{7}$. $\frac{u}{8}$. $\frac{u}{15}$. $\frac{u}{16}$. $\frac{u}{20}$ — $\frac{u}{23}$. $\frac{u}{25}$. $\frac{u}{31}$. = 1.300.
 Dig. Dec.
 Fulgur & Tonitru 31. p. m. SSE 1_x.

☿ Altitud. maxim. 10. 29,8. Malacia. } media 29 5 $\frac{15}{29}$.
 — — minim. 31. 29,3. SSE 1. }
 Dies frigid. 19. 37. E N E 1. } media Therm. Altitud. 27.
 — calid. 30. 21. Malacia. }

Crebræ adhuc *variolæ*: Febres intermittentes, tertianæ potissimum, sub finem mensis, at ruri maxime.

Augusto.

Ventus ab exortu perflavit toto Augusto fere, initio ad Septentrionem declinans, *Barometro* tamen haud multum surgente: sub finem Vulturnus plurimos attulit vapores & pluviam.

Pluvia $\frac{u}{1}$ — $\frac{u}{3}$. $\frac{u}{9}$. $\frac{u}{10}$. $\frac{u}{21}$. $\frac{u}{22}$. $\frac{u}{23}$. $\frac{u}{25}$. $\frac{u}{26}$. $\frac{u}{27}$.
 Dig. Dec.

28. 31. = 1.988.

Levis *AB.* 16. N b E 1. Fulgur & Tonitru 9
— 21. ESE 2.

☿ Altitud. maxim. 12. 29, 9. NE 1. } media 29,4 $\frac{12}{30}$.
— — minim. 26. 29, 0. ESE 2. }

Dies frigid. 12. 38. } media Therm. Altitud. 29.
— calid. 8. 22. N. 1. }

Sævæ variolæ, & febres *miliares rubræ*, *epi-*
demicæ; *Tusses convulsivæ* inter pueros.

Septembri.

Ineunte Septembri Libs, aut Favonius; ab
undecimo Eurus fere perpetuus; Malacia fre-
quens autem medio mense cum roratione ma-
xima: ad initium & ad finem aër erat valde
humidus.

Pluvia $\frac{1}{1}$ 1. 2. 4. 6. 8. 18. $\frac{1}{2}$ 23. 24. 26. $\frac{1}{2}$ 27.
Dig. Dec. $\frac{1}{1}$
28 — 30. = 1.300.

Levis *AB.* 13. Malacia, permagna autem 27.
H. 10. Malacia.

☿ Altitud. maxim. 11. 30, 0. E 1. } media 29,5 $\frac{19}{25}$.
— — minim. 27. 29, 2 SSE 2. }

Dies frigid. 9. 42. WNW 1. } med. Therm. Altitud. 52 $\frac{21}{25}$.
— tepid. 1. 30. SW 1. }

Variolæ passim. Febris *miliaris* cum pravis
admodum symptomatibus haud infrequens. Cho-
leræ plurimæ.

Octobri.

Principio afflavit Zephyrus, Malacia sæpe in-
terposita; ortus est Vulturnus undecimo, qui du-
ravit fere ad diem vigesimum septimum, flante
tamen Borea a vicesimo ad vicesimum secundum:
ad

Levis *AB.* 7. *W.* 1. *Procella.* 6. multo mane:
SSW 4^x. — 10. Nocte: *SWbW*.

♀ *Altitud. maxim.* 13. 30,1. *WNW* 1. } *media* 29,7 $\frac{3}{29}$.
 — — *minim.* 7. 29,1. *W* 1.

Dies frigid. 8. 56. *WNW* 1. } *media Therm. Altitud.* 49.
 — *tepid.* 4. 44. *SSW* 2.

Iidem, qui in præcedente mense, morbi, at
 severiores: (A) *tusses convulsivæ* frequentes inter
 pueros.

Martio

Incerta fuit durante Martio tempestas; nunc
 nimboſa, sæpe tranquilla, vento variante sæpif-
 ſime, plerumque verò e Septentrione. Initio &
 paulo ante finem *Barometri* ſtatio erat ſatis alta,
 aërque ſiccus & purus; medio autem mense eoque
 deſinente, concidebat *mercurius* & pluvia multa.

Pluvia $\frac{r}{1}$ 1. 2. 5. 6. 7. 9. 12. 13. 14. 18.
 Dig. Dec. $\frac{u}{27}$ 27. 28 — 31. *Nix.* 10. 11. = 3. 174.

Fulgur & tonitru 28. p. m. *procella* 2. Nocte,
WNW — *gravis* 29. mane, *SE* 4^x.

♀ *Altitud. maxim.* 4. 30,2. *Malacia.* } *media* 29,6 $\frac{1}{30}$.
 — — *minim.* 30. 28,8. *ESE* 3^x. }
Dies frigid. 11. 64. *NbW* 1, *rigid. Gelu.* } *media Therm.*
 — *tepid.* 20. 43. *Malacia.* } *Altit.* 49 $\frac{2}{30}$.

Tusses & *gravedines* adhuc: *pleuritides*, *rheu-*
matismi, *peripneumonix*, præcipue verò *nothæ*,
 sæviunt paſſim: *Variolæ ſporadicæ*.

Aprili.

Barometer haud fuit elatus per totum *Aprilem*,
 quamvis *Aquilo* ſpiravit nonnunquam, ac *Mal-*
acia interfuit sæpe: medio & fine menſis aër liqui-
 dus

duſ'erat & valde ficcus: a decimo octavo ad vigefimum quartum humidus, perflante Austro.

Pluvia $\frac{1}{1}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{7}{7}$ $\frac{10}{10}$ $\frac{15}{15}$ $\frac{18}{18}$ $\frac{19}{19}$ $\frac{20}{20}$ $\frac{21}{21}$.

$\frac{22}{22}$ $\frac{23}{23}$ $\frac{25}{25}$ $\frac{27}{27}$ = 2. 196.

♂ Altitud. maxim. 28. 29,7. N i. } media 29,4 $\frac{16}{29}$.
 — — minim. 25. 29,2. S b W 3.

Dies frigid. 16. 53. Malacia. } media Therm. Altitud. 44.
 — tepid. 27. 38. E S E i.

Idem usque regnant morbi: *variolæ* in *vici-
 nia epidemicæ*.

Maio.

Subfrigida fuit *atmosphæra* hoc mense, a decimo sexto ad vicesimum secundum sicca valde & suda: ventus tamen ex plagis australibus *Baro-
 scopium* depressit.

Pluvia $\frac{1}{1}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{5}{5}$ $\frac{8}{8}$ — $\frac{12}{12}$ $\frac{22}{22}$ $\frac{23}{23}$ $\frac{25}{25}$ $\frac{26}{26}$.

Dig. Dec.

— 28. 30 = 2. 424.

♂ Altitud. maxima 21. 29,7. N W i. } media 29,4 $\frac{26}{31}$.
 — — minima 27. 28, 8. S S W 3.

Dies frigid. 21. 50. N W i. } media Therm. Altitud. 40 $\frac{26}{31}$.
 — tepid. 16. 36. Malacia.

Cholera morbus passim; *diarrhææ* frequentes.
 Ferox tussis plures cruciat infantes ac pueros,
 eosque sæpe in spasmos adigit.

Junio.

Ab initio Junii ad diem usque decimum octavum vix ulla pluvia, aër interim fuit maxime ficcus & purus admodum, at sæpe frigidulus. A die quinto ad duodecimum Eurus, aut Malacia:
 a decimo

ad finem Libs infremuit, labente plurimum
Baroscopio,

			$\frac{''}{13}$	$\frac{''}{14}$	$\frac{''}{15}$	$\frac{'}{16}$	$\frac{'}{24}$	$\frac{'}{25}$	$\frac{'}{27}$
Pluvia	6.	9.	13.	14.	15.	16.	24.	25.	27.
	$\frac{''}{28}$	$\frac{'}{30}$	Dig. Dec.						
$28 - 30. 31 = 2.366.$									

Fulgur & Tonitru 14. Vesperi, Malacia.

Cholera adhuc, febre sæpe comitante, &
non raro eruptione *miliari* salutifera; colicus in-
super morbus jam grafiatur.

Novembri.

Per initia Novembris *Barometri* statio fuit hu-
milis, etsi Eurus Zephyro succedit, qui spiravit
a quinto ad duodecimum; a decimo tertio ad vi-
cesimum tertium Corus, aut Favonius, surgente
mercurio: inde Boreas, finem adusque perflans,
nubes dispulit, aërem ficcavit plurimum, rigi-
dumque gelu induxit.

	$\frac{'}{1}$	$\frac{''}{4}$	$\frac{'}{5}$	$\frac{'}{7}$	$\frac{'}{8}$	$\frac{'}{9}$	$\frac{''}{10}$	$\frac{'}{14}$	$\frac{'}{18}$	$\frac{'}{20}$	$\frac{''}{22}$	
Pluvia	1	—	4.	5.	7.	8.	9.	10.	14.	18.	20.	22.
Dig. Dec.												

Nix 28 = 2.356.

♂ Altitud. maxim.	26.	30,2.	NE 3.	} media 29.6 $\frac{2}{9}$.
— — minim.	8.	28, 7.	SE 3.	

Dies frigid.	30.	66.	NNE 1.	} media Therm. Altit. 50 $\frac{10}{29}$.
— tepid.	3.	40.	W 1.	

Mensis minime morbosus: nihil nisi morbus
colicus, isque fere a *Pomaceo* novello,

Decembri.

Alta fuit *Barometri* statio toto fere mense,
flante plerumque Cauro, aut Aquilone; Libs
vero interdum nubes atque pluviam invexit.
Gelu, idque rigidum, a decimo nono ad vicefi-
mum

num sextum, Borea furente; aër interea pro anni tempore fuit ficcissimus.

Pluvia 2. 5 — 8. 10. 13. 15 — 17. 25. 28.
Dig. Dec.

— 30. Grando 7. Nix 26 = 1.452.

Levis AB. 19. N. 1. Procella 13. fera noctes
N W.

♀ Altitud. maxim. 1. 30,2. NNW 1. } media 29.8 $\frac{8}{8}$.
— — minim. 6. 29,4. WbS 2. }

Dies frigid. 52. 67. NE 1^x. } media Therm. Altit. 56 $\frac{12}{8}$.
— tepid. 12. 49. WNW 1. }

Morbus colicus adhuc *epidemicus*; Gravedines
frequentes.

Dig. Dec.

Tota pluviae quantitas hoc anno fuit 17.266.
at magna pars nivis, mense Januario, amissa fuit.

NOTATIONES.

(A) Haud exiguum sæpe, ac subitum *mercurii* descensum notavi, cum instantis *atmosphærae* facies nulla hujus indicia prodiderit; sed inquirendo diligentius, aut vehementes imbres corruisse, aut fulmina, inter finitimos reperi: unde circumfusus aër ad æquilibrium restituendum illuc ruebat confestim.

(B) Ortum duxisse videntur hi morbi *inflammatorii* a diuturna frigiditate aëris ac ficcitate, quæ fibras tensas nimium & sanguinem plus justo densum effecerant. Notavit olim Hippocrates, quod aquilonia tempestas tusses moveat, ac dolores lateris & pectoris excitet, Aphorism. v. Sect. 3. Ego vero observavi sæpissime, quod, quo ficciora fuere tempora, eo parcius excreatio, ac pectoris pur-

purgatio difficilior evenit; quod tamen in morbis pulmoneis permagni haud dubio momenti est: vix utique feliciter solvitur peripneumonia sine larga sputorum ejectione. Nec id magis promovet aliquid, quam larga & frequens potatio tepidi alicujus liquoris *antiphlogistici*, nitrosi, leniterque detergentis; præcipue post debitam sanguinis missionem: quod si minus ex voto procedat, Gummi Ammoniacum, scillitica, oleosa, detergentia, *mercurialia* idonea, & nonnunquam etiam *volatilia*, adjicienda sunt. At bibere affatim tepide, imo calide, perpetuum esse debet, durante præsertim magna *atmosphærae* siccitate: quod & vapore pulmones fovet & relaxat, & sanguinem satis fluidum conservat. „Fervida hæc liquorum potio (ait Baglivi) est mihi in secretis „pro dissolvendis pertinacibus visciditatibus in „pleuritide epidemica & maligna, nec non in „aliis pectoris morbis, a tali causa pendentibus,„

At si nimia fuerit in pulmones destillatio, ea-que cruda & acris, eam lenire oportet *opiato* idoneo, quale est syrupus e Meconio, Laudanum, Elixir asthmaticum, Pilula Mathæi, &c. Cursumque humoris avertere debemus *epispasticis* admotis; idque præcipue furis internis, modo magna adsit *dyspnœa* & *anacatharsis* difficilis: sunt enim salutifera maxime. Vel ipse medicinæ parens abscessus ad tibias ortos in morbis etiam vehementibus pulmonis utiles pronuntiavit; αἱ δὲ ἀποσάσεις αἱ ἐς τὰ σκέλεα, &c. Hippocrat. Lib. Prænotion. Quantus sane consensus est has inter partes, ab hoc uno elucet satis; quod, qui ex asthmate veteri tumore pedum hydropico laborant, asthmate liberentur: sponte autem evanescente tumore, vel arte repulso, protinus anhelant.

Sed ut in peripneumonicis movere sputa opportunum est maxime, id in simplice pleuritide moliri ineptum est prorsus. Nihil enim hic æque juvat ac larga, frequens, & matura sanguinis missio, interposita quoque multa, diluente, emolliente potione; hæc enim sanguinem diluit & fovet, dum fibras nimis rigidas relaxat, tandemque coacta resolvit; præcipue nitro & camphora recte assumptis; quibus & subinde rectissime adjungitur papaveris lacryma, ad compescendam nempe doloris vehementiam: huic enim inest etiam relaxandi vis maxima, adeoque in omnibus morbis, ex nimia *strictura* (ut Methodici loquuntur) ante omnia juvat. Hinc est, quod rapidum nimis sanguinis cursum reprimit, & morbidæ materiæ *Pepsin* promovet maxime: hinc vides plerumque post opii usum sedimentum in urinis copiosum.

Vera sane pleuritis haud magis *bechica, eccligmata*, atque id genus alia, poscit quam inflammatio cruris, aut ipsa podagra: longe profectio magis proficimus fomentis idoneis; hæc enim sæpissime levant dolorem, morbumque evocant. — Imo in pertinace ac sævo dolore cucurbitulæ, atque etiam ipsæ scarificatæ, juvant maxime, aliis vix aliquid proficientibus. Sic Celsus, Capit. de Laterum dolore. „Confugiendum ad cucurbitulas est ante summa incisa cute,,. Sic Aretæus Cappadox, ἐπιδηλοτάτη γὰρ ἐπὶ τῶν πλευρικών ἢ ἀπὸ συκίης ὠφελεῖν, Cap. de Curatione Pleuritid. Quidni & *epispastica* quandoque in graviore casu admoveantur? Veteres sane frequenter sinapi super pectus imponebant. — Vivit adhuc & viget bonus quidam ad sacra minister, qui, multis abhinc annis, pleuritide sævissima correptus erat. Hunc nihil prælarga, eaque quater repetita, sanguinis detractio juvabat, anodyna & fomenta parum,

parum, brevi recurrente vehementer dolore: tandem levi scarificatione facta, leniterque cucurbitulis extracto cruore, *vesicatorium* superimponi jussi. Quid fit? intra perpaucas horas evanuit omnino dolor, neque postea recurrit. Fateor equidem, quod ulcuscula paulo difficilius sanarentur; sed quid istud, ubi mors aliter brevi fuerit pro remedio?

Quandoquidem ergo tanta sit differentia pleuritidem inter & peripneumoniam, non erit alienum forsan, *diagnostica* utriusque signa describere.

Proprium est pleuritidis incipere a rigore, quem mox calor ardens excipit; hisque confestim accedit lateris dolor vehemens, pungens, nunc ad spinam, ad claviculas sæpe, nonnunquam ad anteriora pectoris, tendens: dum vero hæc vigent, insignis adest pulsus durities, chordæ admodum tensæ vibrantis adinstar. Hæc quidem pleuritidis signa *παθογνωμονικά* prorsus agnosco; Tussis utique, pace dixerim Galeni, haud raro abest omnino.

Peripneumonia, ut ex Hippocrate Celsus, plus periculi quam * doloris habet. Pulmonum gravitas ac *dyspnœa*, pectoris oppressio, & spiritus ex ore fervens, purulentorumque rejectio, febre comitante ac tussi, propria & minime fallacia sunt peripneumonix indicia.

Fateor equidem quod hi morbi, longe frequentius quam vulgo putatur, aut invadunt una, aut invalescenti pleuritidi peripneumonia quoque accedit: ideo Riolanus horum conjunctionem retiffime

F 5

* Ἀπὸ τῆς ἥν μόνος Φλεγμονὴ Πνεύμων, ἀπὸ τοῦ γὰρ ἡ φύσις ἀνέλκει;
Aret. Cappad. Capit. de Peripneum.

ctissime nominavit *pleuripneumoniam*. — Perpende modo utriusque morbi sedem, ita rationem ex facili videbis, cur hoc evenit sæpissime. Exeunt namque ex *aorta* ad angulos pene rectos arteriæ *intercostales*, ex quibus pleuriticæ; exeunt ex eadem ad eundem fere modum arteriæ *bronchiales*, pulmonis substantiam irrigantes. Jam ergo cum multo abundat glutine sanguis, & vasa, solito magis elastica, humores validissime propellunt, pars magis viscida sanguinis, utpote levior ad aortæ latera urgetur, dum fluit mobilior puriorque per axim canalis; proinde & in vascula pleuræ & pulmonis, modo descripto ab arteria magna producta, impellitur: unde sanguis maxime crassus, parumque idoneus harum arteriarum ramusculos permeare, obstructions ibidem ac inflammationes creat. Quis adeo non videt, ita non mirandam esse, peripneumoniam cum pleuritide conjunctam, ut mirum magis videatur, cur uterque morbus, eadem urgente causa, non semper concurrit simul; eoque magis cum lobi pulmonum pleuræ coalescant, quod non raro, cætera sanis, accidit?

In ipso quidem initio omnis peripneumoniam sanguis rectissime mittitur ex magno vase, per magnum vulnus, ut quantitas & vis ejus minuantur, & locus adsit diluentibus; ac ne, dum urget usque inflammatio in extremis *bronchialibus* arteriis, ipsi etiam ramusculi arteriarum pulmonalium inde compressi, obstructi quoque brevi fierent, unde sævissima oriretur peripneumonia, jugulans ocysime; potissimum si multæ arteriolæ *pulmonales* affectæ sint: quo in casu vix aliquid proficiat, nisi largissima sanguinis detractio, imo fere ad deliquium usque. — Pro ratione autem

ma-

majoris, aut minoris, respirandi difficultatis, major, minorve cruoris quantitas emitti debet. Pulsus enim haudquaquam in hoc morbo hujus satis fidus est index; quandoquidem sæpe ob impeditum sanguinis cursum mire turbatur: imo qui vix sentiendus erat ante venæ sectionem, sæpe post valide pulsatur. — Haud tamen tuto mittitur post diem quartum; utique si sputa subflava, rubescentia, copiosa, libere rejiciuntur. Vide Notationem (B) anno MDCCXXX.

Hæc pauca cursim de pectoris inflammationibus protuli; qui vult plura, eaque perfecta omnino, perlegat diligenter consummatissimos Boërhavii aphorismos Capit. de Peripneumonia, &c. — At pro dolor, dum hæc scribo, ad deos abit vir immortalis, *quem sæcula nulla tacebunt!*



CONSTITUTIO AERIS, etc.

ANNO MDCCXXXII.

Januario.

MENSIS Januarii principio afflavit aquilo, & fudum fecit & gelu rigidum, *atmosphæram* quoque maxime siccam. Totum hoc pulchrum ventus a meridie brevi subvertit; imo 15 & 16 gravissima ruebat pluvia, inde Malacia perpetua fere ad diem vicesimum secundum: post varia admodum, at plerumque pluvia tempestas, cadente *mercurio*.

Pluvia 8. 11. 15. 16. 17. 19. 22. 23. 24.
Dig. Dec.
25. 26. 27. 28. 29. = 3.564.

Lumen boreale parvum. 18. Malacia.

✂ Altitud. maxim. 21. 30,0. Malacia. } media 29.6.
— — minim. 27. 28,9. S W 3.
Dies frigid. 9. 70. N I. } media Therm. Altitud. 58 $\frac{5}{8}$.
— tepid. 26. 50. S W 2. }

Morbus colicus passim: tusses, raucedines, gravedines & tumores faucium valde frequentes.

Februario.

Toto hoc mense ventus occidentalis prævaluit, aliquando ad septentrionem, sæpius ad austrum flectens, continua quasi cadente pluvia, haud tamen gravi: nullum gelu.

Pluvia 2. 4—7—10. 11. 12. 14. 16. 19.
Dig. Dec.
21—23. 25. 26. 28. = 2.924.

Levis

a decimo nono ad vigesimum secundum gravis pluvia, Zephyro flante; Septentrio autem post *Barometrum* erexit. Permagna roratio hoc mense, sub finem præsertim.

Pluvia 17. $\frac{i}{19}$ $\frac{iii}{20}$ $\frac{ii}{22}$ $\frac{i}{24}$ = 1.270. Dig. Dec.

⌘ Altitud. maxim. 26. 30,0. NNW 1. } media 29.6 $\frac{3}{29}$.
 — — minim. 10. 29,2. Malacia.
 Dies frigid. 2. 40. NW 1. } media Therm. Altitud. 31 $\frac{12}{29}$.
 — calid. 28. 26. N 1.

Febres *miliares* compositæ & *rubeolæ* passim.

Julio.

Ad principium & sub Julii finem aër fuit valde ficcus; Ventus enim e Septentrione spiravit, sed lenis admodum: ab octavo autem ad decimum quartum pluvia multa, flante Noto. Frequens corrente mense Malacia & ros plurimus.

Pluvia 8. $\frac{iii}{9}$ $\frac{ii}{11}$ $\frac{ii}{13}$ $\frac{i}{14}$ $\frac{i}{22}$ $\frac{i}{27}$ $\frac{i}{28}$.
 Dig. Dec.
 = 2.288.

⌘ Altitud. maxim. 1. 29,8. Malacia. } media 29.5 $\frac{13}{31}$.
 — — minim. 12. 29,0. SSW 2.
 Dies frigid. 14. 38. SSW 1. } media Therm. Altit. 29 $\frac{19}{31}$.
 — calid. 31. 24. NNW 1.

Tempestas maxime salubris.

Augusto.

Ineunte & exeunte Augusto ventus ab oriente *atmosphæram* ficcavit plurimum; inter nonum & vicesimum sextum varius fuit, nunc scilicet ad austrum, nunc ad septentrionem. Parum admodum

dum pluviae hoc mense decidit, at immensa vis roris.

11 Dig. Dec.

Pluvia 9—12. 19. 23. = 0.362.

☿ Altitud. maxim. 30. 29,9. E b N 2. } media 29.5 $\frac{1}{3}$ $\frac{6}{10}$.
— — minim. 12. 29,2. S 2.

Dies frigid. 31. 38. E b N 1. } media Therm. Altitud. 28 $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{10}$.
— calid. 19. 23. S 2.

Diarrhoeae frequentes: Febres intermittentes passim.

Morbilli jam ingruunt, sine nimirum mensis. Tussis plures jam vexant equos.

Septembri.

Diem adusque decimum Septembris *mercurii* statio fuerat sublimis, Boreas interim ocys afflans *atmosphæram* reddiderat maxime puram: a decimo autem ad vicesimum quintum Libs, aut Caurus, multa cum pluvia; inde Eurus.

iii ii i iii
Pluvia 11. 12—15. 17. 18. 19. 21. 23.

iii Dig. Dec.

27. = 3.050.

Procella 26. Nocte. E S E. Tonitru nocte 12. S W 1.

☿ Altitud. maxim. 2. 30,1. N. E 2. } media 29.6.
— — minim. 13. 29,0. W N W 2.

Dies frigid. 30. 45. E 3. } media Therm. Altitud. 35.
— tepid. 10. 29. S W 2.

Morbili epidemici. — Angina tussiens undique inter equos (dicta *the Strangles*) quæ plurimos suffocat prorsus.

Octobri.

Gravissima sæpe & perpetua fere pluvia decedit mense Octobri, nimbis ab Austro una furentibus.

tibus, plurimum etiam subsedit *Baroscopium*: id vero sub finem erexit ventus aquilonius, aëremque ficcavit.

	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	
Pluvia	2—5.	7—9.	11.	12.	14.	16.	17.	
	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	Dig. Dec.
19.	20.	21—23.	24—26.	28.	=6.342.			

Procella 14. p. m. Fulgur & tonitru 22 mane.
S b E 2.

♂ Altitud. maxim. 30. 29.8. NNE 1. } media 29.2 $\frac{26}{9}$.
— — minim. 14. 28.7. SW 4x }
Dies frigid. 31. 52. Eb N 1. } media Therm. Altit. 38 $\frac{5}{9}$.
— tepid. 1. 34. E 1. }

Tusses, coryzæ & morbilli maxime epidemici.
Jam morbus equorum sævit maxime.

Novembri.

Aër fuit valde ficcus & tenuis, ventusque ab Oriente, aut Septentrione, toto Novembri,isque a sexto die ad decimum furibundus: a vicesimo ad finem usque omni mane permagna pruina & gelu, dum lenis Aquilo spirabat.

Pluvia 1. 2. 10 — 12. 16 — 18. 19. 30.
Dig. Dec.
= 0.584.

Turbo aquilonalis 6. H. 9. nocturna.

♂ Altitud. maxim. 25. 30.4. NEb N 1. } media 29.9.
— — minim. 12. 29.4. ESE 1. }
Dies frigid. 29. 63. NE 1. } media Therm. Altitud.
— tepid. 1. 48. Eb S 1. } 55 $\frac{18}{30}$.

Morbilli adhuc, & morbus epidemicus inter equos.

Decembri.

Perstitit usque ad decimum ventus aquilonius, hinc Subsolanus: a decimo sexto ad finem usque Libs, aut Auster, permulta ruente pluvia, ac subsidente plurimum *mercurio*. *Atmosphæra* initio valde ficca erat & frigida rigido cum gelu; a decimo sexto autem tepida, nebulosa & humida.

Pluvia 4. ["]13.—[']16. 18. ^m19. ^{mm}20. 22. [']23.
[']24. ["]25. ["]26. [']27. ["]29. [']30. [']31. = 4.918. Dig. Dec.

Fulgura 20. 21. Nocte. Procella 29 Nocte
 S 4x. Nix 10. E b N 1.

☿ Altitud. maxim. 2. 30, 2. NE 1. } media 29. 5 $\frac{2}{8}$.
 — — minim. 31. 28, 8. S W 2. }
 Dies frigida 8. 66. NE 2. } media Therm. Altitud. 54 $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{8}$.
 — tepid. 25. 44. S 1. }

Tusses, gravedines, anginae, valde frequentes. Lues equina adhuc grassatur, sed imminuta valde est.

Tota quantitas pluviae, Anno MDCCXXXII.
 Dig. Dec. = 33.096.

De Pertussi Puerorum.

(A) Ingens adfert solamen (inquit *Sydenham*) venæ sectio *pertussi* infantum, in qua remedia quælibet, pectori dicata, longo post se linquit intervallo: Idem hoc sentit *Harris* de Morb. acut. Infant.—Oleosa utique & mucosa medicamenta damno prorsus; quippe quæ morbum augent, non abigunt certe: iis utcunque praxis vulgata utatur.

Quæ

Quæ mihi adeo magis esse ex usu, longa probavi experientia, sequuntur. — Sive evidens *plethora* adfit, sive sputum sanguine tinctum, venæ sectionem præcipio semper; idque præcipue, si febricula, quod sæpe fit, urget, aut vultus inter tussendum fere nigrescit: hanc insuper repeto nonnunquam, pro ratione scilicet virium & ætatis. Mox levem moveo vomitum Syrup. Flor. Persicor. Oxymel. Scillitic. Infus. aut Decoct. Ipecacuanhæ. — Tussis enim, partim saltem, est a stomacho, ut monuit olim *Waldschmidt*; nam vix unquam cessat tussis *convulsivæ* paroxysmus, antequam irritans pituita tenax vomitu rejicitur: imo tanta sæpe est illuviei copia, ut vomitionem ter, quaterve, proritare necesse sit.

Solvenda porro subinde est alvus, at lenibus tantum utendum est *catharticis*, nempe rhabarbaro, mercurio alkalizato, calomelane. Proluvies namque mucosa hoc modo expurgatur, adeoque nec *chylum* inquinat, nec, vasa lactea subeundo, sanguinem. Nocet utique astricta nimium alvus: nam febriculam infert, aut dyspnœam aggravat maxime. — Nec solum evacuantibus opus est, exhibenda sunt etiam, quæ & nervos & stomachum confirmare valent, ac lentorem sanguinis attenuare. Hoc opus absolvunt optime *mercurialia*, & cortex Peruvianus, *stomachicis* idoneis adjectis. Spiritus interea difficultas & pectoris oppressio solutionem gum. ammoniac. expressionem Milleped. aut tale quid desiderant sæpe; Vehementiam autem tussis interdum compescere licet elix. asthmat. le Mort. e Syrup. Diacod. quod quidem est optimum, ac tutissimum, in hoc morbo *anodynum*. Atqui si humor acris admodum in laryngem, aut pulmones, destillat, eum oportet avocare admoto cervicibus *epispastico*.

His cedit remediis facile hic morbus, alias sæpe contumax admodum; nec nisi tempore & mutatione cœli fugandus: decantata sane mulierularum *specifica* (quantum ego unquam observavi) meræ sunt quisquiliæ: imo muscus pyxidatus, modo si quid valeat, propter vim astringentem, adeoque corroborantem, & ad naturam corticis Peruviani aliquanto accedentem, valet. Nobile namque hoc Indiæ *pharmacum* non solum lentos attenuat humores, sed & totum *systema* fibrarum confirmat; atque sic utraq; facultate agendo febres intermittentes discutit.—Atqui periodica hujus *pertussis* accessio haud minus certa sæpe quam vel intermittantium paroxysmus, non multum abesse ab earum indole hunc morbum indicat: hoc magis etiam probabile videtur, quod uterque morbus, eadem plerumque tempestate, grassatur, ab eadem prope causa pendet, & iisdem fere curatur remediis.



CONSTITUTIO AERIS, etc.

ANNO MDCCXXXIII.

Januario.

INGREDIENTE anno pluvia frequens *atmosphæram* humidavit, vapores autem paulo post ventus ab Oriente discussit, a decimo sexto ad vicesimum quintum durans, surgente *Barometro*. Per paululum hoc mense gelu, imo exeunte eo aër erat valde nebulosus & pro anni tempore tepidus.

Pluvia 1—4. 5. 7. 8. 9. 15. 22. 29. 30.

Dig. Dec.

SI = 2.384.

Procella 7. Nocte. S. Gelu 14. N W 1—21. ENE 2.

Altitud. maxim. 24. 30. 2. E 1. } media 29.7 $\frac{20}{31}$.
— — minim. 8. 29. 3. S W 3.

Dies frigid. 21. 62. ENE 2. } media Therm. Altit. 51 $\frac{25}{31}$.
— tepid. 28. 47. S 1.

Tusses, Coryzæ, *Morbilli* frequentissimi.

Februario.

Flavit ab Occidente ventus toto Februario, ad Austrum vergens subinde, non raro etiam ad Septentriones: Aër interea fuit humidus & algidus, at non æque crassus ac elapso mense.

Pluvia 1—4—6. 7. 8. 11. 14. 17—20. 22.

Dig. Dec.

24—28. = 3.734.

G 3

Pro

Procella 1 Nocte. S W. Levis AB. 2. H. 10.
NNW 1.

♀ Altitud. maxim. 15. 30,0. NNW 1. } media 29.6 $\frac{1}{2}$ $\frac{9}{6}$.
— — minim. 4. 29,2. S W 2. }

Dies frigid. 10. 60. N W 1. Gelu & maxima Pruina. } media
— tepid. 7. 49. S S W 2 — — — — — } Therm.
Altitud. 53 $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{6}$.

Morbilli plures infantes puerosque peremerunt; declinante nempe morbo, quasi peripneumonia suffocatos: nihil profuit fere nisi tempestiva sanguinis missio.

Hoc tempore hanc regionem infestavit morbus, omnium, quotquot ego saltem memini antehac, maxime *epidemicus*; omnes pervasit domos, pauperum tabernas regumque turres: vix unus, aut alter, rure, vel in urbe, senex, aut puer, robustus, aut infirmus evasit. — Quandoquidem ergo tanta fuit ejus in omnes vis (idque profecto citius, tardiusve, per magnam terrarum partem) e re fore duxi, accuratam morbi, prout hic se habuit, historiam scriptis mandare.

Ab ipso initio Februarii, & in Cornubia, & in Damnonia citeriore, sævierat morbus hic *epidemicus*; nos tamen Plymuthi ante 4 Iduum Februarii vix attigit: quo die, nempe Saturni, plurimi subito quasi correpti erant, postridie innumeri, ad 15 Kalend. Martii omnes undique.

A levi incepit horrore morbus, cui mox accessere vagi & incerti calores, gravedo, magna ac importuna valde sternutamenta; dolor tunc dorsi & artuum errans, ac pectoris sæpe, at non consistens, gravissimam vero propter tussim non raro valde molestus: Tussi interea & sternutatione immensa vis mucis tenuis & acris ejecta fuit. Hæc quasi a frigore (ut dicitur) recens suscepto; paulo

paulo post tamen febris aliqua, interdum haud exigua, secuta est, pulsusque velox, nequaquam vero, ut pleuriticorum, durus & tensus; neque erat urina valde rufa, sed crassa, ac plerumque subalbida: Lingua non arida, sed plurimo albescente muco obducta fuit. Omnibus fere aderat insomnia, vertigo insuper, aut atrox capitis dolor angebat plurimos, levi nonnunquam comitante delirio. Tinnitus aurium quamplurimis molestus fuit, multisque in meatu *auditorio* dolor acutus, in abscessum aliquando desinens; Aspretudo tamen & faucium apostema frequentius enata sunt. Omnes pene ad sudores fuere valde proclives; qui multi, faciles, continui, intra biduum, aut triduum, erumpentes febrem fere discusserunt prorsus, urina plurima, subalbida, aut subflava, deponente sedimenta; lateritia vero raro admodum: plurimis autem, an ob profusos sudores, an ob *epispastica*, nil statuo, fuit valde difficilis. Alvus biliosa morbum sæpissime absolvit; haud raro pustularum urentium eruptio.

En morbi hujus *epidemici*, ut hic sæviit, descriptio! Cui quidem licet omnes ferme succubere paululum, letho tamen (si numerum spectes) paucissimi, quos inter infantes præcipue, ac senes pulmonarii.

Abiit plerumque vel intra quatrimum perbreve, manente solum infesta tussi, eaque sæpe diuturna valde, cum majore virium dejectione, quam quis, pro ratione valetudinis, crediderit: idque præsertim, ubi intempestiva sanguinis missio præcesserat.

Illos potissimum venæ sectio adjuvit, quos pectoris dolor, aut gravitas, oppresserat; idque ingruente, non sane declinante, febre: Omnium pene sanguis albida quadam pellicula contactus

G 4

fuit,

fuit, haud tamen valde glutinosa; nisi, ubi, obmissionem sanguinis diutius neglectam, in pleuritidem, aut peripneumoniam, febris abierat; quod quidem haud paucis contigit, ex nimio præsertim *volatilium* & *cardiacorum* usu.

Nausea, aut vomitus urgens, lene postulabat *emeticum*, quod & stomachi ægritudinem & pectoris oppressionem levabat maxime. Sudores exprimebat insuper; ad quos promovendos potus multus, tepidus, diluens, etsi sitis non admodum urgebat, erat necessarius omnino: quippe sine sudore vix unquam lætus hujus morbi exitus. Serum vinosum dilutius fuit instar omnium, tepide epotum; quod utique tanto erat in usu, ut vix satis suppeteret lactis ad id conficiendum.

Perutilia fuere, nec omittenda, *vesicatoria*, pone aures ac inter scapulas admota; Dolori capitis enim atque tumori & asperitati faucium certissimum tulerunt levamen: quinetiam nimiam in pulmones destillationem, cursum scilicet acris colluviei avertendo, prohibuerunt. — Me adhortante, pro remediis fuere maxime Lap. Contrayerv. Spirit. Volat. Oleos. Sp. C. C. — Lavend. C. Elixir. Asthmat. le Mortii, & potiones ex Spermat. Ceti solut. cum larga portione decocti cujusdam pectoralis tenuis, aut feri lactis dilutissimi: quæ & percommode simul tussim leniebant, ac sudores eliciebant optime. Ubi vero, post sanguinis emissionem, respiratio gravior & excreatio difficilis premebant, solutio Gummi Ammoniacy cum Oxymelite scillitico fuit necessaria prorsus: jam enim instar peripneumoniæ nothæ urgebat morbus, & eandem omnino postulabat medendi methodum; Pectoralia nempe maxime incidentia, & tibiis *epispastica*; *emetica* nonnunquam, aut lenia *cathartica*.

Furebat

Furebat tussis per totum morbi impetum; sæpe adeo vehementer utique, ut eam *anodynis* cohibere fuisset difficile satis: imo usque adeo interdum perduravit post febrem abactam, ut haud paucos, post unum alterumve mensem, in tabem lethalem abriperet; illos præcipue, quibus fuerat olim ex pulmonum infirmitate valetudo minus prospera. Cum vero notaverim frequenter, quod tussis, oborta *diarrhæa*, profligata esset, *ecoprotica* ex Rhabarbaro, Manna, Tartaro solubili, &c. exhibui subinde, faceffente febre; optato (quod solet) eventu, duce natura: quæ porro cibi appetentiam, toto morbi tempore prostratam valde, brevi restituebant.

Morbus fuit hercle, ni ex admissio gravi errore, raro lethalis, quem tamen multi, vel ob ipsam ejus frequentiam, temere spernentes, feras dedere pœnas stultitiæ, asthmatici, hectici, tabidi.

Martio.

Januario & Februario tepidiore, successit Martius per initia paulo frigidior; Ventus quippe ex plagis arctoïis spiravit, surgente *Barometro*: post vero frequens Vulturnus *mercurium* demisit, multamque pluviam. Ab octavo ad vigesimum secundum aër fatis ficcus fuit & tenuis, inde multo humidior.

	<u>1</u>	<u>2</u>		<u>3</u>		<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
Pluvia	1.	7.	8.	14 — 16.	19.	23 — 25 — 27.			
						Dig. Dec.			
28.	Nix	10.	21.	Grando	9.	17. = 3.098.			

Levis AB. 21. 10. p, m. N W 1. Gelu rigidum 10. 11.

§ Altitud. maxim. 3. 30, 2. N N W 1. } media 29.4 $\frac{2}{8}$.
 — — minim. 21. 28. 9. S E 3. }
 Dies frigid. 10. 62. N b E 1. } media Therm. Altit. 52 $\frac{2}{8}$.
 — tepid. 28. 44. E S E 2. }

Incipiente mense febris *catarrhalis* undique maxime *epidemica*, quæ & adhuc perdurat; jamque etiam pleuritides, peripneumonix, & veræ, & nothæ, anginx quoque frequentes.

Aprili.

Ventus ab Oriente, ad Septentrionem vero sæpe deflectens, toto Aprili prævaluit, unde aër ficcus & frigidulus evasit; sub finem præsertim: Malacia tamen subinde & nebulæ aliquando intervenere.

Dig. Dec.
 Pluvia 8. 13. 15 — 17. 18. 22. = 2.284.

§ Altitud. maxim. 19. 30, 0. Malacia. } media 29.6.
 — — minim. 13. 29, 1. S E 1. }
 Dies frigid. 27. 50. N E 3. } media Therm. Altit. 42 $\frac{2}{8}$.
 — tepid. 22. 38. Malacia. }

Febris *epidemica* adhuc passim rure; multique nunc tabescunt ex male judicata febre. Peripneumonia & pleuritide multi corripiuntur.

Majo.

Hoc mense mediam plerumque stationem tenuit *Baroscopium*, flante fere quotidie Subsolano; *Atmosphæra* maxime ficca fuit & tenuis; a duodecimo ne vel guttula pluvix, at ros plurimus & Malacia frequens.

Dig. Dec.
 Pluvia 6 — 8. 10. 11. 12. = 1.010.

§ Altitud. maxim. 22. 29, 8. E 1. } media 29.5 $\frac{1}{2}$.
 — — minim. 7. 29, 2. Malacia. }

Dies

Dies frigid. 5. 46. E 2. } media Therm. Altit. $37\frac{16}{27}$.
 — tepid. 30. 28. Malacia. }

Febres pulmonariæ, ac intermittentes, invadunt plures. Haud pauci modo phthifici mortui sunt, rupto interdum pulmonis apostemate: illi præcipue, qui ex febre *catarrhali* in tabem inciderant, & quibus etiam inde tumor pedum aquosus accesserat.

Junio.

Venti fuerunt mutabiles durante Junio, sæpe ex Oriente, sed ab Occidente sæpius ad Austrum plerumque vergentes: intervenit haud raro Malacia. Initio aër erat ficcus; fine & ficcus & calidus. Maxima roratio sæpe.

Dig. Dec.

Pluvia $\frac{''}{5}$ $\frac{'}{8}$ 9. 13. 15 — $\frac{'}{19}$ $\frac{'}{20}$ 25. = 1.534.
 Maxima AB. media nocte 27. WNW 1. Fulgura 12 nocte. Tonitru 26.

♀ Altitud. maxim. 22. 29,8. Malacia. } media $29.4\frac{28}{38}$.
 — — minim. 18. 28,8. SbW 3. }

Dies frigid. 21. 36. W 2. } media Therm. Altit. $28\frac{26}{30}$.
 — calid. 27. 24. W 1. }

Febres remittentes & intermittentes adhuc, jam sæpe cum pustulis rubellis.

Julio.

Toto fere Julio aër fuit valde ficcus & fervidus, paucæ pluviae, rorationes autem maximæ, ventus australis raro, Corus & Aquilo sæpe: nihilominus statio *Baroscopii* erat ut plurimum humilis.

Pluvia

Pluvia 14. 15. 16. 21. 28. 30. 31. Grando
Dig. Dec. 16. = 0.772.

Magna AB. 10. 10. p. m. N W 1. Tonitru
16. p. m. SSE 2 — 28. p. m. NN W 1.

☿ Altitud. maxim. 1. 29,7. NNE 1. } media 29.4 $\frac{5}{26}$.
— — minim. 29, 29,0 N b W 1. }

Dies frigid. 31. 34. NW 1. } media Therm. Altit. 24 $\frac{8}{26}$.
— fervid. 5. 16. NW 1. }

Febres intermittentes sparsim: Cholera & diarrhœa frequens. Mulieres plurimæ immenso mensium profluvio laborant. Omnes fere de languoribus ob æstium enormem undique conqueruntur.

Augusto.

Perpetuus spiravit ab Occidente ventus, ad Meridiem sæpe deflectens, crebro etiam ad Septentrionem. Priore mensis parte pluvia, tonitru, fulgura frequentia, eaque gravissima, sudo tamen subinde intercurrente.

Pluvia 1. 3. 4. 6. 7. 10 — 12. 16. 17. 18.
Dig. Dec. 21. 24. 27 — 29. 31. = 4.500.

Fulgur & tonitru vehemens 3. 6. 7. 10 vesp. Proculla 17 nocte. SW.

☿ Altitud. maxim. 24. 29,9. NN W 1. } media 29.4 $\frac{22}{30}$.
— — minim. 7. 29,0. SSW 1. }

Dies frigid. 24. 43. NNW 1. } media Therm. Altitud. 32.
— calid. 5. 24. SW 1. }

Perpauci morbi: aliqui diarrhœa & cholera morbo corripiuntur.

Septembri.

Septembri.

Varia fuit tempestas ventusque varius hoc mense, a nono tamen ad diem decimum octavum ab Oriente, ad Austrum declinando plerumque. *Atmosphæra* erat sicca, & statio *barometrica* altior ut plurimum, quam elapso Augusto: Maximæ & crebræ rorationes.

Pluvia $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ 3. $\frac{1}{5}$ 11. 12. $\frac{1}{13}$ 14. 21.

$\frac{1}{24}$ $\frac{1}{25}$ $\frac{1}{26}$ $\frac{1}{28}$ 30 = 1.978. Dig. Dec.

Magna AB. 8. 10. p.m. N N W 1 — levis 29. H. 9. W N W 1.

Fulgur & tonitru 12 & 13. a. m. Fulgura nocte 26.

§ Altitud. maxim. 19. 30,1. Malacia. } media 29.6 $\frac{2}{9}$.
— — minim. 26. 29,0. S W b W 2. }

Dies frigid. 30. 49. NNE. 1. } media Therm. Altit. 37 $\frac{2}{9}$.
— tepid. 5. 33. S W 2. }

Tusses & *catarrhi* valde frequentes. Ad finem mensis *choleræ* & *diarrhææ* sæviunt.

Octobri.

Eurus & Aquilo hoc mense sæpe afflantes *Barometrum* extulerunt multum, temperiemque aëris siccam & frigidam reddidere, etsi haud raro intervenit nebula. Per initia mensis ros plurimus.

Pluvia $\frac{1}{1}$ — 2. $\frac{1}{11}$ 23 — 25. 27 — 29. = 2.026. Dig. Dec.

Magna AB. 27. 9. W N W 1. Permagnæ pruinae 15. 16. N N E 1. Glacies 31. N N E 1.

§ Altitud. maxim. 18. 30,2. E 1. } media 29.7 $\frac{1}{3}$.
— — minim. 25. 28,8. S W 3. }

Dies

Dies frigid. 31. 60. NNE 1. } media Therm. Altit. $46\frac{2}{3}$.
 — tepid. 3. 37. SSW 1. }

Cholera & diarrhæa adhuc. Eruptio pustulosa *scorbutica* frequens sine febre. Apoplexiæ passim: sævæ aliquæ febres peripneumonicae. *Rubeolæ* & morbi colici plurimi.

Novembri.

Ex occasu plerumque ventus spiravit Novembri, at sæpe ad septentrionem deflexit, quamvis aër erat solito magis tepidus; sub finem valde crassus & humidus.

Pluvia 7. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 17. 20.
 Dig. Dec.

21. 26. 28 — 30. = 1.882.

Magna AB. 27. H. 2. matutina. N W 1 —
 29. 10. N W 1. Procella 20. nocte. S 4.

♂ Altitud. maxim. 5. 30,2. NNW 1. } media 29. $7\frac{2}{8}$.
 — — minim. 11. 29,1. SW 3^x. }

Dies frigid. 5. 58. Glacies } media Therm. Altitud. $48\frac{2}{8}$.
 — tepid. 15. 44. S 2. }

Rubeolæ adhuc frequentes: Febres aliquæ pulmonariæ, morbus colicus passim.

Decembri.

Hic mensis fuit nimbosus maxime, continuâ fere procella eaque sæpe gravissima, a die nono vicesimum tertium adusque perduravit, Africo furente, dum pluviae corruerunt plurimæ, & horrida nonnunquam fulmina. Ineunte quidem Decembri apricitas aliqua effulsit cum tenui glacie, aër autem erat valde crassus; quintus utique dies fuit valde nebulosus & caliginosus maxime: Im-
 mensa

mensa forte vaporis copia *Barometrum* sustinuit partim, quod perpetuæ procellæ aliter multo magis depressoerint.

Pluvia 1. 2. 9. 11. 12. 13 — 15 — 16. 17.
Dig. Dec.
20 — 22. 23 — 25. 26 — 29. 30. 31 = 4.688.

Graves procellæ 11. 12. 14. 16. 22. 23. 26.
Maximi maris æstus a 12 ad 14.

Fulgur & tonitrua gravissima cum vehemente grandine 12.

— — — — diu durantia 16. S W b W. 4.

☿ Altitud. maxim. 6. 30,1. NNW 1. } media 29.5 $\frac{26}{31}$.
— — minim. 14. 29,1. SW b W 4^x. }
Dies frigid. 7. 62. E 1. } media Therm. Altitud. 49 $\frac{22}{31}$.
— tepid. 14. 34. }

Incipiente mense morbi colici, & peripneumoniæ nothæ cum affectibus *nervosis* passim: Tussés & gravedines frequentes valde sub finem mensis: Paroxysmi quoque multi *hypochondriaci* & *hysterici*.

Dig. Dec.

Tota quantitas pluviae hoc anno = 29,884.



CONSTITUTIO AERIS, etc.

ANNO MDCCXXXIV.

Januario.

Post nubila phœbus! novo quippe cum anno multo lætior surgit cœli facies, Boreas nempe paulo post initium Januarii oriens vapores dispersit & nubes, rigido accedente gelu cœloque sereno: aëris autem temperies longe magis tepida fiebat exeunte mense.

Pluvia 1. $\frac{11}{2}$. 8. 16. $\frac{11}{2}$. Nix & grando
Dig. Dec.

4. 5. = 1.480.

Procella 2. W S W. Fulgur & tonitru cum multa grandine 22. mane.

☿ Altitud. maxim. 29. 30,4. Eb N. 1. } media 29,9 $\frac{15}{29}$.
— — minim. 3. 29,4. W 2.

Dies frigid. 14. 71. ENE 1. } media Therm. Altit. 60 $\frac{4}{29}$.
— tepid. 26. 54. NW 1.

Gravedines, tussesque frequentes: morbi colici plurimi: Peripneumoniæ passim.

Februario.

In alta perstitit statione *Baroscopium* diem adusque undecimum Februarii, flante Cauro; a decimo quinto ad decimum octavum procella perpetua, imo sæpe violenta maxime: ab Occidente ventus turbineus iterum vicesimo quarto & quinto, immensa quoque vis pluviae tunc decidit, maximeque subsedit *mercurius*. Nisi ipso mensis initio vix ulla glacies.

Pluvia

Pluvia 2. 3. 4. $\frac{111}{12}$. 13 — $\frac{111}{15}$. $\frac{111}{16}$. $\frac{111}{17}$. $\frac{111}{18}$.

Dig. Dec.

$\frac{111}{19}$. $\frac{111}{22}$. $\frac{111}{23}$. $\frac{111}{24}$. $\frac{111}{25}$. $\frac{111}{26}$. 27. = 5.554.

Fulgura cum grandine 17. nocte. WNW 2.

⌘ Altitud. maxim. 1. 30,4. NE 1. } media 29.6 $\frac{15}{26}$.
 — — minim. 24. 28,5. S b E 4. }

Dies frigid. 1. 62. Gelu. } media Therm. Altit. 53 $\frac{18}{26}$.
 — tepid. 12. 50. SW 2. }

Incipiente mense morbi *peripneumonici*; procedente anginae, coryzae, tusses plurimae.

Martio.

Ventus quoque occidentalis toto duravit Martio, majore ex parte vergens ad Austrum, unde frequens pluvia & aër crassus & humidus; sub finem ad Septentrionem deflexit paululum.

Pluvia 1 — $\frac{111}{4}$. $\frac{111}{5}$. 6. 9. $\frac{111}{10}$. $\frac{111}{12}$ — 14. 16 —

Dig. Dec.

$\frac{111}{18}$. $\frac{111}{19}$. $\frac{111}{20}$. $\frac{111}{22}$. $\frac{111}{23}$ — $\frac{111}{25}$ — 28 = 2.812.

Procella 19. nocte. S. 4x.

⌘ Altitud. maxim. 31. 30,0. WNW 1. } media 29.5.
 — — minim. 13. 29,0. SW b S 2. }

Dies frigid. 15. 56. WNW 1. } media Therm. Altit. 48 $\frac{7}{30}$.
 — tepid. 23. 45. W b S 1. }

Tusses, faucium tumores, lippitudines hoc mense frequentes: multi *rheumatismo* correpti, aliqui *peripneumonia*, & *paraphrenitide*; plures sub finem apoplexia.

Aprili.

Ne vel Guttula pluviae diem adusque decimum octavum; a primo ad duodecimum Corus,
 H inde

inde ad vicefimum tertium Subfolanus, post Libs: medio mense aër erat ficcus & tenuis.

Pluvia 18. [']19. ^{'''}20. [']22. [']23. ^{''}25. [—]26. 27.
Dig. Dec.

29. 30. = 2.126.

☿ Altitud. maxim. 12. 30,0. NNW 1. } media 29.6 $\frac{9}{28}$.
— — minim. 23. 29,4. ESE 2.

Dies frigid. 13. 50. ENE 1. } media Therm. Altit. 43 $\frac{2}{3}$.
— tepid. 28. 37. WSW 2.

Tussis & tumor faucium frequens adhuc: febres intermittentes, nec non apoplexiæ haud paucæ: *Ophthalmiæ* passim.

Hoc mense grassari cœpit febris quædam (si ita dicam) *anginosa*, furens indies magis magisque. — Quos corripuit, primo algor invasit, mox incertus ardor & *cephalalgia*, vomitus protinus aut *diarrhœa*, pauloque post dolor faucium acutus & tumor: hinc febris haud levis, languor, anxietas, ac pectoris oppressio, accedente sæpe delirio, aut soporoso affectu, quorum haud dubia fuere prænuncia urinæ vel tenues, vel quales jumentorum turbidæ. — Felix ille tunc ægrotus, cui sudores eruperunt affatim, aut pustulæ rubræ; si ne hæc quidem, erysipelatis aliquid: ubi nihil horum, brevi instabat fatum; nisi opportuna *diarrhœa*, aut tempestiva disruptio apostematis faucium aut enitens parotis, fauste sublevarent.

Morbus hic haud raro vel intra sex dies discussus fuit; sæpe vero diutius inhærentem, septimo, octavo, aut nono die, erumpentes pustulæ crystallinæ (miliares dicunt) plurimæ expellebant prorsus: modo nimirum haud præmature recessisset, quod certo sane fuit ægrotis exitio. Idem omnino dicendum est de papulis rubris, quæ sæpe etiam statu morbi apparebant.

Pueros

Pueros & juvenes potissimum invasit febris, qui vermes crebro dejiciebant: Seniores raro decubuerunt. Urina erat rufa plerumque, subrubrum, vel ab ipso initio, deponens sedimentum: Lingua vero plurimo muco subflavo fœdata.

Desideravit febris hæc *epidemica*, quam primum quis ea correptus erat, missionem sanguinis, eamque sæpe repetitam; haud raro utique vehementer urgente morbo, ad tertiam usque vicem; etsi cruor emissus non erat viscidus admodum, interdum floridus satis: vomitu dein lenem stomachi purgationem, continuo *epispastica* auribus, cervicibus, humeris. Sorbitio tepida, *antiphlogistica*, permulta, erat necessaria prorsus, levi sæpe interposito *cardiaco*, nempe ex lapid. contrayerv. Croco, Theriac. Andromach. Confect. Fracastorii, Confect. Raleigh. &c. idque præcipue dum appropinquabat morbi status. maxime profecto cum *exanthemata* evaserint sublivida; quod quidem pessimi ominis! Gargarismata emollientia, subacida, detergentia, ulceroso gutturi conducebant maxime, sensim insuper sæpeque deglutita *mucilagine* ex semin. Cydoniorum & Psyllii, Syrup. Moror. aut de Rub. Idæis edulcorat. vel Linctu aliquo *anodyno*, tussi urgente præsertim, quæ fuit sæpissime permolesta. Ut primum aspera & squamosa quasi apparuit cuticula, purgantia lenia ex Rhabarbaro, &c. cum *mercurialibus* profuere maxime, perfectamque sanitatem brevi restituebant.

Maio.

Ventus ab occasu, flectens maxime ad Septentrionem, toto fere mense spiravit, intercurrente nonnunquam Vulturno. *Atmosphærae* tem-

peries fuit multo frigidior solito; statio *mercurii* ut plurimum demissa.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 7. 11. 12. 15 — 18. 21. $\frac{III}{25}$. 26.
Dig. Dec.

28 — 30. Nix. 13. Grando 14. = 1. 764.

Leves AB. 14. 15. N W b N 2. Fulgur & tonitru 28. p. m.

☿ Altitud. maxim. 10. 29, 9. N 1. } media 29.4 $\frac{1}{3}$ 9.
— — minim. 29. 29, 0. SE 2.

Dies frigid. 14. 52. NNW 2. insolitum Frigus! } med. Ther.
— tepid. 25. 37. Malacia ———— } Alt. 42.

Tussis *convulsiva* inter pueros frequens, febres intermittentes passim. — Nunc febris *anginosa epidemica* sævit maxime: Angina gravius urget, cui jam frequenter accedunt aphthæ molestissimæ, & cum fera tussi strangulatio ferme, ni frequens subveniat tepida sorbitio & perpetua fere gargarizatio.

Junio.

Eurus assidue flavit a sexto fere ad vigesimum; initio & fine Corus: Atmosphæra magis tepida fuit, ac humida, quam mense priore; ambo utique plus satis nubili.

Pluvia $\frac{1}{2}$. $\frac{III}{6}$. $\frac{1}{8}$. 10. 11. $\frac{III}{14}$. $\frac{II}{15}$. 20. $\frac{1}{21}$.
Dig. Dec.
 $\frac{III}{23}$. $\frac{1}{26}$. 29. = 3.208.

☿ Altitud. maxim. 4. 29, 7. NW b W 1. } media 29.4 $\frac{1}{2}$ 9.
— — minim. 24. 29, 1. WNW 1.

Dies frigid. 10. 40. SE b E 1. } media Therm. Altit. 31 $\frac{1}{2}$ 9.
— calid. 22. 26. Malacia.

Febres intermittentes adhuc; *Ophthalmicæ* passim. Morbo jam *epidemico* accedunt pustulæ fere omnigenæ, atque haud raro eruptiones *erysipelatosæ*:

tosæ: minus vero premuntur fauces; Febris quippe jam magis ad exteriora tendit. Die sexto, aut septimo, cuticula aspera fit & rupta, velut aspersa crassiore farina; idque quo magis, eo melius; tandem tota pene desquamatur: ex pedibus sæpe tantis portionibus, ut soleam quasi detractam referant hæ morbi exuviae. Hic equidem lætissimus est morbi exitus: ubi vero *exanthemata* tarde admodum & parcius erumpunt, erupta vero livescunt, maximæ anxietates, languores, deliquia sequuntur: pauloque sæpe post vomitus, aut *diarrhœa*, enormis, quæ ægros non raro celeriter rapit.

Hæc febris, ut omnes fere, quas pustulæ commitantur, contagiosa est; plures namque ea correpti in eadem sæpe domo decumbunt.—— Quod vero jam cutim magis petat quam superiore mense, ob majorem aëris calorem esse arbitror, humores elicientem extra: medio enim Maio cum *atmosphæra*, pro anni tempore, erat maxime frigida, dolor ac faucium tumor urgebant gravissime.

Eadem omnino medendi methodus juvat usque; nunc porro *Mercurialia*, sine stimulis salinis præparata, aptissime adjecta sunt: quippe quæ in aliis cutaneis eruptionibus inveniuntur efficacia maxime, quidni & in his utilia sint? Ista utique vel in ipsis *variolis* prospero sæpissime eventu exhibui. Humores enim lentos nimium attenuant, glutinosa vasculorum repagula expediunt, saliumque cohæsiones diffringunt, succos demum morbosos fluxos reddunt, tandemque abigunt prorsus: dumque pondere solum & subtilitate partium agunt, sanguinem incendunt minime.

Julio.

Prior Julii pars fuit aprica satis, at subfrigida, ventus plerumque a Septentrione; medio mense Libs intervenit, pluvia ruente; tunc iterum Septentrio: a 25 ad 28 pluvius Vulturnus. Trigesimo primo, vento omni momento variante, immensa quantitas pluviae decedit, cataraetæ ad instar; inter horam octavam matutinam & meridiem ad digitum saltem integrum, licet milliariibus quindecim ad Orientem vix ulla. Aër fuit hoc mense valde humidus & Barometrum humile.

Pluvia $\frac{1}{12}$. $\frac{11}{13}$. $\frac{1}{14}$. 16. $\frac{1}{17}$. $\frac{11}{26}$ — $\frac{1}{29}$ — $\frac{111}{31}$.
 Dig. Dec.
 = 2982.

☿ Altitud. maxim. 5. 29,8. N 1. } media 29.4 $\frac{10}{31}$.
 — — minim. 26. 28,9. S E 3. }
 Dies frigid. 3. 38. N 1. } media Therm. Altitud. 30 $\frac{2}{31}$.
 — calid. 24. 24. Malacia. }

Febres intermittentes adhuc: Tusses frequentes inter adultos, *convulsivæ* inter pueros. Magnæ undique de spirituum languoribus querelæ. — Quamplurimæ aviculæ, dum plumas exunt, moriuntur.

Furit etiamnum febris *epidemica* inexplicabili quodam angore quosdam, vel intra sex sæpe dies, perimens. Hos leve primo corripuit delirium, quod utique peioris fuit ominis, quam si, more bacchantium, aperto exarserant furore. Nil perinde tunc profuit ac sanguinis detractio cucurbitulis scarificatis, humeris cervicibusque admotis; post *clysmata* laxantia, aut mitiora *cathartica*; frequentia porro *vesicatoria*, cruribus præcipue.

Augusto.

Augusto.

Suda tempestas initio, medio autem Augusto permulta pluvia, eoque quidem exeunte nimia. Libanotus frequens, isque ad finem maxime furens, *Barometrum* valde depreffit, aëremque reddidit humidissimum: maximæ fuerunt rorationes mensis principio, Aquilone spirante. Auster turbineus nocte inter 9 & 10 diem *Mercurium* præcipitavit plurimum gravissimamque pluviam; maris autem æstus extulit maxime.

Pluvia $\frac{''' }{9.}$ $\frac{' }{10.}$ $\frac{'' }{12.}$ $\frac{' }{13.}$ 14. $\frac{'' }{16.}$ 17. $\frac{' }{19.}$ 23.
Dig. Dec.
25. 26. $\frac{'' }{28.}$ $\frac{' }{29.}$ $\frac{'' }{30.}$ 31. = 4.022.

Procella 9. Nocte. SSE 4 — 28. Nocte. S W 4_x — 29. Nocte. S W 4_x. — 30. W S W 4_x. cum fulgure & tonitru.

☿ Altitud. maxim. 3. 29,8. N. 1. } media 29.3 $\frac{27}{31}$.
— — minim. 10. 28,7. SSW 3_x. }

Dies frigid. 31. 42. S W 3. } media Therm. Altit. 30 $\frac{26}{31}$.
— calid. 7. 24. N Nb W 1. }

Febris *epidemica* plures adhuc premit, ingenti sæpe cum vomitu & *diarrhœa*: *Ophthalmicæ* passim: Scabies valde frequens. *Variolæ* jam grassari incipiunt, ac febres lentæ *nervosæ*.

Plurimæ aviculæ canentes pereunt: perraro auditur stridula cicada. — Æstas fuit magis nubila, magis frigida, magis denique pluviosa solito: Omnia nunc loca aqua & limo plena sunt.

Septembri.

Toto fere Septembri ventus ex Occidente spiravit, ad Septentrionem vero majori ex parte deflectens, qui *Barometri mercurium* exaltavit:

H 4

manet

manet usque tamen *atmosphæra* madida & paulo frigidior.

Pluvia $\frac{u}{1.}$ $\frac{u}{2.}$ $\frac{1}{3}$ 8. 17. 20. $\frac{u}{21.}$ 22. — 24.
Dig. Dec.
 $\frac{u}{27.}$ 28. 30. = 1.752.

Parva AB. 9. H. 10. N N W. 1. Procella 21.
p. m. S W — 24. nocte. W S W. 4x.

Vehemens grando 22. W N W 2. Magna
pruina 26. Nb E 1.

§ Altitud. maxim. 17. 30,0. Malacia, } media 29.6 $\frac{3}{27}$.
— — minim. 1. 29.0. W 2.

Dies frigid. 26. 45. Nb E 1. } media Therm. Altit. 41 $\frac{10}{27}$.
— tepid. 1. 36. — —

Iam evanescit fere febris *epidémica*, nec multum augetur *variolarum* numerus. Cholerae, febres *nervosæ*, *miliares*, intermittentes, passim.

Octobri.

Initio Africus nimbosus multam demisit pluviam; quarto die sæviit Vultur; a decimo quinto ad vicesimum tertium perflavit Aquilo, & *Mercurium* erexit plurimum; sub finem Corus: aër frigidus est ac humidus.

Pluvia $\frac{u}{1.}$ $\frac{u}{2.}$ $\frac{u}{3.}$ $\frac{u}{4.}$ 5. 7 — 10. 11. 12. 13.
Dig. Dec.
 $\frac{1}{15.}$ 19. 21. 23. 26. 28. 29. = 3.154.

Fulgur & tonitru cum grandine 2. p. m. Grando 7. 8. Fulgur & tonitru 12. p. m. permagni maris æstus a 1 ad 4 diem.

§ Altitud. maxim. 22. 30,3. E N E 1. } media 29.5 $\frac{26}{30}$.
— — minim. 4. 28,8. SE b E. 3x.

Dies frigid. 19. 64. N N E 2. } media Therm. Altitud. 51.
— tepid. 1. 43. S W 4x.

Variolæ

Variolæ jam factæ sunt *epidemicæ*. Morbi colici a *pomaceo* novello frequentissimi. *Catarrhi* & faucium tumores haud rari; imo quædam adhuc reliquæ febris *epidemicæ* sparsim notantur. Febris *nervosa* & *miliaris* passim.

Novembri.

A primo Novembris, diem ad usque viceſimum, ventus inter Orientem & Septentrionem constitit, qui & paulo ficiorem reddidit *atmosphæram*, multoque magis frigidam, *Baroscopium* vero extulit maxime: inter diem autem 21 & 24, fremente Africo, permulta pluvia decedit, convergente admodum *Mercurio*; at brevi Aquilo re-
dux restituit rem.

Pluvia 1. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$. 10. 21. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. 29.
Dig. Dec.
= 2.068.

Gelu, idque subinde rigidum, hoc mense frequens.

☿ Altitud. maxim. 27. 30,4. NNE 1. } media 29,8 $\frac{2}{3}$.
— — minim. 23. 28,8 SW 3.

Dies frigid. 27. 68. NNE 1. } media Therm. Altit. 58 $\frac{2}{3}$.
— tepid. 2. 52. Malacia.

Variolæ & morbi colici valde *epidemicæ*: *Apo-plexiæ* plures: *Colica biliosa* passim.

Decembri.

Pluvia, procellosa, horrida tempestas hunc finivit annum. Vix unus & alter dies sine pluvia toto Decembri; Libs vehemens perfurebat sæpiſſime, gravi subinde cum pluvia: inde *Barometrum* erat frequenter * mire depressum. Jam magnæ sunt inundationes undique. Aër fuit
H 5 maxime

maxime humidus, gelu rarissimum, etsi *atmosphæra* fuit valde frigida sæpe.

Pluvia 1 — $\frac{'''}{4}$ — $\frac{''}{6}$. 7. $\frac{''}{9}$. $\frac{''}{10}$ — $\frac{'}{12}$ — $\frac{'''}{14}$. $\frac{'}{15}$ —
 $\frac{''}{17}$. 18. 20 — $\frac{'}{23}$. $\frac{''}{24}$. $\frac{''}{26}$ — 28. 29. $\frac{'''}{31}$ = 6.192. Dig. Dec.

Procella 1 SW — 10. p. m. SW b S 4 — 14.
 a primo mane S W 4^x — 26. W N W. — 27. W
 4^x — 29. WSW 4.

♀ Altitud. maxim. 25. 30, 0. NW b W 1. } media 29. $3\frac{9}{31}$.
 — — minim. 14. * 28, 2. SW 4^x.

Dies frigid. 22. 64. NNE 1. Gelu. } media Ther. Alt. $58\frac{4}{31}$.
 — tepid. 1. 52. WSW. 2.

Variolæ valde *epidemicæ* & sæpe mortiferæ:
 Colice jam non adeo frequens. *Rheumatismi* mul-
 ti; *Febres putridæ* & *petechiales* passim.

Maxima fuit pluviae quantitas hoc anno,
 Dig. Dec.
 nempe = 37. 114.



CONSTITUTIO AERIS, etc.

ANNO MDCCXXXV.

Januario.

QUAMVIS *Baroscopium* fuerat sublime valde initio Januarii, ventusque arctoüs; id tamen procellosa tempestas, a sexto ad decimum quartum fere perpetua, ac subinde gravissima, ad ultimum pene gradum deturbavit: quod autem postea, a die scilicet vicesimo ad finem usque, ad summum ferme erexit Aquilo. *Atmosphæra* fuit frigida & sæpe humida valde: sub mensis finem rigidum gelu.

Pluvia 2. 5. 6. 7. 8. 10. 11—13. 14. 18.
Dig. Dec.

19. 22. Nix 9. 11. = 2. 5 26.

Procella 6 nocte. SW 4_x—gravissima 8. S W 4^x circa meridiem *mercurium* depressit ad 28,3: —vehemens 10 nocte S S E 4^x. § 28,4; violenta duravit procella ad horam octavam matutinae diei undecimi; *Barometer* vero subsedit ad 28, 1: raro *mercurium Baroscopium* infra hunc gradum notavi!

§ Altitud. maxim. 4. 30,5. N b W 1. } media 29,6 $\frac{24}{30}$.
— — minim. 11. 28, 1. S 4^x. }
Dies frigid. 25 70. N 1. } media Therm. Altit. 59 $\frac{29}{30}$.
— tepid. 6. 54. S W 3. }

Variolæ sunt maxime *epidemicæ*, quædam valde malignæ; utpote quibus non raro accedunt *hæmorrhagicæ* ex omnibus fere corporis meatibus, & (A) *petechiæ* lividæ & nigræ. Vix unum vidi his correptum affectibus servatum; nam in tanta pesti-

pestilentia sanguinis *crasis* dissolvitur penitus, & maxime putrescunt humores: imo cruor emissus, putris instar saniei, diffluit; nec, ut solito, in frigore coagulatur.

Colicus morbus cum doloribus sævis *rheumaticis*, & *paresi* nonnunquam brachiorum manuumque, a pomaceo novello, frequens adhuc. Multæ tussis sub finem mensis: *ophthalmiæ*, febres *miliares* & *erysipelatosæ* passim.

Februario.

Sublimem retinuit stationem *Mercurius* ad diem usque decimum sextum, Septentrione afflante, aut Vulturno: sub finem madidus Notus *Baroscopium* demisit. Sudum haud raro eluxit hoc mense; Gelu affuit rarius.

Pluvia 8. 14. 17. 18. 22. 23. 26. 27.
Dig. Dec.
= 1.978.

Procella 26 nocte. SSW 4_x.

☿	Altitud. maxim.	2. 30,5.	NNE 1.	} media 29,7 $\frac{10}{25}$.
—	—	minim. 27. 29,0.	SSW 3 ^x .	
Dies	frigid.	21. 66.	ENE 1. rigidum Gelu.	} media Therm.
—	tepid.	9. 52.	Malacia. — —	
				Altit. 57 $\frac{18}{25}$.

Pleuritides & peripneumonix frequentes, at rure maxime: *Variolæ epidemicæ* adhuc, sed non ita pestiferæ.

Jam in popellum ingruit febris quædam contagiosa, pustulis sæpe & *petechiis* comitata: Merx admodum infelix! Classe, ut credere par est, advecta; quippe quæ diu ante inter nautas apud *Portum-magnum* commorantes sævierat, multosque dederat letho: de hac plura mense sequente.

Martio.

Martio

Varia fuit tempestas mense Martio, varia quoque *Barometri* statio nunc alta nempe, nunc valde depressa. Libs initio, a sexto ad decimum septimum Vulturus, tunc Aquilo, post Caurus: *Atmosphæra* era frigida satis, at paulo humidior.

Pluvia 1. 2. $\frac{''}{4.}$ $\frac{'}{5.}$ 14. $\frac{''}{15.}$ $\frac{''}{16.}$ $\frac{'}{23.}$ — $\frac{'}{25.}$
Dig. Dec.

28. 30. 31. = 2.234.

Maximus maris æstus 15 mane Sb E 3^x.

Gelu a 20 ad 23.

⌘ Altitud. maxim. 21. 30,0. NE 2. } media 29,3 $\frac{29}{30}$.
— — minim. 16. 28,7. SSE 3.

Dies frigid. 20. 64. Nb E 2. } media Therm. Altit. 54 $\frac{4}{30}$.
— tepid. 15. 50. Sb E 3.

Variolæ hæctenus *epidemicæ*: pleuritis & *peripneumonia* passim: apoplexiæ quædam.

Nunc maxime dispergitur contagium *epidemicum* in plebeculam maxime. — Quibus febris hæc contigit, primo levi quasi horrore, ac universa pene lassitudine, correpti sunt; mox nausea & vertiginoso capitis dolore: haud vehemens tamen infecuta febris est, nec immodica fitis, quamvis media lingua scabra fuit & fusca, imo sæpe arida valde, utroque vero a latere muco oblito subflavo. Interim de dolore gutturis, haud raro strangulante fere, & de teneris oculis, lumina refugientibus, multæ querelæ. Urinæ plerumque *χειρνωδεις* erant, aut tenues, paucæ, luridæ, vapidæ instar *cerevisiæ*: quæ quidem omnibus in febribus sunt pessimæ notæ!

Hæc ferme per quatrimum, quo aut vigiles omnino decubuerunt, aut ne sentientibus quidem brevissimus & maxime interruptus obrepfit somnus.

nus. Jam surditas, desipientia, suspirium frequens, immanis præcordiorum oppressio, manuum tendinumque tremor & subsultus accedebant: attamen de valetudine rogati vix querebantur quicquam, adeo invaluerat torpor.

Diem circiter sextum, nunc citius, nunc tardius, *petechiæ* rubræ, purpureæ, lividæ, nigræ, imo vibices quasi, sæpe apparuerunt. Mali admodum ominis hæc *exanthemata*! eoque peioris, quo magis ad nigritiem spectabant. Frequenter porro videbantur innumeræ maculæ minutissimæ fusci coloris, cutis lenticulas aut pulicum morsus adumbrantes, sed paulo magis atræ: quas utique haud minus esse lethales observavi quam ipsas nigerrimas. — In hoc rerum statu, aut sopor perpetuus urgebat, aut furor cæcus; imo sæpe haud erat assidentibus, etiamsi robustis, facile ægros continere, ne e lectulis exilirent, tanquam alio abituri: quo quidem symptomate vix aliud magis tunc funestum memini.

Tristia dum hæc agebantur, sudor profusus, viscidus, olidus, aut foetidissima, livida *diarrhæa* miseros colliquabat ægrotos. Lingua porro nigra, aridissima, vox faucibus hærens, singultus, *spasmi*, pulsus formicans, aut coacervatus, livor manuum, ac sæpe ipsorum etiam cubitorum, atræ mortis certissima instabant prænuncia: die undecimo, aut decimo quarto plerumque, multo citius nonnunquam. Tanta fuit, tamque cita putrefactio cadaverum, ut ea sepelire fuerit necesse prorsus aliquando vel intra horas viginti quatuor.

Dira quidem hæc & acerba maxime! erant autem plurimi, quibus fors melior, die scilicet quarto, aut quinto, benignum dedit morbi exitum; Eruptione nempe pustularum rubrarum,

miliari-

miliarium, atque blandi per totum corpus sudoris. — Multi diu morbo conflictati, innumeras tandem habuere pustulas *miliares*, limpidas, sæpe salutiferas: pluribus autem erat periculosa plenum opus aleæ.

Aprili.

A die secundo Aprilis ad decimum spiravit Eurus; post varius ventus variaque admodum tempestas, at pro anni tempore frigida & humida.

Pluvia 1. 8. 9. 10. 14 — 16. 18. 20. 22.
Dig. Dec.

24. 27. 29. = 2.252.

Ventus vehemens 22 prima luce. W N W.
Nox procellosa 26. S 4.

☿ Altitud. maxim. 16. 29,9. ESE 2. } media 29.5 $\frac{10}{29}$.
— — minim. 10. 28,8. SE 2. }

Dies frigid. 7. 54. EbS 2. } media Therm. Altit. 46 $\frac{20}{29}$.
— tepid. 25. 42. WNW 1. }

Auctus jam variolarum numerus est: atque modo febris *anginosa miliaris*, quæ verno tempore elapsi anni fuit hic *epidemica*, vicinam infestat regionem. — Febris contagiosa, maligna, sævit jam magis quam antehac unquam. Raro nunc adest strangulans faucium dolor, paucæque nunc erumpunt pustulæ; at loco earum *petechiæ* fusca, purpureæ, nigrae, ac nimis frequenter livida vibices, atro semper carbone notandæ! — plurimi moriuntur.

Maior.

Boreas afflavit, aut Corus, a primo ad vicissimum quartum Maii, post Vultur; Tempestas fuit

fuit valde frigida ac nubila. Maximæ pruinae a duodecimo ad decimum q^r artum.

Pluvia 1. 11. 12. 15. 17. 20. 22. 23.

Dig. Dec.

24. 26. 30. 31. = 1. 646.

Grando vehemens 23. Fulgur & tonitru 30.

⌘ Altitud. maxim. 19. 30, 1. N W 1. } media 29.6 $\frac{12}{31}$.
 — — minim. 16. 29, 1. S E 2. }

Dies frigid. 14. 54. N W 1. } media Therm. Altit. 43 $\frac{6}{31}$.
 — calid. 31. 36. S S E 1. }

Multi apoplexia corripiuntur: *Variolæ* adhuc. Febris contagiosa plurimos perdidit; optima sæpe sprevit consilia: sequens tamen methodus permultos servavit.

Ipso quidem morbi initio venæ sectio profuit, raro post unquam; imo temeraria suscepta manu sæpe obfuit maxime. Si tamen post sanguinis missionem *cephalalgia* & vertigo urgebant usque, fuit utile admodum cucurbitulis scarificatis, humeris cervicibusque admotis, sanguinem detrudere: quod quoque vomitionem, post excitandam, reddidit tutiorem. Cruorem vix unquam notavi valde glutinosum, serum plerumque vero viride erat, haud raro rubellum; quod infaustum semper! quibus enim id contigit, *petechias* nigerimas, aut vibices habuere certo certius cum phrenitide perpetua, aut gravi comate.

Continua fere nausea, ac frequens, biliosus vomitus lene semper poscebant *emeticum*, quo & ventriculi colluvies ejiceretur & præcautum foret contra pestiferam *diarrhæam*, quæ aliter morbi statu, aut paulo post, semper evenit: nam ubi ventriculi saburra, diutius morando, acrior fit assidue; tandem per intestina descendens, ista utique torquet maxime.

Nulla

Nullo non tempore morbi *epispastica*, alia scilicet aliis succedentia, necessaria fuerunt omnino; lenia porro desiderabant *cardiaca*, eaque repetita frequenter, languor continuus & collabentes assidue vires: quæ & sudores etiam maturos, criticosque sæpe, movebant, aut pustulas expellebant. Ad hæc promovenda Confect. Raleigh. Theriac. Andromach. Lap. Contrayerv. Rad. Serpent. Virg. aliquando Sal. C. C. &, quibus non fuit ingrata admodum, non uno solum nomine laudanda, Camphora (quæ nempe Opio felicius arcescebant somnum, ac delirium compefcebat magis) aptissima fuere remedia.—— Imo, quod multo minore pompa paratur, vinum rubrum *ustulatum* (quod dicitur) Cinnamomo & Maci incoctis cum aquæ pauxillo, haud minus efficax ad vires sustinendas inveni, quam celeberrima *alexipharmaca*; non in hoc tantum morbo, sed & in omni febre lenta & *nervosa*, potissimum cum coliquante sudore, vel immodico alvi fluxu declinante. Didici hinc tandem, quod astringentia aromatica mitiora *crasin* sanguinis firmando, fibrasque vasculorum corroborando, vera fuere hujus, exeuntis saltem, morbi *alexiteria*; fortasse & antidota fuissent.—— Ipsi etiam veteres antidotis & *alexipharmacis* immiscebant semper astringentia quædam medicamenta, ut passim apud eos videre est.

Ad eum adeo finem, optato demum cum successu, post summum morbi incrementum, exhibui aliquam ex cortice Peruviano medicinam cum *alexipharmacis* idoneis & Elixire Vitrioli Myasichti acidulatam; nec otiose interea expectans sedimentum urinæ laudabile, & quod dicitur *latteritium*: modo scilicet vel minimam morbi remissionem observassem.— Si in singulari gan-

I græna

græna valeat quinquina, quidni in universa humorum corruptione? *Exanthemata nigra*, vibices & citissima cadaverum putrefactio, *gangrænosam* utique sanguinis *diathesin* significabant.

In longis equidem febribus nihil magis necesse est, quam solida inter & fluida æquilibrium conservare debitum. Nihil ad id sane facit efficacius, quam, diluente liquore, sanguinem fovere assidue, ac vim fibrarum confirmare medicamentis appositis; donec natura, his auxiliis morbi victrix, læta crisi eum expellere possit: nam ut febris ardens fræna semper poscit, lenta sæpissime indiget calcaribus. — Profecto nunquam non arte molienda crisis est, cum nil ultra assequi valeat natura. — Febribus ideo tarde admodum decrefcentibus, lenia *cathartica* sæpe ex usu sunt maxime, *cardiacis* interim assumptis: In hac sane, de qua agitur supra, cum vix alia profecerint, *rhabarbarum* exhibitum quotidie valuit plurimum, vinum ustulatum interim affatim forbendo: hoc modo enim putris expurgata fuit colluvies, & viribus interea consultum est optime.

Junio.

Caurus hoc mense spiravit sæpissime, hiscebat etiam subinde Libs: Vulturnus a decimo nono ad vigesimum secundum. Aër erat plerumque valde frigidus, crassus & humidus.

Pluvia 1. 3. 4. ^{III}11. 15. 16 — ^{II}18. ^I19. 20.
Dig. Dec.

— 22. 25. 26. 28. = 1.936.

♀ Altitud. maxim. 5. 29,9. NW 1. } media 29.5 $\frac{7}{9}$.
— — minim. 18, 29,1. SW 3. }

Dies frigid. 2. 44. NW 1. } media Therm. Altit. 36 $\frac{5}{9}$.
— tppid. 14. 34. Malacia. }

Variolæ,

Variolæ, & febres intermittentes, haud infrequentes. Febris *miliaris* rubra cum enormi vomitu & alvi fluxu rure grassatur usque. Morbus contagiosus modo sub finem mensis mitescit paululum.

Julio.

Aër fuit humidus maxime & frigidus toto Julio, ventus ab Occidente plerumque & plagis australibus, Eurus aliquando: Tempestas utique fuit nubila, pluvia, infausta admodum, hyemi magis quam æstati similis. Omnes fructus *ωραίοι* acerbi sunt & immaturi. Vix audis cicadam, rari volitant papilionēs: Plurimæ aviculæ canentes inter plumas exuendas intereunt.

Pluvia 1 — $\frac{m}{3}$. $\frac{1}{6}$. 7. 10. $\frac{m}{11}$. 12. $\frac{m}{14}$. $\frac{m}{15}$.
Dig. Déc.

16. 19. 21. 22. $\frac{m}{25}$. — 27. 30. = 3.536.

Procella 11. nocte. WbS. Tonitru 30. p. m.
Coruscationes nocte.

⌘ Altitud. maxim. 28. 29,7. SE 1. } media 29.4 $\frac{4}{5}$.
— — minim. 16. 28,9. SW 3x. }

Dies frigid. 19. 42. S S W 2. } media Therm. Altit. 34 $\frac{28}{35}$.
— tepid. 30. 30. W 1. }

Febris *epidemica* contagiosa hic imminuta est valde, at sævit adhuc in vicinia: Multi *variolis* usque laborant; (B) Pfora frequens.

Augusto.

A die secundo Augusti decimum tertium adusque ventus perpetuus ab Oriente spiravit, pulchra interea calidaque tempestas eluxit, postea misera, procellosa & horrida secuta est; nunquam memini, *atmosphæram* ita humidam fuisse hoc

anni tempore: Omnia fere loca aqua exundant & limo. — Plures aviculæ canentes moriuntur: Apes exanimatæ parum mellificant. Folia arborum æque sunt decidua jam, ac si exiisset Autumnus.

Pluvia 1. 2. $\frac{u}{14}$. 18. $\frac{u}{19}$. $\frac{u}{21}$. $\frac{u}{22}$. $\frac{u}{23}$. 25.
Dig. Dec.

— 29. 31. = 2.906.

Maximæ rorationes, durante apricitate, mensis initio.

Magna AB. 20. N W 1. Procella 22. p. m. S W — vehemens 23 nocte. S S W.

♀ Altitud. maxim. 12. 29,9. E 1.	} media 29.6.
— — minim. 22. 29,2. S W 4x.	
Dies frigid. 27. 42. W N W 1.	} med. Therm. Altit. 32 $\frac{5}{8}$.
— calid. 13. 26. E 1. —	

Fatales etiamnum reliquiæ passim febris malignæ: *Variolæ* adhuc: Scabies & pfora frequens, cholerae ac *diarrhææ* plurimæ. Permulti, gravi quasi tempestate perculsi, inerte quadam fœcordia torpent. — Plures canes rabidi discurrunt.

Septembri.

Nubilus fuit, madidus & frigidus hic mensis; Caurus afflavit sæpe, Libs aliquando, Eurus frequenter, sub finem præcipue: Boreas 8, 9, 10.

Pluvia 1. 3. 6. 7. $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{12}$ — $\frac{1}{14}$ — $\frac{u}{16}$. $\frac{1}{17}$.
Dig. Dec.

18. 20. 22. 24. $\frac{1}{26}$. 28. 29 = 1.918.

♀ Altitud. maxim. 23. 29,9. E. 1.	} media 29.6 $\frac{7}{80}$.
— — minim. 11. 29,2. W N W 1.	
Dies frigid. 23. 46. S E 1.	} media Therm. Altit. 36 $\frac{1}{4}$.
— tepid. 3. 30. N W 1.	

Febres

Febres *petechiales* sparsæ adhuc: *Variolæ* frequentes: *Diarrhæa* & cholera multos infestant: Tussés plurimæ ad finem mensis.

Octobri.

Venit ab Oriente ventus fere constans per totum Octobrem, initio & fine ad Septentrionem inclinans; unde aër tenuis factus est, at paulo frigidior: medio autem ad Austrum.

	$\frac{''}{7}$	$\frac{''}{8}$	—	10.	12.	$\frac{''}{14}$	$\frac{''}{26}$	$\frac{'''}{27}$	Dig. Dec.
Pluvia	7.	8	—	10.	12.	14.	26.	27.	= 2.756.
Levis AB.	3.	Malacia		—	4.	E. 1	—	12.	N 1,
Gelu & maxima pruina	30.				ENE	1.			

✕ Altitud. maxim.	30.	30,1.	ENE	1.	} media 29.6 $\frac{1}{3}$.
— — minim.	9.	29,1.	WNW	1.	

Dies frigid.	30.	64.	} media Therm. Altitud. 47 $\frac{2}{3}$.
— tepid.	26.	40.	
		SSE	2.

Multæ febres lentæ, ac intermittentes, passim. Aliqui hoc mense, subito quasi asthmate correpti, in tumores pedum & abdominis, hydropicos velut, inciderunt, ex quibus nonnulli brevi sunt mortui.—— Multi canes rabie perciti.

Novembri.

Sequitur November pluvius admodum & procellosus, sub finem præcipue: turbidus Auster prævaluit maxime, crassamque fecit *atmosphæram* ac humidam valde.—— Exeunte mense permagnæ inundationes undique.

	$\frac{''}{4}$	$\frac{''}{5}$	$\frac{''}{7}$	$\frac{''}{9}$	$\frac{''}{10}$	$\frac{''}{13}$	$\frac{''}{14}$	$\frac{''}{15}$	$\frac{''}{17}$
Pluvia	4.	5	—	7.	9.	10.	13.	14.	15 — 17 —
	$\frac{''}{19}$	$\frac{''}{21}$	$\frac{''}{23}$	$\frac{''}{25}$	$\frac{''}{26}$	$\frac{''}{27}$	$\frac{''}{29}$	Dig. Dec.	
	19.	21	—	23 — 25.	26.	27	—	29	= 4.922.

Procella 9 ab hora 10. a.m. ad 2. p. m. SWS
 4^x — 23. tota die SW. — 26 Nocte S 4^x — 27. S 4^x —
 I 3 Ma-

Maximi maris æstus 27, quamvis luna jam erat in quadratura; altiores etiam quam si interlunium fuisset, aut plenilunium. Tonitru vehemens 24 noctu.

♂ Altitud. maxim. 11. 30,0. NW 1. } media 29.4 $\frac{1}{3}$.
 — — minim. 27. 28,4. S 4^x. }
 Dies frigid. 1. 58. Malacia. } media Therm. Altit. 49 $\frac{1}{3}$.
 — tepid. 19. 44. SSW 2. }

Cephalalgia, vertigines, insultus epileptici, tumores faucium & parotidum, frequentes: *dyspnoica* pectoris gravitas haud paucos premit. * Febres lentæ *nervosæ* plurimæ. — Multi canes rabiosi circumcursant.

Decembri.

Vix unquam *atmosphæram* memini ita humidam fuisse, ac erat toto Decembri; etsi Subsolanus perflabat sæpissime: fateor equidem, quod madidus notus intervenit frequenter, ac pluviae haud parum demisit.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 4. $\frac{1}{5}$. $\frac{1}{6}$. 7. 9. 17. 19. $\frac{1}{24}$. $\frac{1}{25}$.
 Dig. Dec.
 $\frac{1}{28}$. $\frac{1}{30}$. $\frac{1}{31}$. = 2.364.

Gelu rigidum 12. 66. EbN 1 — 13. 64. E 1 — 16. E 1 — 23. 64. E 1.

Procella 24 Nocte. SbE — 27. S W b W 4^x.
 Maximi maris æstus 21. 22. FSE 2 — permagni 24. 25. 26. Austro furente.

♂ Altitud. maxim. 21. 30,0. EbS 2. } media 29.6 $\frac{5}{7}$.
 — — minim. 28. 29,0. SW b W 3^x. }
 Dies frigid. 12. 66. EbN 1. } media Therm. Altit. 54 $\frac{8}{7}$.
 — tepid. 1. 46. WbS 2. }

Tufles

* Vide Dissertationem de Febre lenta nervosa, infra.

Tussis, colli fauciumque tumores, raucedines, levi sæpe cum febricula, sunt valde frequentes. Febres putridæ *nervosæ* passim.

Dig. Dec.

Summa pluviae hoc (C) anno est = 30.974.

Notationes quædam.

(A) Hæ maculæ oriri videntur ab infractis, aut dissolutis, sanguinis globulis, *arteriolas sero-fas* intransibibus; dumque ibi hærent, *petechias* formant, aut vibices: velut in contusionibus sanguis ruber in vasa iniqua urgetur, & cutim reddit discolorum. — Pestiferæ semper sunt, quod cruorem putridum esse, aut maxime solutum, denotant: imo adeo sæpe dissolvitur sanguis, ut profusæ subsequantur *hæmorrhagiæ*. Quod quidem *scorbuticis* quoque accidit crebro, cum ne vel minima febris signa adsint, etsi totus fere corporis habitus innumeris violaceis maculis inficitur; qui tamen mox, ac ne quidem tale quid somniantes, funesto sæpe sanguinis fluxu corripuntur: iste tamen cruor nunquam, more solito, concrevit. — Hos certe *scorbuticos* austera acida, opportune data, adjuvant maxime, ut haud raro notavi. — In talibus ideo *variolis*, & aliis maculosis febribus, valeant plurimum. — Missio sanguinis utique obesse magis, quam prodesse, videtur.

(B) Estne peculiaris aliqua *atmosphæræ* constitutio ad eruptiones cuticulares gignendas apta? utique per idem fere tempus, quo *variolæ*, aut pustulosæ febres, grassantur, *exanthemata* quoque omnigena, ut papulæ, scabies, erysipelas, &c, infestare solent, ut observatur sæpissime: imo dudum, & vulgo noverint vel mulierculæ, quod

morbilli, aut *rubeolæ*, *variolas* plerumque præcur-
runt. Nonne adeo desumendum sit hinc moni-
tum *prophylacticum*? — Forte lenia *Mercurialia*,
quæ in aliis cutis morbis tantum valent, tempe-
stive assumpta, aut *variolis* sint antidota, aut
morbum saltem faciant leviolem; idque potissi-
mum cum & vermiculos enecent, qui junioribus
præcipue adeo infesti sunt, & tam diras sæpe
(una sævientibus *variolis*) movent tragœdias. —
Hæreo tamen ne forte sanguinem quorundam dis-
solvant nimium, & ad *hæmorrhagias* disponant fa-
tales: hoc autem ex facili præcaveri potest corti-
cem peruvianum, aut tale quid exhibendo simul.

(C) Annis maxime pluviosis hic debet annu-
merari, ob frequentiam saltem, si non ob pluvie
quantitatem; nam continua fere decedit, quanquam
raro admodum gravis. Imbres utique vehementes
aërem faciunt sicciorem, quatenus vapores per *at-
mosphæram* congestos deturbant; hinc post eos pler-
umque aër purus valde & liquidus apparet, & multo
majorem ejus siccitatem *Hygrosopia* indicant: den-
sa autem, & nebulosa quasi pluvia, omnia humectat
maxime. — Vix unquam sane memini *atmosphæram*
magis fuisse humidam & crassam, quam hoc & elap-
so anno; Hyems fuit tepida nimis, æstas perfrigida;
utraq; infausa semper & pluvie ferax, ac nunquam
non morbis abundans. — Ex quo sane tam udas ha-
buimus tempestates, febres putridæ, lentæ, *nervosæ*,
ac intermittentes omnigenæ, per has regiones graf-
satæ sunt maxime; etiam in hoc oppido & per vici-
niam, cum tamen annis abhinc viginti veras inter-
mittentes rarissime viderim. Imo bene memini mi-
lites plurimos, emeritos, ad arcem nostram olim
transvectos ab oris Icenis & portu magno, per-
tinaci admodum quartana tantum non confectos
penitus; qui tamen hic, a sola benignitate cœli,
convaluere protinus.

CON-

CONSTITUTIO AERIS, etc.

ANNO MDCCXXXVI.

Januario.

TRISTI sub aspectu annus exoritur: dum enim *madidis Notus involat alis*, perpetuæ fere ruunt pluviae. Paucissimi sane fuere dies aprici toto Januario: *Atmosphæra* vero quam maxime humida & crassa; exeunte mense algida. Gelu raro admodum, diluvia sæpe.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. 4. 6. 8—10. $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{12}$ —
 $\frac{1}{14}$ — $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{18}$. $\frac{1}{19}$. 21—23. $\frac{1}{24}$. $\frac{1}{25}$ —28. $\frac{1}{30}$.

Dig. Dec.

31 = 5.070.

Grando 2. 13. 20. 26. Fulgur & tonitru cum pluvia gravissima 16. Vesperi.

Gelu 16. NNW 1—22. NNW 1. Procella 25. Vespere. SSW.

♀ Altitud. maxim. 6. 29,8. WNW 2. } media 29.22 $\frac{2}{3}$.
 — — minim. 25. 28,7. SSW 4. }

Dies frigid. 22. 66. NNW 1. } media Therm. Altit. 56 $\frac{1}{3}$.
 — tepid. 4. 50. S b W 2. }

Multi tussi vexantur, fauciumque & parotidum tumore. Apoplexia & *paraplegia* passim: Prurigo & pustulæ frequentes.

Februario.

Quamvis initio Februarii tempestas fuit nimbofa valde, mox tamen successit apricitas aliqua, ac frigus acre, flante plerumque vento aquilona-

nali, qui aërem siccebat plurimum, & omnia sæpe rigido constrictis gelu. Principio mensis inundationes permagnæ; post etiam *satis terris nivis atque grandinis misit pater.*

Pluvia	1.	2.	3.	5.	7.	8.	9.	14.	26.	} Dig. Dec. = 3.082.
Nix	16.	17.	NNW	1	—	19.	SSE	1		
—	20.	E	3	—	23.	NNW	3	—	24.	
W	1.	—	—	—	—	—	—	—	—	
Grando	2.	WNW	2	—	19.	21.	24			
—	26.	ESE	2	—	28.	NNW	1.			}

Leves *AB.* 7. ESE 1 — 19. EbS 1 — magna *AB.* 6. H. 8. p. m. N 1. Radii coruscantes vibrantur vel ab ipso Austro, corona lucida magis vergit ad Orientem, quam vidissem antehac unquam.

Magnus erat hic maris æstus Die 16, NNW 3, at minime inundans ut apud Londinenses, Icenos, Cantianos atque Belgarum oras, ubi quam maximus fuit.

☿	Altitud. maxim.	29.	30,0.	NbE	2.	} med. 29.6 $\frac{19}{28}$.
—	—	minim.	22.	28,5.	WSW	2 ^x .
Dies	frigid.	13.	72.	NNE	1.	} media Therm. Altit. 60 $\frac{6}{28}$.
—	tepid.	2.	56.	WNW	2.	

Tusses & *catarrhi* levi sæpe cum febricula permulti; Anginæ, pleuritides & peripneumonix haud raræ: Juniores quamplurimos perniones vexant maxime.

Martio

Frigida tempestas ad diem usque decimum Martii post autem multo tepidior evasit: Spiravit Eurus hoc mense sæpissime, & pulchra non raro affulsit apricitas cum aëre puro siccoque.

Pluvia

Pluvia 1. 6—8. $\frac{9}{11}$. 19. $\frac{41}{21}$ —23. 27. $\frac{41}{29}$.
Dig. Dec.

Nix 3. E 3—8. NW 1. = 2. 138.

§ Altitud. maxim. 1. 30, 0. E b N 2. } media 29.4 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$.
— — minim. 22. 28, 8. S S E 2. }

Dies frigid. 7. 66. NW 1. rigid. Gelu & maxima Pruina. }
— tepid. 27. 45. S S E 2. media Therm. Altitud. 51. $\frac{8}{31}$. }

Perniones ulcerosi molestissimi frequenter:
Peripneumoniæ passim, præcipue vero nothæ.

Aprilis.

Eurus afflavit sæpe, Boreas nonnunquam,
Caurus frequenter, hoc mense; quod *Barometrum*,
diu depressum, resurgere fecit, nubesque
abegit: a decimo quinto tamen ad vicesimum
quintum pluvia frequens.

Pluvia 1. $\frac{1}{15}$ — $\frac{1}{18}$ — $\frac{1}{21}$. 22. $\frac{1}{25}$. Grando 15.
Dig. Dec.
= 1.340.

Pruina maxima 11. 12. Maximæ rorationes
ad finem.

§ Altitud. maxim. 3. 30, 1. E 1 } media 29.7 $\frac{1}{2}$.
— — minim. 25. 29, 3. W S W 1. }

Dies frigid. 11. 58. N 1. } media Therm. Altit. 43 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{5}$.
— tepid. 29. 32. Malacia. }

Pleuritides & peripneumoniæ frequentes, An-
ginæ & *ophthalmiæ* passim.

Majo.

Perflavit Eurus plerumque durante Maio, is-
que sæpe velox, ac deprimens *mercurium barosco-*
picum, Aquilone tamen, aut Coro, nonnunquam
intercurrente. Ineunte mense frigora pro anni
tem-

tempore haud exigua, post vero aër tepidus sæpe & tenuis.

Pluvia $\frac{''' }{2.}$ $\frac{'' }{4.}$ $\frac{'' }{5.}$ $\frac{'' }{9.}$ 11. $\frac{''' }{12.}$ 15. 16. $\frac{''' }{22.}$
Dig. Dec.

23. $\frac{'' }{27.}$ = 2.536.

Ventus vehemens 21. p. m. E S E. Magnus halo circa lunam 9. H. 10. p. m. E 2 — permagnus igneus halo 11. H. 10. p. m. S E 3.

♀ Altitud. maxim. 19. 29,8. E S E 2. } media 29,5.
— — minim. 12. 29,1. S E 3.

Dies frigid. 3. 52. N N W 1. Frigus insolitum! } med. Ther.
— tepid. 31. 27. N N W 1. — — — } Alt. $39\frac{10}{31}$.

Pleuritides & peripneumoniæ sparsim: Eruptio pustularum rubrarum urentium plures molestat. Tempestas infesta tabidis.

Junio.

Per initia Junii aër valde crassus fuit & humidus; tenuis post, ac fervidus sæpe finem adusque fere mensis, maximo decidente rore: dum incerto admodum cursu spiravit ventus; Eurus sæpe, Boreas haud raro, Caurus quoque interfuit frequenter, Libs initio.

Pluvia $\frac{'' }{3.}$ 4. 6. $\frac{'' }{13.}$ 14. 23. $\frac{'' }{27.}$ $\frac{'' }{29.}$
Dig. Dec.
 $\frac{''' }{30.}$ = 1.614.

Fulgur & tonitru 29. Nocte. S E 2 — è longinquo 23 — 28. p. m.

♀ Altitud. maxim. 18. 29,9. N N E 1. } med. Barom. Alt.
— — minim. 27. 29,3. E S E 2. } 29.6 $\frac{3}{30}$.

Dies frigid. 6. 38. W N W 1. } media Therm. Altit. 26 $\frac{6}{33}$.
— fervid. 11. 20. N N E 1 $\frac{x}{x}$.

Febres tertianæ, semitertianæ, & quotidianæ, passim; ophthalmiæ frequentes: Phthifici colliguntur

quantur maxime. Aliquæ pleuritides & peripneumonix incipiente mense: *psorica* eruptiones plurimæ. — Innumeri aëli armenta molestissime infestant.

Julio.

Varius fuit hoc mense ventus, & Malacia frequens, Caurus vero sub finem plerumque, fundo existente cælo, ac fervido, cum rore maximo. Immensa vis pluvix decidit die secundo & octavo, flante Vulturno; decimo autem, eodem perflante vento, quantum vix unquam per idem temporis spatium; ab hora enim istius diei tertia pomeridiana ad quintam matutinam

Dig. Dec.

undecimi pluvia fuit 1,686.

Pluvia 1. ^{'''} 2. ^{'''} 3. ^{'''} 8. ^{'''} 10 — 12 — 14. ^{''} 19. 25.

Dig. Dec.

28 = 4.870.

Procella 2 nocte. S E. Fulgura noctu 13.

♀ Altitud. maxim. 16. 29,9. Malacia. } media 29.5 $\frac{2}{3}$.
— — minim. 11. 29,1. SSE 2^x. }

Dies frigid. 4. 40. N 2. } media Therm. Altit. 27 $\frac{1}{3}$.
— fervid. 29. 18. WNW 1. }

Febres intermittentes & *miliares* aliquæ mali admodum moris, ruri præcipue: *Variolæ* hic *sporadicæ*: Cholerae, *diarrhææ*, ac *dysenterix* etiam, undique valde frequentes sunt.

Augusto.

Ineunte Augusto aër fuit crassus & valde calidus, medio mense multo frigidior, flante Cauro; cæterum ventus erat inconstans maxime: sub finem ros plurimus decidit, ac rediere calores.

Pluvia

Pluvia 1. $\frac{''}{4}$. 6. 7. 8. $\frac{'}{12}$ — $\frac{''}{14}$. $\frac{''}{15}$. 17. $\frac{'}{26}$.
Dig. Dec.

28. 31. = 1.834.

Nox procellosa valde 13. S W b W 4. Fulgura 20 noctu. Magni maris æstus 26. 27. S S E 2^x.

Die 25. W 1. inter horam nonam vespertinam & undecimam zona quædam angusta, at lucida valde, ab imo Occidente ad summum Orientem usque extensa, magnæ Iridis instar effulsit, stupente populo. AB. 29. N 1.

☿ Altitud. maxim. 18. 29, 8. NW b N 1. } media 29.4 $\frac{1}{3}$ $\frac{7}{8}$.
— — minim. 26. 29, 1. S S W 2.

Dies frigid. 16. 42. W N W 1. } media Therm. Altit. 27 $\frac{7}{8}$.
— fervid. 3. 19. W S W 1.

Febres *miliaries*, malignæ, frequentes, in Cornubia præsertim. Cholerae, *diarrhææ*, *dysentericæ* eæque aliquando cruentæ, frequentissimæ.

Mellificant apes optime; plurimæ cicadæ & vespæ. Optimum undique frumentum.

Septembri.

Flavit plerumque Corus mense Septembri, initio & sub finem pluvia: altam fere tenuit stationem *Barometer*: Aër majore ex parte crassus.

Pluvia 1. 3. $\frac{'}{4}$. $\frac{''}{6}$. 8. 10. 13. 15. $\frac{'}{22}$ —
Dig. Dec.

$\frac{'}{24}$. 26 — 29 = 1.512.

Leves AB. 26. 27. H. 9. NW 1. Maximus halo circa lunam 12. H. 11.

☿ Altitud. maxim. 21. 30, 0. NNE 1. } media 29.7.
— — minim. 30. 29. 3. S W b S 3.

Dies frigid. 18. 50. maxima Pruina NNW 1. } media Therm.
— calid. 7. 29. S W 1. — — — — — } Alt. 36 $\frac{2}{3}$.

Cholerae

Choleræ, diarrhææ, dysentericæ, adhuc valde frequentes, febre nonnunquam comitante.

Plurimæ febres *miliares*, *scarlatinæ*, pustulosæ; aliquæ porro lentæ, *nervosæ*: sæpe cum glandularum parotidum fauciumque tumore, ac profusis semper sudoribus: Australibus in oris Devonicæ & Cornubiæ præsertim.

Octobri.

Ineunte & exeunte Octobri immensa pluvie copia decidit, dum Libs sæpe fremuit vehementer; a duodecimo autem ad vigesimum primum ne minima pluvia, Euro flante, aut Aquilone: ad finem mensis aër erat valde crassus & humidus.

Pluvia $\frac{iii}{1.} - \frac{o}{3.}$ 6. $\frac{ii}{7.} - \frac{ii}{9.}$ $\frac{iii}{10.}$ $\frac{iii}{11.}$ 22. $\frac{ii}{23.}$
 $\frac{ii}{26.}$ $\frac{ii}{27.} - \frac{ii}{29.}$ $\frac{ii}{30.}$ $\frac{iii}{31.} = 6.534.$ Dig. Dec.

Procella 1. multo mane. Sb W — 7. SW — 9. Mane. S W b W 4^x. ab hora autem prima ejus diei pomeridiana ad tertiam usque Corus vehementissimus, quasi circius Gallicus omnia deturbans, perfremuit, velocissime cadente *Mercurio*. — Maximus halo subluteus circa lunam 6. H 8. W 1. AB. 27. H. 8. W N W 3. media autem nocte grando gravis & fulgura.

☿ Altitud. maxim. 21. 30,1. NNE 1. } media 29.4 $\frac{1}{3}$.
 — — minim. 9. 28,4. NW 4^x. }
 Dies [frigid. 12. 54. NNE 1. } media Therm. Altit. 42 $\frac{1}{3}$.
 — — 16. 36. ESE 1. }

Febres lentæ, *nervosæ*, *miliares*, haud paucæ, cum sudoribus profusis: Choleræ ac *dysentericæ* adhuc passim; præcipue mensis initio: Sub finem tusses *ferinæ* inter pueros.

Morbus pestilens boves consumit plures & porcos in australi Devoniam.

Novembri.

Altum plerumque tenuit gradum *Barometer* hoc mense: Ventus ab Oriente sæpe spiravit, sæpe & a Septentrione. Aër fuit non raro valde humidus & gelidus sæpe: Initio glacies, ad finem gelu maximæque Pruinae.

Pluvia 1. 6. $\frac{1}{7}$. 9. 11. 12. 16. 18. 21.
Dig. Dec.
 $\frac{11}{24}$. $\frac{1}{25}$. 28. = 1.150.

Procella vesperi. 24. S W b W, & tota fere nocte grando multa 7.

AB. levis, 7. NE 1 — major 8. H. 10. NNE 1. magna variegata 13. H. 7. NW 1.

♀ Altitud. maxim. 5. 30,3. ENE 1. } media 29.8 $\frac{2}{9}$.
— — minim. 25. 28,8. W 2. }

Dies frigid. 27. 65. ENE 1. } media Therm. Altit. 58 $\frac{2}{9}$.
— tepid. 22. 44. WNW 1. }

Dysentericæ adhuc: Tussis *convulsiva* passim. Innumeri fere tussi, coryza, tumoribus colli ac faciei, corripuntur; haud pauci angina. Plurimi morbo *rheumatico* vexantur.

Decembri.

Perstat usque *Mercurius* altam tenere stationem, etsi medio mense Libs furens istum deturbavit, plurimamque demisit pluviam, *atmosphæram* vero fecit humidissimam. Sane ab exitu Octobris, ad hoc usque tempus, aër immensa vaporum copia abundavit, quæ, partim saltem, *Mercurium* sustinuit.

Septen-

Septentrio gelu nonnunquam produxit, idque sub finem mensis rigidum.

Pluvia $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{3}$ 3. $\frac{1}{4}$ 4. $\frac{1}{5}$ 5. 10 — 13. $\frac{1}{14}$ 14. $\frac{1}{15}$ 15 — 17.
Dig. Dec.

$\frac{1}{18}$ 18 — 20. $\frac{1}{22}$ 22. $\frac{1}{25}$ 25. 27. 28. 31 = 5.026.

Fulgur & tonitru cum vehemente grandine
6. primo mane. WNW 4x.

Procella 17. Nocte. WSW — 20 bene mane.
SWbW.

§ Altitud. maxim. 24. 30,4. N 1. } media 29,7 $\frac{1}{2}$ $\frac{8}{9}$.
— — minim. 20. 29,1. SWbW 4. }

Dies frigid. 25. 70. N 1. } media Therm. Altit. 55 $\frac{2}{3}$ $\frac{8}{9}$.
— tepid. 14. 43. S W 3. }

Diarrhææ & dysentericæ adhuc; *Rheumatismus* frequens & *icterus*: maximæ querelæ de languido virium statu undique. — Tumores faucium, glandularum, parotidum, ac maxillarum; Tusses, destillationes, coryzæ, raucedines, levi non raro comitante febricula, per omnes undique. Plures vel in iisdem ædibus simul & semel corripuntur; evanuerè vero hæc omnia facillime, modo se in lectulo paululum continerent, & multa tepida potione sudores elicerent.

Tota pluviae quantitas Anno MDCCXXXVI.

Dig. Dec.

= 36.706.



CONSTITUTIO AERIS, etc.

ANNO MDCCXXXVII.

Januario.

ATMOSPHERA, innumeris adhuc gravata vaporibus, *Mercurium Barometricum* sustinet usque ad stationem sane præaltam, Cauro plerumque spirante. Aër interea æque humidus esse perstat, ac si afflaret madidissimus auster; irruit quidem medio mense Libs, durans tamen parumper: a vicesimo primo ad vicesimum quintum gelu.

Pluvia 2. 7. 12—14. $\frac{1}{16}$. $\frac{11}{17}$. 26. 27. 29. $\frac{1}{30}$. Nix 24. Grando $\frac{1}{28}$. = 1.588.

Halo circa lunam magnus omni nocte a 27 ad finem.

§ Altitud. maxim. 19. 36,6. N 1.	} media 30.1 $\frac{6}{30}$.
— — minim. 17. 29,6. S W 2.	
Dies frigid. 25. 70. Malacia.	} media Therm. Altit. 55 $\frac{9}{30}$.
— tepid. 1. 48. W 1.	

Febricula *catarrhalis* innumeros etiamnum infestat, prout mense Decembri: imo & jam quamplurimi equi eodem pene morbo affici videntur, quorum certe pereunt plures. Haud parce quoque grassantur pleuritides ac peripneumoniæ, nothæ præcipue: nec infrequens est icterus.

Februario.

Ventus occidentalis hoc mense prævaluit, ad Septentrionem sæpe, ad Austrum vero flectens sæpius; Aquilo nonnunquam, aliquando Vultur-

nus,

nus, interfuit: humidus permanfit aër, at fubfe-
dit *Barometer*.

Pluvia $\frac{''' }{1.}$ $\frac{'' }{3.}$ $\frac{''' }{6.}$ 8. 11. $\frac{'' }{13.}$ 14. $\frac{'}{15.}$ $\frac{''' }{16.}$
Dig. Dec.

17. $\frac{'' }{18.}$ 19. $\frac{'' }{21.}$ $\frac{'}{24.}$ Grando 25. 26 = 3.488.

Maxima pruina & gelu 5. 6. 8. 9. Procella,
fulgur & tonitru 17. nocte. W b N. Maximus
halo circa lunam 27. 28.

♂ Altitud. maxim. 9. 30,2. N b E 1. } media 29.7 $\frac{10}{27}$.
— — minim. 16. 29,2 S W 3^x

Dies frigid. 2. 66. N 1. } media Therm. Altit. 55 $\frac{3}{27}$.
— tepid. 23. 49. S W b W 2.

Mutli *rheumatismo* & angina laborant, plurimi
adhuc morbo *catarrhali* pulmonario. *Variolæ* hic
sporadicæ, multis in locis *epidemicæ*. Tussis an-
ginosa durat usque inter equos.

Martio.

Principio & fine Martii Eurus afflavit, aut
Boreas, medio autem plerumque Corus: Aër
evalit tenuis magis & ficcus ad finem præcipue;
delapsis scilicet jam vaporibus.

Pluvia $\frac{''' }{7.}$ $\frac{'}{8.}$ $\frac{'}{10.}$ 11. $\frac{'' }{13.}$ $\frac{'' }{14.}$ $\frac{'}{15.}$ $\frac{'}{16.}$ — 18.
Dig. Dec.

$\frac{''' }{19.}$ $\frac{'}{20.}$ $\frac{'' }{21.}$ $\frac{'' }{22.}$ $\frac{''' }{30.}$ 31. = 4.328.

Levis AB. 7. W N W 1 — 18. N W b W 3.
Procella 18. a. m. S 4^x.

♂ Altitud. maxim. 6. 30,1. NNE 1. } media 29.5 $\frac{12}{30}$.
— — minim. 14. 28.8. W b N 3^x.

Dies frigid. 6. 64. rigidum Gelu. } med. Therm. Altit. 52 $\frac{2}{3}$.
— tepid. 31. 46. SE 1. — —

Pleuritides, ac peripneumonix, & veræ &
nothæ, haud raræ: *Rheumatismus*; ischias diu ad-
modum

modum vexans, & sævæ arthritides, multos cruciant.——Tusses plurimæ cum gutturi dolore ad finem mensis.

Aprili.

Ab initio mensis ad diem decimum octavum ventus ex Oriente perflavit, a vicesimo Libs, aut Argestes: ineunte Aprili aër fuit valde frigidus, medio ficcus admodum, & exinde tepidior.

Pluvia $\frac{''' }{1.}$ $\frac{'' }{2.}$ 4. $\frac{' }{8.}$ 9. $\frac{' }{19.}$ $\frac{''' }{21.}$ $\frac{'' }{22.}$ $\frac{'' }{23.}$

Dig. Dec.

$\frac{' }{26.}$ 28. gravis Grando 24. = 3.058.

Procella 2. E S E 4—13. tota die. E 4^x.

§ Altitud. maxim. 12. 30,0. NE 1^x. } media 29,6 $\frac{4}{8}$.
— — minim. 23. 29,0. SSE .3 }

Dies frigid. 6. 58. E 1. } media Therm. Altit. 43 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{8}$.
— tepid. 30. 32. E 2. }

Multi apoplexia, paralyfi & vertigine correpti sunt; aliqui pleuritide & peripneumonia. *Variolæ* passim: Asthma valde frequens, medio mense præsertim.——Tusses, coryzæ, tumores colli ac faciei undique.—Crebræ tusses *convulsivæ* inter pueros in australibus Damnoniæ oris.

Mai.

Recurrrens jam ad Orientem ventus per totum fere mensem spiravit, ad Austrum flectens sæpe, ad Septentrionem vero sæpius magisque. Tempestas fuit per initia (si diem unum, alterumve, excipias) tepida satis; post vero fervidissima successit. Rorationes maxime agros hortosque fovebant assidue durante tempore fervido, alioquin omnia fere fuissent adusta.

Pluvia

Dig. Dec.

Pluvia 8. ¹/₉. 13. 15. 27. = 0332.

Fulgur & tonitru hic 27 p. m. S W b W 2.
Fulgur & tonitru ad Septentrionem, prope Alpes
Damnonienses, & in occidentali parte Cornubiæ,
cum gravissima pluvia 24. 25. 26, nulla hic.

✕ Altitud. maxim. 16. 30,0. NE 1. } media 29.5 ¹¹/₃₀.
— — minim. 22. 29,2. ESE 2. }

Dies frigid. 10. 52. N 2. insolitum Frigus! } media Therm.
— fervid. 25. 15. Malacia. — — — } Altit. 29. ¹⁶/₃₀.

Febres *miliares* compositæ (commistæ nempe cum pustulis limpidis papulæ rubræ) hic passim, valde frequentes in occidua Cornubia. Initio mensis plures morbis capitis correpti, ac pectoris. Multi *hæmorrhagiis* immodicis laborant; quarum causa haud dubia fuit enormis admodum aëris mutatio: medio enim mense pene horruimus frigore, sub finem arsimus æstu.

Junio.

Priorem Junii partem Aquilo frequens siccam quidem reddidit, at frigidam valde; calida vero posterior evasit, Cauro plerumque spirante. Aër per totum fere mensem fuit tenuis admodum, plurimæ vero & maximæ cecidere rorationes. — Terra, solis ardore percalefacta, quamplurimos emittit vapores, qui, nocturno condensati frigore, herbas graminaque grato fovant humore: nisi totos fere, dum exhalantur, ventus rapidus secum verrat per auras. Ideo cum aut nullus sit ventus, aut lenis admodum, ros plurimus videtur, dum fortis adfit dissipatur, protinus; æque tamen exhalante terra vapores.

Dig. Dec.

Pluvia ¹/₄. ¹/₅. ¹/₁₄. ¹/₁₇. ¹/₁₈. 23. 25. = 1.066.

Tonitru a. m. 25. N W 1.

K 3

✕ Alti-

$\begin{array}{l} \text{☿ Altitud. maxim. 7. 30,0. N 1.} \\ \text{— — minim. 5. 29,2. ENE 1.} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{☿ Altitud. maxim. 7. 30,0. N 1.} \\ \text{— — minim. 5. 29,2. ENE 1.} \end{array}} \right\} \text{media } 29.6\frac{12}{30}.$
 Dies frigid. 15. 42. NNW 1. } media Therm. Altit. $27\frac{26}{30}$.
 — fervid. 22. 19. Malacia. }

Procedente mense febres *rheumaticæ* & *coryzæ* plurimæ: *Diarrhæa* frequens admodum. Tusses *convulsivæ* inter pueros passim. *Variolæ* in vicinia, jam vero hic nullæ,

Julio.

Æstuosus subsequitur Julius, crassum tamen congerit aërem creber ex Austro & Occidente ventus, sub finem præcipue. Immensa vis roris decidit initio. Muscæ innumeræ molestant undique, & erucæ plurimæ vorant.

Pluvia 8. 13. 14. 18. 19. 20. 22. 23. 25.
 Dig. Dec. 28 — 31. = 1.320.

Tonitru e longinquo 7. 11. Procella 22.
 SW b S 4x.

$\begin{array}{l} \text{☿ Altitud. maxim. 4. 29,7. SE 1.} \\ \text{— — minim. 22. 29,0. SW b S 4x.} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{☿ Altitud. maxim. 4. 29,7. SE 1.} \\ \text{— — minim. 22. 29,0. SW b S 4x.} \end{array}} \right\} \text{media } 29.4.$
 Dies frigid. 31. 36. NW b W 1^x. } media Therm. Altit. $25\frac{18}{30}$.
 — fervid. 7. 17. WSW 1. }

Febres *miliares*, rubræ præcipue: Peripneumoniæ & morbi colici passim. Tusses *convulsivæ* in australi Devoniam quamplurimos infestant pueros. *Ophthalmiæ*, & cholerae haud raræ.

Augusto.

Ineunte & exeunte Augusto ventus fuit ut plurimum Septentrionem inter & Occidentem, Libs autem medio interfuit frequenter: *Atmosphæra*

sphæra facta est crassa valde & humida, ac multo frigidior.

Pluvia 1. $\frac{''' }{2}$. 2. $\frac{''' }{3}$. 3. $\frac{''' }{5}$. 6. 7. 10. 13. 15. 19.
Dig. Dec.

$\frac{''' }{20}$. 21. $\frac{''' }{23}$. $\frac{''' }{25}$. 26. = 3.848.

Gravis procella 20, primo mane. S W b S 4^x. AB. 9. H. 10. N W b W 1. maxima AB. 10. H. 9. N W 1. Hujus radii variis erant, atque maxime vividis, distincti coloribus: Corona pulcherrime rutilans a zenith nostro ad Orientem duodecim circiter gradibus, ad meridiem quoque declinabat paululum. Permagna rursus AB. 11. 10. p. m. N W b N 1. Corona erat eodem ipso loco, quo hesternæ nocte coloris ferri igniti. Levis AB. 12. H. 9. W N W 1.

✕ Altitud. maxim. 9. 29,9. NW 1. } media 29.5.
— — minim. 20. 28,8. SW b S 4^x.

Dies frigid. 4. 44. NNW 1. } media Therm. Altit. 33 $\frac{27}{29}$.
— calid. 17. 27. SSW. 2.

Tusses, *diarrhææ* & *cholerae*, valde frequentes. Febres lentæ, *nervosæ* & *miliares* passim: *Variolæ sporadicæ*.

Septembri.

Toto hoc mense humilem tenuit stationem *Barometer*, Vulturno plerumque flante, aut Africo. Aër interim redditus est humidus valde & frigidus: nam Septentrio quoque aliquando intercurrerebat.

Pluvia 2. $\frac{''' }{11}$ —15. 18. 19. 20—22—24. 26.
Dig. Dec.

27. 28—30 = 2.826.

Procella 11. S E b S 4_x—22. S W 4. Fulgur & tonitru a. m. 20.

Maximus halo circa Lunam 27. S b W 1^x.

☿ Altitud. maxim. 10. 29,9. NNE 1. } media 29.3 $\frac{18}{27}$.
 — — minim. 22. 28,5. SW 4. }

Dies frigid. 30. 46. NNW 1. } media Therm. Altit. 36 $\frac{8}{27}$.
 — calid. 6. 28. ESE 1. }

Diarrhæa plurimi laborant, aliqui febribus intermittentibus, *anomalis*; multi morbo colico & cholera. — Tumores faucium, parotides, coryzæ cum tussi valde frequentes: *Variolæ* sparsæ. Nec infrequens est icterus, nec *rheumatismus*.

Octobri.

Frequens ab Oriente ventus, mense Octobri, *Baroscopium* subinde erexit; qui porro, ad Septentrionem deflectens sæpe, tempestatem fecit paulo frigidior, non raro tamen intercurrente pulchra tepidaque die: Aër autem plerumque humidus fuit & crassus.

Pluvia $\frac{u}{1}$. 5. $\frac{1}{8}$. 9. $\frac{u}{11}$. $\frac{u}{15}$. $\frac{u}{18}$. 24. 30.
 Dig. Dec.
 = 1.556.

Procella 15. Nocte. S W 4^x. Glacies & maxima pruina 14. 15. NNE 1.

Die 20. H. 7. p. m. vividam iridem lunarem observavi, densissima, at tenuissima, decidente pluviola.

☿ Altitud. maxim. 14. 30,1. NNE 1. } media 29.6 $\frac{2}{3}$.
 — — minim. 16. 29,0. WbS 2. }

Dies frigid. 22. 61. NE 2^x. } media Therm. Altit. 50 $\frac{28}{30}$.
 — tepid. 3. 43. N b E 1. }

(A) Icterus frequens; *Variolæ* passim. Dentium dolores. tumoresque faucium ac faciei, cum cru-

cruciatibus *rheumaticis* sæpe præcipue lumborum, plurimos vexant.

Novembri.

Nunc Boreas, nunc Corus, *mercurium barometri* sustinent usque, maxime per initia Novembris, aërem tamen neutiquam desiccabant: medio quidem mense haud parum sæpe intervenit humidus Auster.

Pluvia $\frac{2}{12} - \frac{4}{14} - 17, \frac{1}{19}, \frac{1}{23} - 25, 26, 28,$
 Dig. Dec.
 = 1.334.

AB. 1. 10. p. m. E N E — 7. N W b N 1.
 Vehemens ventus 27. p. m. N W b W.

§ Altitud. maxim. 4. 30, 4. ENE 1. } media 29, 8 $\frac{1}{2}$.
 — — minim. 16. 29, 1. W 1.
 Dies frigid. 30. 65, NE 1^x. } media Therm. Altit. 53 $\frac{6}{8}$.
 — tepid. 12. 48. SbW 2. }

Per omnia undique loca incessit hoc mense morbus, medio tamen hoc in oppido potissimum: omnes fere, cujuscunque fuerint habitus, aut ætatis, corripuens; Modo quidem haud absimili, quo febricula *catarrhalis epidemica* anni MDCXXXIII, at sæviore multo.

Magna adfuit gravedo & capitis dolor, nausea frequens, sternutamenta perpetua, destillationes maximæ, ac Tussis sæpissime importuna valde. — Per initia discruciauit multos acerbus dorsi atque lumborum dolor, quod male plerumque significabat; nam & magna simul accessit præcordiorum oppressio & haud modica febris, sæpe plane *peripneumonica*: perliquida vero expuerunt, raro coctum aliquid. De his actum esset prorsus, si phrenitis quoque interfuisset. —

Tanta sæpe fuit in fauces destillatio, ut anginam haud levem faceret: sæpius vero faciei tumor, parotidum, maxillarum, sequuta est, ac immensa pituitæ acris ex ore naribusque fluxio. — Plurimos acutissimus dentium dolor torfit, etiam quibus ante fuerant sanissimi: idque persæpe uno solum a latere, desinens accuratissime inter dentes *incisores*. Doluit & sæpe dimidium tantum caput, quasi in *hemicrania* exquisita.

Longe plurimi sola laborabant febricula cum gravedine infesta, *catarrho* & molestissimis dentium doloribus, accedente ut plurimum tumore faucium & aspredine: Juniores autem, incremente morbo, delirabant sæpe. — Per multos cruciavit dolor *rheumaticus* vagus, quosdam *ischiadicus* vehemens, non raro durans diu: haud paucos errantia tormina corripuerunt, *diarrhæa* sæpe insequente *critica*. Lingua fuit alba plerumque, raro arida, nec multum sitiebant ægri: Urina turbida fere & subrubra. Cruor sæpe pleuritico-rum similis.

Febris hæc *catarrhalis* plures jam per hyemes plus, minusve, grassata est: varias autem induit formas, pro ratione variarum hominum constitutionum. Plures levis solum febricula tenuit, modico protinus discussa sudore; haud paucos autem peripneumonia gravis: in genere tamen multo vehementius hoc anno sæviit, & largiorem sanguinis missionem postulavit.

Omnino mihi pendere videtur a crasso, udo, gelidoque aëre, spiracula cutis occludente, & acrem intra corpus colluviem congerente; nam & præcedit hunc morbum semper, ac comitatur, crassa admodum humidaque *atmosphæeræ* temperies: nec grassatur unquam, nisi mensibus hybernis, & ejus-

& ejusdem prope indolis esse videtur cum hyemali febre *Sydenhamii*.

Decembri.

Varia fuit admodum hoc mense aëris temperies, nunc frigida valde, flante Aquilone, nunc longe tepidior, irruente Africo sæpe, nec infrequenter Vulturno: immensa vis vaporum, per *atmosphæram*, diffusa *Barometrum* mire sustinuit; etsi haud paucae corruerunt pluviae.

Pluvia $\frac{v}{2}$. 4 — 6. $\frac{v}{8}$. $\frac{v}{12}$. 14 — 16. 18 — 20. Dig. Dec.

$\frac{1}{22}$. $\frac{4}{23}$. $\frac{v}{24}$. 26. $\frac{1}{30}$. Grando 31. = 2.620.

Procella 18. SSE 4 — 30. SSW 4_x. Maximæ sæpe pruinae.

♂ Altitud. maxim. 4. 30,3. NNE 1. } media 29.8 $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$.
— — minim. 8. 29,3. SW 3_x. }

Dies frigid. 29. 73. NE 1. } media Therm. Altitud. 57 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{3}$.
— tepid. 24. 49. SW 2. }

Prima vespera diei hujus mensis quinti cœlum totum, nube quasi tenui obductum, rutilabat maxime, lumine velut ignis triumphalis reflexo: haud minorem utique spargebat lucem, quam vel ipsa plena luna, nubibus operta. Perduravit vero mirum hoc *Phænomenon* ad mediam fere noctem; at longe clarissime effulsit inter horam quintam & septimam vespertinam: levem sane vulgum haud leviter perterruit; hic tristitia incendia timens, ille cœlum deprecans perinde quasi sanguineum. — Aër toto fere die nebulosus fuerat, ac tepidus, irrorante sæpe pluviola, præcipue post meridiem; vix ullus ventus: Vespero vero nebula ingratum mittebat odorem; imo per dumeta forte tunc perequitans, pluviolæ gut-

guttulis aspersus, insuavem admodum percepi gustum, ceu ab ingrato dulcore.——Longe, lateque, insolitum hoc lumen septentrionales Europæ partes illustravit; apud Kilkenniam vero, in Hibernia, globus quasi igneus, in aëre suspensus, videbatur, eodem vesperi, per horam fere, tunc terribili fragore displosus, flammam dispergebat undique.

Ad extremum fere mensis duravit passim morbus *epidemicus*, jam vero evanescit; plurimi tamen inde conqueruntur de maximo virium languore: Aliqui in icterum, plures in phthisin incidunt; permulti in arthritidem & *rheumatismum* perstinacem.

Quod ad hujus *epidemicæ* curationem attinet, parum certe discessimus a methodo, quam anno MDCCXXXIII, supra descripsimus: atqui in hoc sane magis fuit necessaria sanguinis detractio, imo & nonnunquam repetita juvit, præsertim urgente febre, ac sæviente dorsi, aut pectoris, dolore.——At magno certe implicatur errore, quisquis in morbis hujusmodi, ab acri nempe pituita productis, æque liberalem venæ sectionem imperat, ac in vera pleuritide, aut peripneumonia; quod quidem candidissimus notavit dudum *Sydenhamius*, alias utique haud parcus sanguinis detractor, *Section v. Capit. v.* quem velim ut consulat lector,

Post sanguinis missionem frequentia *epispastica* admoveri jussi: ex ulcusculis acerrimi feri quantitas plane stupenda defluxit.

Nihil magis in hoc morbo profuit, quam blandus, tepidus, per omnia membra æqualiter diffusus, sudor. Nihil eum ciebat tutius, quam serum lactis vinosum dilutius, tenue decoctum eryngii, aut tale quid, epotum tepide: optimo quoque successu subinde dedi misturam ex sale cornu Cervi,

Cervi, succo limonum saturato, aqua Menthæ, aut Hyssopi adjecta. Hæc percommode movebat sudores; si minus id quidem, saltem urinam; porro mollem semper præstabat alvum: omni utique modo colluviem expellit pituitosam, ac spiritum reddit expeditiorem, admisto præcipue oxymelite scillitico. — Elixir asthmaticum le Mortii tussis vehementiam lenibat optime, & promovebat etiam sudores. — Alvus non solum per totum morbi impetum tenera fervanda erat, sed & sub finem purganda; ne graviora crearent mala morbidæ reliquæ.

Post febrem penitus abactam, obstinatissimi sæpe permanebant dolores *rheumatici*, quos quidem expugnabant bene *cathartica mercurialia*. Nihil tamen inveni præstantius, quam sequentem Antimonii præparationem; quæ profecto totam istius mineralis potentiam continet: eam ideo (sit venia verbo) antimonii *essentiam* nomino. *)

Omnes olim intendi nervos, ut ex Stibio medicamentum aliquod utile expromerem; omnes fere chemistarum & alchemistarum processus non exploravi solum, sed & in ægrotis etiam variis sæpe probavi; plures sane mirbilis agnosco virtutis: hoc tamen affirmo sanctissime, nihil inde melius, nihil tutius, nihil efficacius, deprehendi unquam, quam tritum illum, ac simplicem vitri *antimonialis* infusum ex vino albo generoso, aromate aliquo *stomachico* adjecto. Possidet enim, experto crede, possidet, totas antimonii vires; quippe qui epotus largiter maximas

*) Hanc antimonii essentiam vel vinum comparandi methodum, eius usum, virtutes ipsarumque antimonii partium, quibus componitur, analysin in peculiari copiosius exposuit auctor clarissimus tractatu, quem in horum Operum Voll. III. invenies.

ximas movet vomitiones, in minuta tantum quantitate, ad guttas puta viginti, aut triginta, adhibitus sudores elicit benignos; paulo tamen majore alvum solvit leniter: quid potest aliud majus ulla alia Stibii præparatio? Quamvis autem tantæ sit virtutis vinum hoc *antimoniatum*, minutissimis tamen stibii particulis, prope dixerim *effluvis* solum imbuitur: quæ, cum sint inter minima fere naturæ, augustissima corporis vascula permeant facillime; tantæ verum efficacisë, ut vel magnum canalem alimentarium stimulent potenter, multo magis ideo exiles corporis canaliculos: ob summam autem tenuitatem eos minime lædant.

Hic ideo tibi fisto, Lector bone! medicamentum, paratu quidem facillimum, at viribus maximum: in omnibus enim vasculorum obstructionibus percommode exhiberi potest, seu primas expurgare vias, seu intima corporis penetralia detergere velis. Nihil utique ad sudores excitandos datur aptius, nihil tutius; nam parum admodum excalefacit: unde in ipsis febribus, lentis præcipue & intermittentibus, adhibetur optime; nec non in quamplurimis morbis chronicis, in *rheumatismo* rebelli potissimum. — Id utique spondeo, nullas huic deesse vires, quas ulla habet Stibii præparatio, strophis utcumque pomposis venditata, aut improbo confecta labore.

Tota pluvie quantitas, anno MDCCLXXVII.

Dig. Dec.

= 27.364.

Brevis Commentatio de morbis ictericis.

(A) In ictero sæviore non raro hæmorrhagias vidi ex omnibus fere corporis meatibus, vix ullis cedent-

cedentes remediis; imo haud citius uno loco fluxum cohibueris, quam eruperit alio. Id in piissima olim matrona tristi admodum exemplo, notavi, quæ icterica, ac febriculosa, sanguinem profudit vehementer ex naribus, viis urinariis, utero, intestinis, tandemque cum sanguine animam! Etsi *hæmorrhagiam*, per breve saltem tempus, restinximus sæpe; pro ratione vero qua fluxus substitit infra, eo violentius e naribus profluxit.

Multis abhinc annis generosus quidam robustus, poculis meracioribus spirituique vini ardentissimi nimium deditus, in gravem incidit icterum; ex quo tamen sanus satis evaserit, si medicis præceptis obtemperaverit probe. At ille contra, quod gingivæ sæpe funderent sanguinem, & dentes essent *scorbuto* fœdati, medicaastro cuidam (si diis placet) ad dentes se commisit, qui dentifriciis & scalpris valide perfricans dentes atque gingivas, tantam excitavit *hæmorrhagiam*, ut eam cohibere, vel valentissimis stypticis, nequirent chirurgi in arte bene versati: sed innumeris profiliens rivulis sanguis, sectis quasi arteriis, per omnem undique gingivam, sedecim horarum spatio hominem, pene exsanguem, confecit.

Certe nunquam non aliquid subest periculi, ubi morbo arquato vexatis accidit profusio sanguinis; denotat enim acerrimum & maxime solutum statum cruoris: quo quidem in casu, attenuantia, *aloëtica*, *volatilia* atque *chalybeata* exhibere, perinde est ac hominem jugulare; e contra acida, diluentia, demulcentia, aquæ acidulæ & id genus alia, juvant maxime. Prodest sæpe plurimum feminum cannabis ex lacte decoctum, aut emulsio ex seminibus papaveris albi & amygdalarum dulcium; post levem sanguinis missio-

nem

nem (si febricula urgeat & ferat pulsus) & alvi solutionem debitam. — Sane haud scio, annon modica venæ sectio æque necessaria sit in *hepatitide*, ac consequenter in obstructione hepatis cum febriculosa sanguinis *diathesi*, atque in *pleuritide*, aut *peripneumonia*: præcavet enim graviora mala, inflammationes scilicet, apostemata dira, aut scirrhomata.

Est vero alia icteri species, & (ut aiunt) toto cœlo diversa, quæ, ab inerte & viscida bile pendens, diversam omnino poscit medendi methodum: hic enim lentus nimis & crassus sanguis glutinosam valde, ac vapidam, generat bilem; quæ tandem vasa obstruit biliaria, adeo ut hepatis obstructio morbi potius effectus sit quam causa. — In hoc igitur casu *emetica* primo, *cathartica* dein *aloëtica* & *mercurialia* desiderantur; Attenuantia tunc *saponacea*, *tartarea*, *volatilia*, tandemque *chalybeata*, necessaria sunt: cave tamen sis, ne *chalybeata* medicamenta præpropere adhibeas, ante scilicet quam fluxos reddideris humores; aliter enim, pro remedio, immedicabilis forsan hepatis scirrhus eveniet.

Atqui hic non possum, quin laudem maxime *Tartarum regeneratum*, seu (ut dicitur) *Terram Tartari foliatam*, ut remedium dissolvens maxime, non solum ad morbum regium aptissimum, sed ad alios etiam quam multos. — Conflatum quippe ex acido oleoso subtilissimo aceti, & sale fixo alcalino, sit sapo quidam mirabilis & penetrans maxime; qui omnibus quibuscumque liquoribus miscetur promptissime, vel in ipso *alcoholico* vini facile dissolubilis; hinc omnia gummata, resinosa, oleosa, viscosa, five animalia, five vegetabilia, solvit optime; imo gummi Lac, Succinum, Myrrham, tenacissima certe cor-
pora.

pora. Unde lentos nimium & glutinosos corporis humores potentissime dissolvit, & vasorum obstructions referat maxime. Quamvis autem tantas possidet virtutes, vix ullam habet acrimoniam: imo, quod mirabere forsan, æque tuto pleuriticis, ac ipsis hydropicis, exhibetur. Eximius sane usus est medicamentorum, quæ pondere & subtilitate crassos & lentos humores comminuere possunt: longe tamen feliciores edunt effectus ope saponis alicujus detergentis, qui glutinosum & pingue resolvat. — Honos sit corpusculo humano! Utriculi fordidi non æque terfi & puri redduntur sola aqua & lapillis, aut globulis plumbeis, conquassatis, ac si adhibeatur quoque smecticum aliquod lixivium. — Recte quidem præcedere debet usus saponis alicujus medicamentorum exhibitionem, quæ plurimo pollent momento, ut glutinosos incidat humores eosque *εὐγέας* reddat.

Latuit diu sal hic, sive sapo, nobilissimus inter strepitus fucosque alchemistarum, recondita farragine titulorum celatus; utpote *Sapo Sapientium*, *prima Materia vegetabilis*, *Sulphur Naturæ vegetabile*, *Sal harmoniacum vegetabile*, *Mercurius Naturæ* & Philosophorum, ut apud Lullium, Parisinum, Guidonem, &c. invenies: recentiores vero eum aptiore nomine, *Aceto radicato* scilicet, & *Terra Tartari foliata* insigniebant; semel etiam apud Lullium in apertorio suo terra foliata vocatur. — Hujus autem compositio apud omnes consistit in admixtione intima, ad saturitatem usque, salis tartari fixissimi cum spiritu vini philosophico; at nisi aceto destillato utere, (quod quidem est mysticus etiam quasi vini spiritus) nunquam conficies sal fluens ad ignem, ceræ instar, in spiritu vini rectificato dissolubile, ac in mo-

L dum

dum talci splendens & foliatum: qui tamen apud eos ejus sunt characteres.

Sed quid in sterquilinio gemmas quæram cum apud illustrem Boerhaavium in Chemia sua modus præparandi & virtutes hujus salis apertissime tradantur; subjiciam vero & ipse, quod multo minus volatilis est, quam vulgo æstimatur: imo eousque igni resistit, donec omne fere acidum evaporetur tandem, sale solum alcalino fixo manente. — Ad lenem autem ignem liquatus pulchriores & splendidiores (argenteas quasi) exhibet laminas; diminuta tamen aliquantulum medicata virtute; nempe inde ad igneam alcali naturam accedit propius, quod tamen mox corrigitur acidi vegetabilis pauxillo affuso.

Ad omnes viscerum obstructions, & lentos nimium humores, hoc sal mirandæ plane virtutis esse probavi millies: nam id utique assidue per annos fere viginti exhibui feliciter. Nec tantum ad hæc valet maxime sal hoc nobilissimum, sed & vel ipsum lixivium ex sale tartari fixo & aceto acri confectum deterget, resolvit & aperit potenter: etiam ipsi veteres, ut * *Cajus Plinius* refert, „cineres farmentorum ex aceto biberunt ad vitia splenis., — Profecto lixivium ex sale tartari & aceto penetrantius est multo, quam ex eodem cum succo limonum, ob ** *mucilaginis* copiam, quæ limonibus inest. — Sed ex aceto acerrimo & sale cornu Cervi *volatili* conficitur lixivium longe penetrantius, in febre lenta, ac intermittente rebeli, pluribus etiam in morbis, summæ certe virtutis. — Hic porro dicam in transcurso, quod acetum sali volatili animali, propter oleum nempe

* *Vid. libri 23. Proëm.*

** — *infra Tractat. de Morbo Colico, &c.*

nempe combustum foetidissimo, affusum, cumque eo digestum & destillatum dein, omnem prorsus foetorem delet, imo gratissimum conciliat odorem. Hoc novit olim immensæ eruditionis, & pro ævo, quo vixit, stupendus plane vir, Rogerus Bacon, dum spiritum capillorum rancidum aceto depurat; nec minus forte Lullius in præparatione salis harmoniac. vegetabilis. Vid. Testament. novissimum

Acetum utique plurimi æstimarunt veteres: „Nam quamvis refrigerandi vim habet, habet tamen & dissipandi; hæc * Celsus; ideoque ** Plinius dixit optime, vini vitium (acetum scilicet) „transit in remedia.,—Sed de hoc forte plus satis.

*Dissertatio de Febris lentis Nervosis. **

Febris lentæ mentio passim vel apud Celsum occurrit; febris utique *nervosa* minus latine sonat; quoniam vero ea voce, in isto sensu, medici recentiores utuntur sæpissime, istam retinui; nam ut Geometræ, Musici, Grammatici etiam, more quodam loquuntur suo, quidni & Medicis liceat? Veniam certe dabit, vel maximus dicendi magister, ** Tullius.——De verbo tamen parum sollicitus, de re magis laboro: nam cum hæc febrium species longe frequentior nuperis annis (apud nos

L 2

faltem)

* *Lib. 5. cap. 27.* ** *Vid. Lib. 23. sub finem.*

* De febribus lentis nervosis in Libro de febribus, quem horum operum volumen alterum continet, pluribus quidem agit auctor clarissimus, indeque dissertatio hæc hoc loco commode deleri & isti volumini inferi vel prorsus rejici potuisse, videtur; cum vero observationibus annorum 1734 & 1735 plura huius dissertationis respondeant loca, ideo haud superfluum, sed consultius esse duxi, illam hic loci relinquere.

** *Cicer. Lib. 3. de Finibus, sub initium.*

saltem) quam alia quælibet grassata sit, operæ pretium duxi super, hac pauca differere.

Lenta adeo & *nervosa* febris lento quodam invadit gressu, at firmo nimis: hac quippe correpti de levi vagoque horrore, incerto quodam & errante calore intercurrente subinde; de lassitudine porro membrisque quasi fatigatis queruntur quidem, dum obambulant interim, oscitantes tamen & torpidi. Accedunt mox præcordiorum oppressio, nausea, gravedo capitis, alstricta tempora, aut vertigo quædam. Pulsus equidem frequens est semper, at debilis plerumque, ac inordinatus, calor autem haud insignis excitatur unquam: at sæpe, dum volæ manuum uruntur, extrema frigescent; dum caput ardet, algent pedes. Obrepat indies malum, jamque loqui, aut moveri, piget, ac, vel inopinantes lecto affixi, vix quo se habent modo exponere valent, aut sopore nimio detenti, aut vigiliis mire anxii & fere perpetuis. Nihil poscunt interea prorsus, ne vel potum aliquem. Jam tendinum subsultus adest, tremunt manus, tremit lingua, quæ, mucosubalbido obducta, haud multum fere inarescit, nisi media solum in parte, ubi fusca est valde & arida. Tandem & aliena murmurant subinde & desipientia, furens tamen abest insania. Tenuem plerumque reddunt urinam, vapidi instar vini, aut cærevisiæ luridam, aliquando limpidam, haud raro etiam subnigram, subinde paulo crassio rem, inspersa quasi farina. Breves, inæquales & parum constantes habent sudores, sæpe frigidulos & glutinosos, sæpe profusos maxime; & paulo ante mortem, non raro gelidos cum pulsu exili admodum & formicante. Stragula contrectant interim, & inanes quasdam imaginesprehendere tentant. Jamque vox faucibus hærens, ungues digitique lividi,

vidi, facies cadaverosa, perpetua fere ac frigida suspiria, certissimam instare mortem denunciant.

En hujus febris dira facies! quam nervosam ideo nominarunt, quod nervos potissimum afficere videatur; lentam vero, quod ad diem vicesimum primum, & ultra sæpe, perduret.

Pestifera semper est, ubi *aphthæ* nigrae, *petechiæ* fuscae, lividae, atrae, aut vibices quasi, apparent; præsertim si accedit alvus cita, plumbea, nigra, colliquans, aut sudores oleosi. — Ubi pustulis, papulis, aut maculis, cutim deturpantibus, febris lenta stipatur, contagiosa est ut plurimum: cum vero *exanthemata* mali sint moris, vulgo audit maligna. Papulae rubrae, floridae, copiosae, aut plurimae pustulae *miliares* turgidae, statu morbi erumpentes, bona præfagiunt: præcipue si accedunt sputa liberalia continua, aut multae crassae subsidentes urinæ. Juvat & tunc temporis sæpe lenis *diarrhæa*; blandus persæpe juvat, per omnia membra diffusus, æqualis tepidusque sudor: salutaris nonnunquam erumpit parotis: profunt non raro *aphthæ* albidæ, benignæ. Convalescentes frequentissime surdescent, ac sæpe habent apostemata in meatu aurium salutifera.

Ex observatione medicorum, cum veterum, tum recentiorum, constat sane; quod putridæ lentæque febres grassantur maxime, cum humida nimis crassaque aëris temperies perstat diu: idque potissimum, si concurrit etiam calor insolitus. — Quam pluvia fuit, quam squalida tempestas nuperis annis nemo non norit; & totum Annum 1734 & 1735 inter perpetuas pluvias & continua quasi diluvia contrivimus: nec lætis nos solitisque radiis lustravit sol æstivus, nec purgavit aërem hyemale gelu: depluit æstate tota, depluit & hyeme, dum aër interim, mutata quasi prorsus

natura rerum, fuit mire quidem tepidus, at humidus maxime. Hinc lentæ & *nervosæ* febres, ac remittentes & intermittentes, fuere frequentissimæ: hinc porro loca uliginosa infestant semper. Atque illi præcipue his corripuntur, qui aut naturâ, aut casu, sunt imbecillores aut ex mœrore magno vim animi fractam habent, aut qui pravo & crudo utuntur victu, quales in carceribus sæpe videmus, vel qui cucumeres & melones ingurgitare solent. Omnes autem hæ causæ vim fibrarum enervant, lentorem inferunt humoribus, & *perspirationem* inhibent maxime.

Atqui lentor iste longe differre videtur a glutine sanguinis inflammati, quod nimio motu humorum & valida fibrarum vi producitur: hoc quippe crassamento sanguinis inhæret, eumque detractum quasi corio obtegit; iste vero lymphæ inest maxime. — Confer cruorem pleuriticorum, rheumaticorum, aut febre ardente laborantium, cum illorum sanguine, qui febre lenta *nervosa* correpti sunt, maximum utique videbis discrimen. — Hic dum emittitur, lividus apparet, iste rutilans, hic frigescens parum crassamenti habet, multum vero serum obscurum & sæpe turbidum; iste crassamentum plurimum coriaceum, serum vero minimum.

Maximam sane differentiam apoplexiam inter sanguineam & pituitosam rectissime ponunt medici: haud minor utique videtur inter febrem *inflammatoriam* & lentam *nervosam*. — Prior semper habet circuitum sanguinis rapidum valde & fortem, magnum hinc attritum, ac vehementem inde calorem, urinam quoque impense rubram, unde sanguis tandem condensatur maxime: ab aucto namque humorum motu & valida vasculorum oscillatione globuli rubri, sanguinei, (præcipuæ

cipuæ partes sanguinis calorem foventes) numero ac densitate augentur, ob summum momentum, quo compinguntur laticis vitalis principia. — Hæc quoque accidit subito robustissimis, & gravissimos sæpe infligit dolores; eos vero aut jugulat cito, aut relinquit: porro viget maxime in siccis & serenis tempestatibus.

In posteriore, morbus lente admodum invadit, vis solidorum debilitatur maxime, pulsus adest languidus, etsi frequens, nec acris unquam oritur calor consistens; si quis accidit, subito subinde frigore excipitur: tenues plerumque & pallidæ urinæ fractas naturæ vires & invalidam humorum agitationem monstrant. — In hoc adeo statu propter defectum motus idonei fluidorum, ac solidorum inertiam, globuli sanguinis rubri dissolvuntur ex facili. — Ita non dolent hac febre correpti, ut torpidi quasi & insensiles jaceant, ne vel acriora *epispastica* sentientes. — Raro spargitur hic morbus, nisi per humidam atque tepidam *atmosphærae* constitutionem, raroque corripiuntur robusti & alacres.

Sed juvat hæc agitare paulo altius, ut videamus quid in febribus natura faciat, aut ferat: idque exemplo febris intermittentis regularis, cujus causa haud dubio sanguinis est nimia *visciditas*; quæ ingruente paroxysmo in vasculis capillaribus hæret, atque horrorem, rigorem, artuum pallorem & unguum livorem producit: omnia sane signa haud dubia obstructi sanguinis! — Jam si viribus pollet idoneis natura, febre ipsa utitur ad remedium: nam si valida vis insit fibris, & non nimia adsit tenacitas humorum, accenditur protinus febris, qua vehementer agitantur brevique comminuuntur crassi humores, & sic apti redduntur ad permeandum minimos vasculorum ra-

musculos; ita mox omnis expeditur obstructio, ac consequente sudore, brevis saltem sequitur integritas. — Atqui ubi vehemens vasorum impetus maximo propellit momento viscidos admodum, & ægre cedentes humores, tantus oritur attritus atque calor, ut ardens sæpe, ac continua, excitetur febris, aut inflammationes graves: præcipue ubi magna quoque adsit acrimonia, aut præpostere exhibeantur medicamenta stimulantia, quæ sanguinis effervescentiam jam nimiam incitant. — E contra ubi vis vitæ, quacunque de causa, justo infirmior, haud satis valide protrudit liquida, hæret usque ad extrema vasorum impactus lentor, qui auctus indies circuitum tandem sanguinis perdit omnino: nam qui a febre intermittente pereunt, fere semper moriuntur dum rigores & horrores urgent; ab impotentia scilicet cordis & vasorum superandi resistantiam morborum lentoris. His sanguinem mittere perinde est ac si trucidentur, illis necessarium omnino. — Intelligitur hinc facile, cur febres sæpe typum mutant, omnesque fere, diu durantes, naturam tandem induunt febris *nervosæ*; nimirum infirmato valde fibrarum *elatore*, & conspissatis nimium humoribus.

Ponamus jam lentorem residere solum in *serosis* arteriolis, quæ purissimam feri partem, sub nomine lymphæ, aut succi *nervosi*, secernere debet: debilitata concurrente *syntasi* fibrarum oritur febris dicta, lenta, nervosa. Dum enim in plurimis minimisque his tubulis inhærescit obstructuens lentor, plus tenuissimi laticis per patentes reliquos urgetur: (nam si omnes omnino obstructi sint, mors instaret protinus) inæquales hinc incertique pulsus, calores, sudores, sequuntur. Porro quo diutius in *arteriolis* his contortu

plicatis

plicatis (si mavis glandulis) morantur lenti humores, eo acriores fiant necesse est, donec in liquamen quasi saniosum abeunt: quod dum tandem absorbet sanguis, totam id demum ejus contaminat massam. Permulta sic nascitur acrimonia, ob debilitatem tamen fibrarum, nervorumque torporem, haud rapidus excitatur sanguinis cursus, aut vehemens inde calor, lentor tamen exin augetur indies.

Sic se forsan res habet; cum ex recitatis supra causis fibræ vasaque corporis infirmentur, sanguinisque retardetur motus, nec subigantur bene humores, nec probe misceantur: unde tandem producitur lentor, præcipue in vasculis minimis, ubi tenuissimi fluere debent liquores. Nascitur hinc obstructio in arteriis *serosis*, ultimisque cerebri arteriis, inde impedita lymphæ secretio, ac quod pejus est, succi *nervosi* inopia: deficit hinc officio nervosa propago, at quæ non inde mala?

Qui secum reputat, quanto sane molimine cerebrum effecit natura, haud ibit inficias succum nervosum omnino esse necessarium *Oeconomiae* animali; quo sine profecto nervi vim perdunt prorsus, & muscoli proinde ab his pendentes: ut videre est potissimum in musculis motibus *involuntariis* inservientibus, ubi sive obstruantur, sive comprimantur, *nervi paris vagi & intercostalis*, sive in cerebro horum origines, resolvitur illico omnis ferme actio vitalis; ac ne vel acerrima meri animi contentio, seu ut dicitur *volitio*, ad motum hunc restituendum valet hilum. — Requiritur ideo at motum muscularem corporeum hoc medium; ad seu animat, seu irrigat, nervos, non nostri est hic dicere: id saltem apparet, quod dum ex lege naturæ in nervos motibus *involuntariis* ministrantes influat perpetim, actio cordis,

ventriculi, intestinorum, &c. rectissime peragitur, five vult, five non vult, animus.

Quod vero in febribus lentis *nervosis* insignis adsit obstructio nervorum, liquido patet; quoniam omnes corporis sensus depravantur maxime, vix vident oculis aperis, perditur olfactus, perditur auditus, vix etiam sapidissima gustant: torpent adeo membra, ut parum admodum sentiscant vel acerrima *vesicatoria*, obstructo nimirum sensationis medio — Subluridus vero cutis color, frequentes rigores, torpores, extrema subfrigida, ulcuscula pallida & desiccantia subito, etiam si acerbis irritata stimulis, maximum lentorem, ac impeditum humorum cursum, per minutissima corporis vascula denotant.

Præter ea cum parcior fiat secretio liquidi nervosi, actio solidorum in contenta fluida debilitatur, adeo ut hac quoque de causa lentor augeatur indies, unde major fit assidue in vasculis *serosis*, five *lymphaticis*, obstructio. Atqui parcius hinc refunditur lymphæ diluens cruori, qui crassior deinceps & acrior evadit, minusque etiam aptus ad permeandum vascula minima: Stagnat ideo in extremis *arteriis*, & maculas nigras, lividas, fuscas, sæpe & vibices, extra; intus vero gangrænas producit, aut, stagnando diutius, in putrem tandem abit saniem.

Sufficiant, ac etiam supersint forsan, quæ de *nervosæ* febris natura dixi; id saltem apparet, quod ut omnis fere febris varii possunt esse gradus, in ratione scilicet composita vis solidorum, status humorum, & acrimoniæ sanguinis, sic quoque & hujus, de qua agitur, maxime: forte ne quidem in duobus hominibus omnino similes. Nulla igitur certa & stabilita medendi regula determinari potest, (hic enim desideratur maxime medici ingenium,

ingenium, qui ægrôtis affideat) quæ vero in genere profit, paucis absolvam.

Si qua unquam in febribus hujuscemodi mittendus est sanguis, id quidem ineunte solum morbo, & parca utique manu, agendum est: ardente namque febre laborantes facilius multo sedecim sanguinis uncias amittunt quam his correpti selibram. — Ægri vires & pulsus modum indicant. — Tutius longe detrahitur cucurbitulis scarificatis, meliusque multo hoc modo levatur caput, ac vel ipsa plerumque pectoris oppressio; nec si repetatur officit, quod de venæ sectione haud semper dicendum est: imo sæpe, vel in ipso morbi statu, ubi aut delirium, aut coma, graviter urgeat, necessarium est prorsus.

Pone aurem utramque, effuso cruore, *vesicatorium* acre applicetur, præsertim urgente capitis dolore, aut vertigine. — Post paucas dein horas exhibeatur lene *emeticum*, quo & pituitosa ventriculi saburra, ac biliosa colluvies, ejiciatur: hoc quoque efficitur, ut universum vasculorum *systema* agitetur valide & concutiat, atque inde expellatur inhærens lentor. — Ideo autem, horis aliquot ante vomitum, *vesicatoria* admoveo, ut, exteriora capitis ac cervices irritando, plus sanguinis per externas carotides eliciatur, minusque adigatur lentoris ad intima cerebri vascula actione vomitionis. — Quid possint *epispastica* pone aures ad cerebrum levandum videmus quotidie, præcipue in puerulis, distentione nervorum aut comate laborantibus, ubi scilicet ulcuscula defudantia pone aures deficcantur subito: his enim vesicantia applicata humores extrahunt iterum, morbumque discutiant protinus.

Si alvus post vomitum non responderet, leni injecto *enemate* ducenda est, idque etiam in posterum

sterum tertio quoque die: ubi enim indurata ster-
cora in intestinis hærent, *oeconomiam* animale
mille modis turbant; maxime si his infarciatur
rectum imam premunt *aortam*, & liberum san-
guinis descensum per *iliacas* arterias impediunt,
unde plus justo ad cerebrum ruit. Adde quod
enemata e lacte *saccharato* potissimum, tepore emol-
liente ima viscera foveant, & plus sanguinis allici-
unt eodem, unde urinam quoque optime movent.

Nunquam quidem non juvant *epispastica*, per
totum morbi decursum, ita ut desiccantibus prius
applicatis admoveantur alia: his enim vasculo-
rum oscillatio incitatur, subtilissimo etiam sale
lentos incidunt humores, eosque tandem expri-
munt. Vellem semper ut ingruente febre, præ-
sertim ubi caput graviter premitur, applicetur dera-
so occipiti *vesicatorium*: nam eodem fere modo, quo
pone aures agit, nec tamen ita asperos excitat
dolores, dum ad delirium præcavendum interim
facit maxime. — Sane ita non cruciant in hoc
morbo *epispastica*, ut, gravem ob stuporem, vix
sentiantur; imo quo magis inflammantur, ac do-
lent, eo plerumque major spes salutis effulget.

Quod ab extra vesicantibus molitum est, id
intus quoque medicamentis idoneis tentandum est.
Profunt maxime attenuantia dicta, & quæ blande
torpidos excitant nervorum ramusculos: laudo
potissimum cinnabar & lenia *alexipharmaca*, *ce-
phalica*, qualia sunt lap. contrayerv. Confect. Ra-
leigh. Sal. Succin. — C. C. Sp. Lavend. C. Spir.
volat. oleos. & Camphora præcipue, quæ & ipsa
quasi sal quoddam *volatile* oleosum est: ex salibus
enim penetrantissimis, subtilissimo sulphure in-
volutis, constans minutissima corporis vascula
permeat crassamque digerit lympham, ac lentos
dissolvit humores: salutiferos hoc modo excitat
sudores,

sudores, ac (galbano, aut Silphio adjecto) somnum sæpe vel opio felicius conciliat, eoque potentius deliria fugat.

Nihil fane utilius est, in hac febre, quam lenes movere sudores per totum corpus: hoc modo enim brevi discutitur morbus, aut paulo post in remittentem, aut intermittentem, mutatur. Debet autem per omnia membra æqualiter diffundi tepidus sudor; sive enim brevis est admodum, aut frigidus, aut circa caput tantum & cervices, mali morbi signum est: per sudores autem mox inhorrescere pestiferum est, blandus autem & æqualis sudor spiritus recreat.

Sed ubi *episthastica*, ac attenuantia, adhibentur, diluendum est affatim potione tenuissima miti, at detergente leniter; Sero lactis nempe canariensi, aut xeresano, dilutiore, decoct. Lusitanicæ. — Eryngii, infusione Salviæ, &c. ut crassiores nimirum eluantur sales, ac debitus subministretur sanguini latex; qui aliter, perpetua liquidissimi exhalatione, in merum pene gluten brevi abiret. — At raro admodum convenit aqua pura, frigida, quam tantopere suadent nonnulli: haud multo facilius namque cum sanguine miscetur, quam cum aqua oleum, nisi mediante *saccharo*, aut sale aliquo *essentiali* plantarum. Vidi aliquoties & febre ardente, imo & *nervosa* etiam febre, laborantes, meram aquam perpotantes frigidam, qui mox per urinas eam reddidere limpidam omnino, & nullo fere modo mutatam — næ magno suo cum damno.

Septimo, nono, vel undecimo, febris die, nonnunquam & decimo quarto, papulæ rubræ, aut pustulæ *miliares*, aliave *exanthemata*, erumpunt sæpe, morbumque levant apprime; præcipue si florida hæc sunt, ac illæ vividæ & turgidæ.

Quam-

Quammaxime tunc cavendum est a frigore, & lenia subinde porrigenda sunt *cardiaca*, quæ naturam adjuvent ad lentos acresque humores exterminandos, qui, in ultimis *arteriis* cutaneis hærentes, pustulas has formant. *Exanthemata* fusca, livida, nigra, pestiferum morbum indicant; sanguinemque corruptum maxime, ac in saniem fere conversum: in hoc statu profecto sanguis ita dissolvitur, ut alvi dejectiones sanguinolentæ sint, ac saniosæ sæpissime; imo cruor e venis emissus vix, ac ne vix quidem, in coagulum abit, notante doctissimo *Listero*.

In casu tam deplorando mox confugiendum est ad *alexipharmaca* astringentia, acida, qualia sint china chinæ cum radice serpentariæ Virginianæ, elixir vitrioli Mynsichti, tinctura rosarum, vinum rubrum ustulatum (ut dicitur) &c. hæc enim ad conservandam vim fibrarum & *crasin* sanguinis apta sunt maxime.—— Valet plurimum ad gangrænas sistendas Cortex Peruvianus, ut nuperis inventum est experimentis, eumque ad humorum putredinem arcendam cum *alexipharmacis* & acidis conjunctum utilissimum esse certo comperi.—— Vix forte in tali casu nobile magis datur Ἀλεξήριον, quam vinum austerum cum aromaticis coctum: tutius enim & efficacius vires erigit, quam spiritus vini ardentes, quantumvis *pharmacis* aromaticis imbuti, & nomine aquarum *cardiacarum* nobilitati.

Jusculis interim tenuioribus, *panatellis*, *gelatinis* de sago, cornu cervi, &c. nutriendus est æger, sæpe quidem, at paulatim: in tanto nimirum periculo vix ulla alia spēs est, quam ut, impetum morbi trahendo, aliquis effugiat, porrigaturque in id tempus, quod curationi locum præstet.

In statu morbi porro, aut paulo post, *aphthæ* non raro imas fauces & os totum occupant; pessimæ utique si nigræ, neque periculo vacant si supra modum albidæ! modo ex imo gutture ascendere videntur, modo per totum canalem alimentarium descendunt, ac singultum, *diarrhæam*, aut *dysenteriam*, excitant: quicquid est, difficillimam sane *crisin* plerumque denunciant, potissimum si *dysenteria* & singultus accidunt. Melius est longe cum *salivatio* copiosa oritur; sæpe profecto hoc modo solvitur febris, lentore morbofo nempe per glandulas salivosas exantlato. — Ubi *aphthæ* oriuntur, creberrime gargarizandum est emollientibus & detergentibus, ex ficu, mulso, decocto raparum, &c. dandum vero interdum est rhabbarum, maxime si alvus cita & torminosa urget, adjecto astringente aliquo aromatico cum absorbentibus. Post omnem autem gargarizationem in ore contineat paululum, & mox deglutiat lente, tenuem, e feminibus psyllii & cydoniorum *mucilaginem*, syrupo mororum aut rubi idæi admisto: fovet hæc optime, ac sanat ulcuscula.

Haud raro pituita tenax admodum totas adeo opplet fauces, ut strangulationem pene minitetur: hic utique nihil magis opportunum est, quam levi *emetico* vomitum sollicitare leniter, idque sane quocunque tempore morbi. Mirum est, quantum levamen hoc affert ægrotis, quam immensa vis glutinosæ colluviei, albumen ovorum referentis, ac sæpe vel eo multo crassioris, ejicitur: imo mox sæpe *aphthæ*, coma, nausea, singultus, linguae terrificæ nigrities, facessunt, ut observavit olim diligentissimus *Sydenhamius*; quod quoque ego vidi multoties.

Nec minus utilis est lenis alvi purgatio sub morbi finem, interpositis subinde *cardiacis* & *paregoricis*;

regoricis; hæc enim evacuat putridam morbidamque colluviem, per arterias *meseraicas* in intestina depositam, *crisique* naturæ, utcunque imperfectam, promovet: imo facit sæpe, ut febris, quæ huc usque nullum certum servabat ordinem, remittentis plane, aut intermittentis, typum induat, locumque præbeat medicamentis idoneis. — Atqui ita non *diarrhæam*, aut *dysenteriam*, quas tantopere timent nonnulli, inducit, ut hoc modo præcaveantur optime. Fœda namque eluvies, diutius in visceribus restitendo, magis fit acris, magisque, assidue, & eorum tunicas excitulat maxime; imo eas corrodit tandem; ac vel funestam parit *diarrhæam*, vel *dysenteriam*, horrendam: partim insuper per venas lacteas resorpta diras iterum turbas in sanguine movet. Ut his ergo occurram malis, mihi in usu est frequentem, ac modicam, rhabarbari dosin exhibere, alternis saltem diebus: nimium interea alvi motum (si opus est) astringentibus aromaticis, atque *anodynis*, reprimere soleo.



OBSERVATIONES
D E A E R E
ET
MORBIS EPIDEMICIS
AB ANNO MDCCXXXVIII
AD FINEM
ANNI MDCCXLVIII
VOLUMEN ALTERVM.

Δεῖ δὴ καταμανθάνειν τὴν κατάστασιν τῶν ὥρων
ἀκριβῶς, καὶ τῶν ἰσῶν ἐκάστην. HIPPOCRAT. *de*
Dieb. judicatoriis, initio; item Lib. III. Epidem.
Señ. 3.



PRAEFATIO.

Perfeci tandem *Observationum de Aëre & Morbis Epidemicis* volumen alterum (ab initio scilicet anni 1738 ad exitum usque 1748) in quo quidem eodem usus sum ordine, atque notis, in priore descriptis *.

Quam fuerunt plena laboris hæcce opera, solus ille norit, qui talia conscripserit—Lubentius autem secundum hoc opus suscepi, quod & prius publico bene acceptum perceperim, & mihi porro, id meditati, haud inutile.—Dum enim cœli atque aëris mutationes notarem diligenter, variosque morbos has consequentes, eorum sane causam, ac naturam, multo melius dignoscebam; quales enim tempestates, tales etiam sunt morborum constitutiones, sicut notavit olim *Hippocrates* **, & fida dudum docuit experientia—Multus ideo est divinus Senex in præcipiendo diligentem aëris atque tempestatis observationem, optima quin etiam dedit exemplaria, præcipue in libro primo & tertio *Epidemicorum*.

M 2

Hujus

* Porro in Volumine 2. notavi, quolibet mense, diem novæ, nec nou plenæ, Lunæ—Hic obiter monebo, quod tota pluvix quantitas Anni 1737 (Vol. 1.) fuit tantum Dig. Dec.

Dig. Dec.

27,364, non, ut falso imprimitur, 36,706.

** Lib. de Humorib. Sect. 7.

Hujus etiam laboris aliud mihi fuit incitamentum; quoniam scilicet observationes hujusmodi, quæ per longam annorum seriem, uno eodemque loco factæ sunt, melius longe istius regionis *atmosphærae* constitutionem, morbos vulgares, eorum successiones, relationes, imo & curandirationem, ostendunt, quam si per unum solummodo, alteruive annum detur historia: monet ideo rectissime clarissimus *Ramazzini*, „Nil foret „in arte medica utilius, quam succedentes sibi ad „invicem constitutiones conferre, ut recta mendendi methodus institui posset, quoties eadem „tempora, ac iidem morbi, recurrerent *,” — Paulo etiam ultra processit expertissimus *Hoffman*, hortando nimirum ardentem „Omnes & singulos „medicorum cordatiores, quibus curæ cordique „salus hominum est, ut in annotandis morborum „historiis, si epidemici morbi grassantur, & diligentissimi & accuratissimi sint; & quisque in „suo loco temporum & tempestatum præcedentium, & præsentium, constitutionem, item in „Barometro mercurii motum, ac gradum caloris „ex thermometro, simul adjiciant, integrasque „& plenas historias cum methodo curandi & „eventu exhibeant. **,”

Nostram profecto ad vitam sustentandam omnium maxime necessarius est aër, cæteris utique per plures horas carere possumus, hoc ne vel tempore quam brevissimo — An igitur purus sit, vel impurus, summi procul dubio est momenti, ejus-

* Constitut. epidemicæ. urban. 1691. ipso initio.

** *Frid. Hoffman*. Medicin. rational. Systemat. Edit. *Frankfurt*. 4, 9 Vol. 1738, Patholog. general. Part. 3, Cap. 7, p. 430, Tom. 2.

ejusque adeo bonas, nec non pravas qualitates *, probe perdiscere debet medicus. — Aëris autem nomine hic volo terræ *atmosphæram*, non merum, uti dicitur, elementum: quæ cum ex variis admodum rebus componatur, variis etiam modis officere nobis, ac proficere, potest — Diversæ ergo hujus constitutiones, tum ad sanitatem tuendam, tum ad morbos depellendos, assidue sunt observandæ.

Res erit exemplo clarior — Sicca valde & frigida tempestas, perflante diu Borea, aut Aquilone, corporis habitum constringit, fibras roborat, vascula arctiora & fortiora facit, humores etiam magis densos; porro globulos sanguineos accumulat, & compingit valide; *Celsi* verbis, totum corpus spissat, & mobilius atque expeditius reddit; ideoque ex *Hippocratis* ** opinione, omnium ventorum Aquilo est saluberrimus — At si diutius talis perstat tempestas, solida fiunt stricta perquam, & *elastica* nimis, fluida verum crassa valde & glutinosa, imo ad vascula minutissima permeanda multo minus idonea; namque non tantum humoribus inducit lentorem, ad inflammationes aptum, sed & ita quoque condensat rubros sanguinis globulos, ut difficillime per ultimos arteriarum ramusculos promoveantur; duros nempe plus æquo, & haud facile formam rotundam in oblongam mutant ad transitum scilicet facilitatem; cum & jam etiam ipsæ *arteriolæ* a frigore coarctantur & distentioni resistent plurimum. — Hinc obstructions, hinc inflammationes, pleu-

M 3

ritides,

* Haud pauca de his dixi in Prolegomen. ad Vol. I. de *Aëre*, &c.

** Lib. de Morbo Sacro, Sect. 15. Edit. *Vander Linden Lugdun. Batav.* 2 Vol. 8. 1665.

ritides, peripneumoniæ, anginæ, *rheumatismi*, morbi denique, qui a crasso, viscido, ac inflammato sanguine pendent, prævalida vi cordis & arteriarum adacti: quo magis etenim arctantur a frigore vasa, quo magis *atmosphæra* comprimuntur pondere, eo velocius, cæteris paribus, moventur contenti humores, unde frictio major, ac proinde calor; quæ tandem Sanguinem incrassant & condensant maxime — Certa hæc sunt omnia & constantia; sanguis enim, tali perdurante aëris constitutione, densus est admodum, atque glutinosus plerumque, vel si e sanissimis emittitur, multo magis ubi febris accedat.

Verum enimvero nec protinus oritur morbidus hic lentor, nec in omnibus; fit namque gradatim, cum diu nimirum regnaverit aquilonia & sicca tempestas, neque enim interest, quales dies sint, sed & quales etiam ante præcesserint. — Atqui laxis nimium & pituitosis hominibus adeo non nocet hæcce constitutio, ut vel si apprimè utilis, firmos hos magis, ac vegetos, efficiendo; una sic natura, præceptore optimo notante*, ad hyemen, alia ad æstatem, bene aut male se habet. — Hinc insuper esse videtur, quod una febris *epidémica* fortibus est funesta & robustis, parcitque imbecillis, alia vero, sub humido tepidoque cælo nata, in hos teneros maxime sævit. — Ex magnis igitur *atmosphærae* mutationibus vel mutatur maxime morbus popularis, vel supprimitur prorsus; quod persæpe videmus.

Ad mala autem sicca & frigida tempestatis præcavenda (imo & tollenda) utendum est multa, diluente, emolliente, tepida potione, victuque molli & relaxante, neque unquam ante progredi quis

* *Hippocrat. Aphorism. 2. Sect. 3.*

quis debet, quam tepidum aliquem potum assumpserit, sive pedibus, sive equo, eundem est contra ventos aquilonares; at si inhorrescat aliquis inde, ac febricitet, mittendus est actutum sanguis, potissimum si thoracis, aut lateris dolor impetat; idque sane mox repeti debet, si febris invalescat — Hoc utique perpetuum est, quod sanguis nunquam tutius, aut felicius, in morbis acutis mittitur, quam frigidas inter & siccas aëris constitutiones, altius perstante *Barometro*: nec in pleuriticis solum & peripneumonicis consentaneum hoc est, sed in aliis plurimis, utpote *variolis*, *morbillis*, *rheumatismo*. colica, &c. — imo in ipsis febribus intermittentibus, quotidianis putata, ac tertianis, opportuna tunc sæpe est venæ sectio, per initia saltem, ex facili aliter in continuas ardentes, aut *inflammatorias*, haud raro mutantur.

E contrario, humida tepidaque *atmosphærae* *Καλοκαιρίας* fibras relaxat nimium, vim vasorum enervat, sanguinem debito solutiorem, pituitosum, inertem facit, totumque corpus hebes, humidum, languidum, febribus lentis, putridis, intermittentibus longis, obnoxium — Hic ergo contraria prorsus diæta, atque medicina est adhibenda; quæ solidas corporis partes firmare, quæ fluidorum *crasim* conservare, quæ valide compingere globulos sanguineos possint, indicantur; Potus nempe subausterus, frigidus, generosus, victus valentior, deficcans, astringens, balneum frigidum, ejusque generis alia. — Ad hujus autem constitutionis febres parum utique confert sanguinis detractio, quinimo nocet admodum, si sit effusior, oriuntur namque ab imminuta cordis & arteriarum potentia, a laxa nimium sanguinis textura, & lentefcente lymphâ; tendit

hinc ad *stasin* atque putredinem liquidum vitale, unde febres intermittentes, lentæ, putridæ, malignæ, hujus tempestatis semper sunt soboles; in quibus equidem curandis, quæ vires foveant, desiderantur, quæ minuant neutiquam — Sæpissime etiam, dum talia permanent tempora, quotidianæ, ac tertianæ, in longas continuas putridas febres degenerare solent, haud levi cum ægrotantium periculo, quas si tandem effugiant in icterum, atque hydropem, incidunt plerumque. — Nunquam profecto citius, neque felicius, restituntur ægrotantes, quam sudo effulgente cælo, atque in *Baroscopio* stante *mercurio*; hoc ego observavi constanter, idemque olim notavit percelebris *Frid. Hoffmannus*, in medicina faciunda diutissime versatus, lentissime contra convalescunt, dum nubilus perflat ac pluviosus Auster.

Cæterum & haud parum insalubris est gelidus humidusque *atmosphærae* status, multis quippe modis obest, præcipue frigidos insinuando in corpus humores, atque *perspirationem* inhibendo plurimum * — bene tunc nobis cingendum est vestibus, luculento etiam foco, debitoque vitæ regimine, ab algidis vaporibus, quantum possibile, cavendum est; omnibus denique modis *perspiratio* est promovenda, inter quos frequens totius corporis frictio ad ignem confert plurimum, necnon exercitatio quotidiana **, eaque etiam paulo fortior,

Semper

* Vel paucae subitanæ nubes sub fervido cælo perspirationem impediunt plurimum. Vid. Observat. accuratissimæ *Job. Lining. M. D. Philosoph. Transact. N. 470.*

** Quantum promovet perspirationem, vid. elegantissima Experimenta *Georgii Rye*, Armigeri, in medicina Statistica Hybernica; ad calcem Libri Doctiss. *D. Rogers* de Morbis epidemicis,

Semper adeo pugnare debemus contra peculiarem aëris intemperiem.

Eluceant magis forsan, quæ dixi supra, si morbos *endemicos* perpendamus; horum namque pars longe major haud dubio nascitur a singulari cujusque loci, ubi infestant, *atmosphærae* depravatione; in locis videlicet cavis, palustribus, uliginosis, grassantur semper febres lentæ, putridæ, intermittentes, irregulares, quæ nullis fere cedunt remediis, nisi mutato prorsus & loco & aëre, ibi quoniam *atmosphæra* humidis perpetuo & noxiis abundat vaporibus, qui vim fibrarum debilitant, *perspirationem* supprimunt, corrumpunt humores—ideoque si quis advena, udis in his locis, crassoque versatur aëre, per dies vel paucissimos, certo fere certius ægrotabit—si retentum namque *perspirabile* nec per alvum, nec per urinam, neque per ipsos cutis meatus, intra perbreve tempus expellitur, febris * mox creat plus minusve; eoque fit gravior, quo major fuerit retenti quantitas, quo acrior qualitas ejusdem **. —Æstate igitur, vel autumno, magno dum calore acriores multo facti sint humores, intercepta *perspiratio* maxime nocet.

Contra qui montes habitant aridos, aquilonem spectantes, febribus *inflammatoriis*, pleuritide, peripneumonia, angina, affliguntur plurimum: Has utique in locis editioribus frigidis, Septentrioni expositis, crebro notavi esse perfrequentes, cum per valles autem rarus fuerit admodum aliquis pectoris morbus—Quid quod & interdum vidi febrem *catarrhalem epidemicam*, *pleuro-peripneumoniæ* naturam induisse per loca montosa

M 5 & alg-

* *Sanctorii* Aphorism. II. Lib. I.

** ——— 46. *ibid.* — 35. Sect. 2.

& algida, dum in humilioribus ad lentam proxime (seu *nervosam* ut dicitur) febrem accessit — Hinc equidem haud obscura videtur ratio, cur uno, eodemque regnante morbo populari, variis in locis, diversus celebratur modus medendi.

Sed & hic quoque ratio ventorum habenda est plurimum, *atmosphæram* quippe maxime mutant: Boreas nimirum siccam, frigidam, ac ponderosam facit; Auster vero humidam, levem, atque tepidam; magnam adeo vim habent loca reddendi salubria vel insalubria, & diverso plane modo afficiuntur incolæ, hoc perflante, vel illo, vento — Qui frigidis ergo læduntur & siccis, humectare, ac tepida subinde potione fovere corpora debent; qui humidis siccare; semperque peculiari aëris inclementiæ victu, regimine, atque medicina, obstandum est — Neque hoc solum, sed & noxios adversus ventos, quantum fieri potest, muniendum est, ædificia scilicet extruendo sic, ut quam minime sint objecta flatibus perniciosi — Pestilentiae quondam, Corcyrae grassanti, occurrebat *M. T. Varro*, oclusis fenestris Austrum spectantibus, aliis ad Arctum apertis * — Magna sane fuit priscorum diligentia in ædibus condendis & oppidis, ut prospera foret incolarum valetudo; Viscera etiam animalium, iis in locis pascentium, ubi ædes ponere statuebant, sedulo perscrutabantur, an nempe sana essent, vel insana; atque ita prospiciebant futuræ habitantium saluti, omnibus modis quærentes salubritatem ** — Nunc vero dierum, in ædificationibus, plerumque pluri aestimatur lucrum atque mercimonium,

* *Varro* Lib. 1. Cap. 4, inter Scriptores de Re rustica, ex Edition. *Gesneri Lipsiæ*, 1735, 2 Vol. 4,

** *Vitruv.* Edid. *Philandri*, 4. Lib. 1. Cap. 4,

monium, quam salubritas — de quibusdam hercle, ut de Mitylene olim *Vitruvius* *, vere dicendum est, „Auster cum flat, homines ægrotant, cum Corus, tussunt, cum Septentrio, restituuntur in sanitatem, sed in angiporis & plateis non possunt consistere propter vehementiam frigoris, — Haud pauca ædificia quidem in convallibus paludosis ita male locata sunt, ut nunquam non morbis infesta sint; quorum possessoribus utique consilium commendo laudati *Varronis* **, „ea vendant quot assibus possint, aut, si nequeant, relinquunt.“

Sed hæc obiter; qui vult plura de situ locorum, adeat magni *Hippocratis* librum de *Aëre, Aquis & Locis*; porro librum secundum de *Dicæta*, ubi etiam de diversorum ventorum natura — perplurima certe in his lectu sunt dignissima.

Quaquam aliquæ febres *epidemicæ* a contagione ducant originem, oriuntur attamen plures ab intemperie aëris manifesta, neque enim probabilis magis videtur communis morbi causa, quam ipse aër omnibus communis — Per humidam equidem tepidasque *atmosphærae* constitutiones, permanentes diu, febres lentæ, putridæ, malignæ, semper grassantur, sicuti observavit tota medicorum schola ab ultima antiquitate ad hoc usque tempus; nec profecto cessant tales, nisi omnino mutata aëris temperatura, quod etiam persæpe supprimit brevi ipsas contagiosas: — imo ipsæ pestilentiae ut plurimum occurrit ficcum frigus hybernum; frequenter autem nimis, sub humido calidoque cœlo, vim maximam accipit. — Atque ego quoque novi sæpius febres putridas, malignas,

* *Vitruv.* Edit. *Philandri*, Lib. I. Cap. 6.

** *Varro* de Re rustica, Lib. I. Cap. 12.

malignas, per æstuosam ac nebulosam *atmosphæram*, tum vi, tum numero, auctas maxime, mox tamen, sicco flante Borea gelidoque, extinctas penitus—Imo ipsæ procellæ sæpe juvant admodum morbida dissipando *miasmata*: haud minus corrumpitur stagnans aër, quam aqua stagnans, quæ cito, nisi movetur subinde, putrescit.

Quidam insuper morbi singulis anni tempestatibus respondent, pleuritides nempe, peripneumoniæ, anginæ, tertianæ febres, tempori verno, autumno autem quartanæ, putridæ, malignæ, cholera, *dysenteria*; quod nimirum solita, istis temporibus, aëris dispositio his producendis morbis, aut illis, faveat.—Atqui si intempestive se habuerint tempestates, morbi proinde variabuntur maxime, ita ut isti, qui autumno sunt proprii, per calidum humidumque ver dominari possint, per autumnum vero frigidum febres veri magis peculiare, utpote pleuritides, peripneumoniæ*, &c.—Sed plerumque in febribus autumnalibus, qualescunque sint, humores longe magis ad putrescentiam tendunt ob prægressum æstatis calorem, nec adeo largum admittunt sanguinis dispendium.—Suppressa, ex suscepto frigore, *perspiratio* vere febres *inflammatorias*, autumno putridas plerumque, aut malignas, generat** —imo si, per autumnum, infestant alvi fluxus, multo magis acres sunt, ac biliosi, quam tempore verno, ut satis superque medicis notum est—Æstatis siquidem ardor *perspirationem* auget maxime, corporis humidissima difflat, sales oleaque animalia exasperat, unde nascitur sensim magna sanguinis acrimonia; quæ ad autumnum usque

* Hippocrat. Lib. de Humor. Sect. 7.

** Sanctor. Aphor. 35. Sect. 2.

que increfcit, nifi diluentibus idoneis, atque demulcentibus, temperatur quotidie.

Sed audi de his rebus Coum oraculum *, Naturæ interpretem: — „Omnium generum morbi
„profecto omnibus temporibus fiunt, quidam
„vero in quibusdam magis gignuntur, & exacer-
„bantur, *Aphor.* 19°. Sect. 3. — Qualia tempora
„(Ὡραὶ) tales morborum constitutiones — tem-
„pora tempeſtiva, & bene ordinata, morbos re-
„gulares (εὐσαθέας) & iudicatu faciles faciunt. Lib.
„de *Humorib.* Sect. 7. & *Aphorism.* 8. Sect. 3 — At-
„qui, prout variaverit tempus, fimiles, aut dis-
„fimiles erunt morbi, qui in hoc oriuntur, Lib. 1.
„de *Humor.* Sect. 7. — Conversiones temporum **
„(Anni) maxime pariunt morbos, & in ipsis tem-
„poribus magnæ mutationes, frigoris puta, aut
„caloris; & fic de cæteris, *Aphorism.* 1. Sect. 3.
„Lib. de *Humorib.* Sect. 8. — Constitutiones ho-
„minum aliæ ad æſtatem, aliæ ad hyemem, bene
„aut male ſe habent, morbi porro ad tempora,
„*Aphor.* 2. 3. Sect. 3. Lib. de *Humor.* Sect. 8. — In
„anno autem aliquando hyems maxime prævalet,
„aliquando ver, modo æſtas, modo autumnus,
„Lib. de *Natur. Homin.* Sect. 16. — Hyeme pituita
„in homine augetur, ibid. Sect. 12 — Vere pitui-
„ta magis dominatur, at ſanguis increſcit, ibid.
„Sect. 13. — Æſtate ſanguis adhuc viget, ſed &
„bilis exaltatur; per æſtatem etiam, ac autum-
„num, bile corpus abundat; Autumno autem
„atra bilis plurima eſt & fortiffima, ſanguis vero
„parciſſimus, ibid. Sect. 14.”

Qui-

* Citavi plerumque *Hippocratem* ex editione *Lindeni*, non quod hanc valde probo (nam *Foëſianam* huic longe antefero) ſed quia *Textum Hippocraticum* in varias diſtribuit Sectiones; quo facilius inveniantur loca citata.

** Ἀεὶ μετὰβολαὶ τῶν Ὡρῶν.

Quicumque morbi hyeme augeſcunt, æſtate ceſſant, qui per æſtatem increſcunt, deſinunt hyeme, Lib. 3. *Epidemic.* Sect. 3. & *de Natur. Hominis*, Sect. 17. — Sin autem diu productam hyemem inſequitur ver perfrigidum, hyberni fiunt morbi, tuſſes, peripneumoniæ, anginae: — quinimo ſi ver proceſſerit more autumnii morbum regium producit, licet proprie ſit morbus autumnalis, Lib. *de Humor.* Sect. 7. — Siquidem vero hæc, vel illa, anni conſtitutio duraverit diutius, morbi huic congruentes diutius quoque permanebunt, atque eo erunt fortiores, quo magis prævaluerit & perduraverit tempeſtas peculiaris; etiam & comuniſſimi graſſabuntur, & perlongo tempore perſtabunt, *Aphoriſm.* 7. Sect. 3. Lib. *de Humor.* Sect. 9. — Ex anni conſtitutionibus ſiccitates (Αὐχμοί) ſunt pluvioſis ſalubriores, ac minus lethales, *Aphor.* 15. Sect. 3. — etſi per magnas ſiccitates febres acutæ, ibid. *Aphor.* 7 — Sed in valde pluvioſis febres longæ, putridæ, alvi fluxiones, anginae, apoplexiæ, ibid. *Aphor.* 16. — Auſtri caput gravant, corpus diſſolvunt, & humidum, languidum, hebes faciunt* — Aquilo tuſſim movet, fauces exaſperat, ventrem aſtringit, horrores excitat, item dolores lateris & pectoris, attamen corpus compactum, firmum, agile reddit, & bene coloratum, ibid. *Aph.* 5. 17. — & Lib. *de humor.* Sect. 8. — Aquilo enim omnium ventorum eſt maxime ſiccus, atque ideo ſaluberrimus; Auſter vero quoad omnia huic contrarius, Lib. *de Morbo Sacro* Sect. 15. — Si hyems ſit moderata, nec valde mitis, nec valde frigida, vere porro, ac æſtate, tempeſtiva decidat plu-

* Νότος καὶ βαρύνος, ideo aptiſſime hunc plumbeum vocat *Horatius*, Lib. 2. *Satyr.* 6.

pluvia, annum esse saluberrimum consentaneum est Lib. *de Aëre Aquis & Locis*, Sect. 25. — At si sicca sit hyems, atque aquilonia, ver autem pluviosum, & australe, erit aestas febribus abundans; nam, aestu mox accedente, non potest fieri, quin acutissimæ febres per plurimos invadant, præcipue pituitosos, dysenteriae verum mulieres & viros humidiores, ibid. — Atqui si circa caniculæ exortum accedunt pluviae, frigidique Aquilones*, spes cessationis est, nec non autumnus salubris, ibid. Sect. 26. — Si quando aestatem pluviosam, atque austrinam, similis sequitur autumnus, plurimos morbos excitat hyeme — Siccae autem aestati, boreaeque perflatae, pluvius, & australis, succedens autumnus, hyeme producit capitis dolores, cerebri corruptiones**, gravedines, raucedines, tusses, imo & tabem, ibid. Sect. 28. — Quod si aquiloniis sit autumnus & siccus, neque pluviae sub cane, nec vel sub Arcturo, decidunt, confert equidem pituitosis, humidis, ac mulieribus; biliosis vero nocentissimum est, quod humidissima corporis dissipat, crassissima autem & acerrima relinquit, ibid. Sect. 29. — Medicus ideo sic morbis occurrere debet, ut respiciat semper cum hominum constitutiones, tum etiam varias tempestatum mutationes, contraria nempe contrariis curando; oportet igitur laxa nimis constringere, solvere stricta, Lib. *de Natur. Hominis* Sect. 17, 18.

Nec tantum revera diversos diversarum tempestatum morbos descripsit optime divinus Senex, sed optimum quoque regimen, atque medicinam, ad hos præcavendos, ac curandos, præscripsit, præcipue in Lib. *de Salubri Victus Ratione*, nec non per initia Lib. 3. *de Diæta* — Sed ista jam
nunc

* Καὶ χειμὼν καὶ οἱ Ἑτήσιαι. ** Σφακέλους τοῦ Ἑγκεφάλου.

nunc perscribere longum est — Hæc pauca vero passim ex scriptis *Hippocraticis* excerpti, & paulo forsan transtuli liberius, cum eo tamen (ni fallor maxime) ut sensum semper auctoris tradiderim fideliter — Sed propius ad fontes accedite, medici tyrones, atque haurite affatim, percipietis inde quam sagax, quam admirabilis fuit priscorum diligentia — videbitis utique, non minus ingeniosam fuisse antiquitus observationem, quam nunc rationem; ut pulchre de veteribus olim dixit *Caius Plinius*, *Histor. Natural. Lib. 18. Cap. 29.*

At enim si quis fortasse his objiciat, quod observationes ab *Hippocrate*, suaeque schola per Græciam factæ, ad nostrates pertinent parum; sciat ille velim, similem esse ubique hominum naturam, sicco nempe frigore semper & constringuntur corporis humani solidâ, & condensantur fluida, hæc porro utraque humidus calor solvit semper; nusquam non minuit *perspirationem* uda frigidaque tempestas, hanc nusquam non promovet tepida serenitas: adeoque magnæ aëris mutationes, quod ad calorem, aut frigus, siccitatem, aut humiditatem, magnos pariter ubique terrarum sortiuntur effectus — Nec profecto multum differre videntur, facta diligenter comparatione, observationes *Hippocraticæ* ab illis, quæ captæ fuerunt nuperis annis, & in locis a Græcia longe longeque remotis, inter etiam

et penitus toto divisos orbe Britannos.

Sed diluit hanc objectionem optime clarissimus *Wintringhamus* in prolegomenis ad commentarium suum nosologicum: — Subjiciam vero & ipse, quod, etiam si Græciæ regiones cœlo magis clemente gaudeant quam insula nostra, haud levibus tamen aëris mutationibus subjectæ sunt frequenter; imo in ipsis constitutionibus, ab *Hippocrate*

crate descriptis, leguntur subinde, Ὕδαλα πολλά, Αὐχμοὶ, Χειμῶνες μεγάλοι, Χιόνες μεγάλαι, Οὐρανὸς λαιλαπώδης, ἐπινέφελος, &c. quin ejusdem plane generis febres populares apud *Hippocratem* passim occurrunt, quibus & nostra quoque *Britannia* ple-
ctitur subinde — *Epidemica* quippe febris effectus tantum est causæ *morbificæ*, ista autem causa plerum-
que peculiaris *atmosphæræ* constitutio; adeoque hanc gignit aquilonia, illam austrina, ubicunque nimirum hæc, vel illa, diu duraverit.

In sequente (nec non in præcedente) Morbo-
rum *epidemicorum* historia, non tantum febres po-
pulatim grassantes exposui, sed & hos etiam mor-
bos, qui una cum istis sparsim intercurrerant;
eo scilicet animo, ut singulorum inde natura
clarius innotesceret; sequens in hoc utique ma-
gni præceptoris vestigia, qui in describendis aëris
& morborum constitutionibus hanc tenuit ratio-
nem. — Sæpe quippe sæpius accidit, dum pleuriti-
des & peripneumoniæ per siccam valde & frigi-
dam tempestatem sæviunt, anginæ quoque, *oph-
thalmicæ*, *rheumatismi*, cruciatus intestinorum, eo-
dem etiam tempore, multos infestant; atque ut-
plurimum haud minus ab inflammato, ac viscido
sanguine pendent quam ipsæ pleuritides, nec mi-
nus sanguinis missionem postulant, aliis quan-
quam temporibus melius multo purgantibus discu-
tiantur. — pone jam aut *variolas*, aut *morbillos*,
tunc una grassari, longe tum sane liberius, cæteris
paribus, venæ sectionem, his in morbis, con-
sulerem, quam ubi non talis prævaluerit frigida
atmosphæræ temperies, nec proinde tam viscida
sanguinis *diathesis*.

Si noscimus equidem, qualem sanguinis *crasin*
hæc progignit, vel illa *atmosphæræ* constitutio,
satis bene conjectare possumus, quales inde cor-

poris affectiones sint futuræ, qualiaque poscant remedia; Morbi enim, ut monet *Hippocrates*, non derepente hominibus accedunt, sed paulatim sunt collecti, licet erumpant subito; — *Exempli gratia, robustis & exercitatis hominibus insitus est naturaliter sanguis densus atque tenax, adventante jam arida, & aquilonia tempestate, fibræ vasque magis adhuc constringuntur, magisque densa atque crassa redduntur fluida, usque eo ut sanguis tandem fiat valde glutinosus; his jam ita constitutis, mox oritur facillime, ex frigore suscepto, labore nimio, ingluvie, aut quolibet ferme, in vita, errore, lentor inflammans, qui infixus nunc pulmoni peripneumoniam, nunc pleuræ pleuritidem, nunc intestinis colicam inflammationem, generat.

Vides adeo, lector amice, quantum ad prophylaxin valeant observationes meteorologicæ, quantumque etiam ad morborum curationes. — His igitur frui modo, tandemque meliores ede. — Quatenus nobis denegatur diu vivere, relinquamus aliquid, quo nos vixisse testemur **.

* Lib. I. de Diata Sect. 3. ** *Plinii* Epist. Lib. 3. Epist. 7.





DE AERE, ET MORBIS EPIDEMICIS,

ANNO MDCCXXXVIII.

Nova Luna Die 9. JANUARIO. *Plena Luna* 24.



RIENTE anno totum obducitur cœlum nubibus, quæ continuas fere destillant pluvias, furente subinde procella. Hoc vero per initia mensis, post enim pluvia parcior, at durat usque constitutio aëris crassissima, ac maxime humida, quæ *Barometrum* ad stationem præaltam sustinet; quod quidem sæpissime accidit, dum *atmosphæra* * est valde nebulosa, vapore nempe una cum aëre premente.

Rarum hoc mense gelu, nec frigus solitum, ventus plerumque inconstans, malacia nonnunquam.

Pluvia	$\frac{''}{1}$	$\frac{''}{2}$	$\frac{'}{3}$	4.	5.	$\frac{'}{6}$	$\frac{'}{7}$	$\frac{''}{8}$	9.	10.	— 12.
	$\frac{'}{13}$	$\frac{'}{16}$	$\frac{''}{21}$	22.	23.	30.	= 2.974.				

Dig. Dec.

Nox procellosa 2. W S W 4. Procella 5. p. m.
S W 4. Fulgur, tonitru, & turbo vehementissimus

* Vide Mens. Januar. 1728, Vol. primi.

simus 6. Hora sexta p. m. Procella 7. p. m. SW 4, gravis procella 9. p. m. & tota fere nocte SW 4x. Nix & grando 11. Gelu 14. 15. NNW 1. Magna AB. 14. H. 10. p. m.

☿	Altitud. maxim.	17. 30, 5 N 1.	} media 29. $9\frac{29}{9}$.
—	—	minim. 9. 29. 0 SW 4x.	
Dies	frigid.	15. 66. NNW 1.	} media 54 $\frac{7}{9}$.
—	tepid.	23. 48. Malacia.	

Febris *catarrhalis* & *rheumatismus* passim, *pleuritides* aliquæ, *peripneumonia* notha * vero longe frequentior est; tussis creberrima; gravis arthritis torquet permultos. Febris lenta, *nervosa* frequens, quæ nonnunquam, rubris urentibus pustulis, die nempe nono, undecimo, aut decimo quarto, erumpentibus, solvi videtur, maxime si crassæ, subsidentes urinæ concurrunt. Haud multum utique boni sperandum est ab eruptione pustularum, dum urinæ crudæ prorsus & tenues perstant; in ipsis etiam *variolis* ac *morbillis* pessime significant: Ne vel ullus sudor salutifer habendus est, dum aquosa fertur urina.

Nova Luna 7. FEBRUARIO. *Plena Luna* 23.

Perstitit ad quintum Februarii diem humidissimus *atmosphærae* status, tunc Boreas discussit vapores rigido accedente gelu: a decimo sexto ab occidente plerumque ventus, ac alia rerum facies.

Pluvia 8. $\frac{''}{16}$. 17. $\frac{''}{18}$. 20. $\frac{'}{22}$. 24. 26. 27.
Dig. Dec.
= 0.928.

Nix super montes 14. nulla hic autem.

☿ Altitud.

* Vide quæ de Peripneumonia notha dixi, in Libro de Febribus. Horum Operum. Voll. II. Cap. de Peripneum.

§ Altitud. maxim. 6. 30,4. ENE 1. } media 29.8 $\frac{4}{8}$.
 — — minim. 18. 29,0. S W W 3 }
 Dies frigid. 13. 75. NE 1^x. }
 — tepid. 1. 49. N W b W 1. } media 58 $\frac{3}{8}$.

Tussis & angina inter equos valde frequentes, haud pauci suffocantur. — *Pleuritis*, aut *peripneumonia*, multos corripit homines, spuria tamen est ut plurimum; Tusses permultæ.

Tempestas quidem haud insalubris est, at plures jam *phthisi* tabescunt pulmonaria, cui dedit originem male judicata febris *catarrhalis* * hic maxime sæviens ultimo Novembri & Decembri. Periclitantur admodum, qui asthmate olim, aut tussicula sicca, laborabant, quorum in pulmone nempe delituerant tubercula; quæ, cum sint impedimento trananti sanguini, facile inflammantur, ac in ulcera tandem degenerant; vel, negata, his in locis obstructis, sanguini via, nimius ruit ad alias pulmonum partes, unde *hæmoptoe* sequitur denique, aut inflammatio, aut tabifica in *bronchiorum* cava destillatio.

Non omnis utique tabes pulmonaria ab ulcere pendet (rarior enim est hic casus, quam vulgo putatur) plures enim quotidie per longum tempus immensam muci falsi, dulcis, vel etiam plane insipidi, copiam per tussim rejiciunt, cui nec foetor inest, nec purulenti aliquid, glandulis nimirum cum ductibus asperæ arteriæ relaxatis nimium. Hoc tamen sæpe, licet ægros diutius trahens, haud lethale minus sit, quam si vel ipsam saniem expuissent. Haud ablimilis interdum laticis vitalis est profusio *Diabete* laborantibus; simile quid sæpe *diarrhæa* tabescentibus, ubi ne vel minimum ulcus, ut incisis cadaveribus patuit.

N 3

Nuper

* Post nimias destillationes Tabes, *Cels.* Lib. II. c. 7.

Nuper trimulum incidi puerulum, pertinace admodum alvi fluxu pereemptum; hujus intestina peralaba, tenuissima, sedula quasi arte deterfa inveni, minime autem ulcerata.

Augetur semper hoc malum ex levissimo suscepto frigore, oclusis scilicet cutis spiraculis, maximum fit in pulmones influvium; haud aliter sane quam persæpe videmus retentum *perspirabile* per nares depluere. Contra sicca frequenter urget tussis, & spirandi difficultas, obstructis adeo & induratis pulmonum glandulis, ut in lapideam pene abeant duritiem*, dum *bronchia* præ nimia siccitate rigescant, mucos naturali deficiente. Quis non videt, quam diversam prorsus medicinam poscant hæc duo mala, utcunque in praxi faciunda haud semper satis probe servatur distinctio? Nec pauci sunt equidem, qui in omni fere tussi, sit sicca, sit humida, *oleosa*, *emollientia*, *dulcia*, *ecclegmata* porrigunt. Id quidem in priore recte satis, modo *incidentia* aliqua commissa sint; secus longe ubi serosa colluvies inundat pulmonem: relaxant enim nimis, humoribus lentorem inferunt, & *perspirationem* impediunt; unde augetur vel ipse morbus. Cibi insuper appetentiam & concoctionem pessundant, demumque *diarrhæam* colliquantem inducunt. Rectius multo blande moventia sudores**, inter scapulas *epispastica*, ac lenia subinde *cathartica* præcipienda sunt, interpositis crebro *anodynis*; maxime si sit tenuis admodum ac irritans illuvies, hanc enim demulcent & incrassant, quo facilius longe

* Haud ita pridem juvenem generosum, tabidum, vidi lapillos asperos extuscentem, qui, tracheam lacerantes, haud leve sanguinis sputum movebant.

** Vide *Bennet. Theatr. Tabidor. Sect. 28. 30. &c.*

longe per sputa emolitur. Porro ad hoc genus valetudinis plurimum facit decoctum corticis *peruviani* cum ligno *guiacino* & styrace, quod in altero casu foret nocentissimum: Nec inutiles hic sunt suffitus * desiccantes idonei, qui quidem in destillationibus haud parum valent.

Ubi vero *tracheæ* & *bronchiorum* glandulæ obstruuntur, nec satis oleosi mucoris fecernunt ad lubricandas eorum membranas; atque, uti sæpe fit, lacerti musculosi asperæ arteriæ ** & Bronchiorum rigidi sunt, ac nimis contracti, ibi lenis, emolliens, tepida potio, ejusque vapor, hausta sæpissime proficiunt maxime, oleosis, & relaxantibus subinde assumptis.

Nova Luna 9 MARTIO. *Plena Luna* 24.

Principio ventus *borealis* afflavit, mox irruebat Auster madidus, a decimo autem ad decimum sextum Aquilo ficcam fecit *atmosphæram* & frigidiorē: Libs inde ut plurimum, pluvia sæpe cadente.

Pluvia 5. ⁿ 8. 9. 11. ⁱ 17. 18. 19 — 22. ^u 23.
Dig. Dec.

24. ^u 28. ⁱ 29. 30. Grando 1 = 1.730.

Levis Procella 8. p. m. S S W 4x. — gravis procella 19 mane S 4x.

♀ Altitud. maxim. 31. 30, 1. N N W 1. } media 29.5 ²⁴/₃₀.
— — minim. 8. 28, 8.

Dies frigid. 16. 62. N N E 1. } media 54 ⁶/₃₀.
— tepid. 22. 46. S S W 2.

Frequens *ophthalmia*; Tussēs plurimæ & acres admodum, quæ utique exitio sunt pluribus, illis
N 4 maxime,

* Vid. Bennet. l. c.

** *Andre Laurent*. *Histor. Anatomic.* Lib. 9. c. 14, porro *Jo. Bapt. Morgagni* *Adversar. Anatomic.* Sect. 25.

maxime, qui *asthmate* vetere laboraverant, aut quibus infelix exitus *epidemicæ* febris hyemalis obstructum pulmonem, & pectoris oppressionem intulerat, cita nempe *phthisi* abreptis.

Pleuritides & *peripneumonice* frequentes; sæpe etiam & latus vehementer affectum est & pulmo; morbum vocant *pleuripneumoniam* *, in quo, dum sævit lateris dolor, urget simul tussis & pectoris gravitas: Fit evidentior, si sputa sanguinolenta exantlantur.

Jam certe multa sputa cocta, facilia, non multo sanguine tincta, morbum solvunt feliciter; sæpe tamen vel tenuis prorsus & acris colluvies ejicitur, vel vana sunt omnino naturæ conamina, eludente nimirum pertenui & incocto humore vim pulmonis: Pessimum certe ubi nihil excreatur, aut nil nisi crudum & spumofum **.

Nunc quoque in his malis pulmoneis haud raro erumpunt pustulæ magnæ, urentes, imo etiam interdum dolentes valde, circa pectus, scapulas, cervices, quinto circiter aut septimo plerumque die, quarum aliquæ plurimum acerrimum fundunt *ichorem* ***: Felix hoc semper ferre & faustum fuit ægrotis. — Diligenter utique in morbis notandum est, quo natura sua sponte vergit; adeo cum pustulas excitet, aut furunculos in humeris, aut cruribus, per eas quoque vias arte tentandum est morbum levare, admotis *epispasticis*, cucurbitulis, &c. — In omni itidem naturæ molimine, sive sit per cutim, sive per alvum, aut urinæ vias, aut libera sputamina, invigilandum

* Vid. Librum nostrum de febribus, Vol. II &c. Cap. de Peripneum. &c.

** Vid. librum nostrum de febribus, &c. Vol. II. l. c.

*** Φλύκταιναι, Hippocrat.

vigilandum est medico ut idonea & concurrentia adhibeat auxilia.

Nova Luna 8 APRILI. *Plena Luna* 23.

Varius fuit ventus variaque tempestas hoc mense, imbre, ut solet, decidente frequenter: exeunte mense Eurus spiravit plerumque, isque frigidus valde.

Pluvia 1. 4—6. 11. 12. 14. 15. 19. 21.
Dig. Dec.

22. 23. 24. 25 = 1.110.

Glacies 20. 24. E N E 1. Levis AB. 5. H. 10.
p. m. 10. W N W 2.

♀ Altitud. maxim. 17. 30,2. Eb N 1. } media 29.6 $\frac{1}{3}$.
— — minim. 23. 28,8. W S W 2. }
Dies frigid. 20. 56. E N E 1. } media 47 $\frac{1}{3}$.
— tepid. 13. 40. S W 2. }

Plures *ophthalmia* vexantur: tussis plurimæ; haud pauci jam acri tussi & *hæctica* febre consumpti pereunt. Id utique perpetuum est, quod sæviante *epidemica* tussi *asthmatici* & pulmonarii pessime se habent; novo nimirum accedente malo veteri morbo.

Qui *phthisi* laborant, periclitantur maxime ineunte æstate, quoniam augescente indies tempestatis calore sanguis expanditur, unde transit difficiliter per obstructos pulmones, hinc etiam augetur *hæctica* febris & sudor colliquans. Tales ideo ægrotantes hortor, ut se tunc ruri recipiant, ubi aura purior & frigidiuscula, lenis & accurata diæta, forsan & missus paulatim sanguis, si nimium ebullit, rapidum morbi cursum reprimere possunt.

Nova Luna 7. MAIO. *Plena Luna* 22.

Ventus australis, perpetuus fere ad diem vicissimum mensis, argentum vivum in *Barometro* suppressit, aëremque fecit densum ac humidum: inde per tres dies Boreas, postea Zephyrus.

Pluvia $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$. 6. 9. 10. 12. $\frac{1}{13}$. $\frac{1}{14}$. 15. $\frac{1}{17}$.
Dig. Dec.

18. 20. 22 — 24. 26. 27. 30. = 1.544.

☿ Altitud. maxim. 21. 29,8. NE 1. } media 29.4.
— — minim. 5. 29,0. SSW 1. }

Dies frigid. 2. 54. SSE 2^x. } media 38 $\frac{8}{29}$.
— tepid. 21. 30. Malacia p. m. }

Tusses, gravedines, & *ophthalmiæ* humidæ frequentes: Quosdam *apoplexia*, quosdam *paralysis* corripit; *Pleuritis* & *peripneumonia* multos præcipue ineunte mense: Febres intermittentes passim.

Nova Luna 6 JUNIO. *Plena Luna* 20.

Constans fuit ab occidente ventus per totum Junium, nunc ad Austrum, nunc ad Septentrionem flectens; Aër interim factus est crassus valde & humidus.

Pluvia 2. 4. 7. 8. 10. $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{12}$. 13. $\frac{1}{14}$. $\frac{1}{15}$.
 $\frac{1}{16}$. $\frac{1}{20}$. 22 — 24. Grando vehemens 12. 13.
Dig. Dec.

= 2.398.

Circius admodum ferox 1. p. m. Procella 14. prima nocte S W 4_x — 20 Mane S W b S 4. Fulgura 11 nocte.

☿ Altitud. maxim. 30. 29,9. NW 1. } media 29.4 $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{5}$.
— — minim. 16. 28,9. S W 2. }

Dies

Dies frigid. 18. 42. N W 1^x. }
 — calid. 30. 24. Malacia p. m. } media $34\frac{1}{2}\frac{3}{8}$.

Tussis acres & implacabiles fere sunt valde frequentes, multæ quoque *peripneumoniæ*, & veræ & nothæ; crebri, atque fortes interdum impetus *apoplectici*.

Qui capite magno sunt & breviori collo facti, multoque abundantes sanguine, ex facili in *apoplexiam* incidunt, quacunque de causa nimium calefiant humores. — His curæ sit ideo præcedente vere, ac invalescente calore, & sanguinem mittere, & leni, & parco victu, præcavere morbum; maxime si vertigo incidit, si capitis dolor, aut tinnitus aurium, aut falsi ac subiti splendores; hæc, ni caveantur mature, certa sunt sæpe sæpius subitanæ mortis prænuncia.

Nova Luna 5. JULIO. *Plena Luna* 19.

Magna jam cœli facta est mutatio, fuit enim hic mensis & siccus & calidus valde, flante plerumque ab Oriente, vel Septentrione, vento, qui *Barometrum* erexit, ac discussit vapores.

Dig. Dec.

Pluvia 11. 12. 14. 19. 20. 21. 23. 28. = 0.590.

Fulgur & tonitru 20 primo mane, dies valde fervidi 4. 17.

✂ Altitud. maxim. 3. 29.8. E 1. }
 — — minim. 19. 29.2. S W 2. } media $29.6\frac{5}{8}$.

Dies frigid. 31. 33. N 1. }
 — fervid. 4. 17. Malacia. } media $24\frac{6}{8}$.

Graves capitis morbi adhuc passim, & tussis plurimæ; *Colica* biliosa frequens; Sudores maxime profusi omnes fere debilitant valde. Per plures jam mulieres largissima patiuntur menstrua summo cum virium languore; an fuso sanguine, an rarefacto duntaxat?

Nova

Nova Luna 4. AUGUSTO. *Plena Luna* 18.

Redit pluvia tempestas, quæ porro pro anni tempore est admodum frigida, unde messis infelix: Corus subinde flavit, Libs sæpe, nonnunquam Vultur, interdum Aquilo.

Pluvia $\frac{1}{3}$. 5. 7. $\frac{11}{8}$. $\frac{11}{9}$. $\frac{1}{10}$. 12. 14. 17 — $\frac{1}{22}$.
Dig. Dec.

23. $\frac{11}{24}$. 25. $\frac{1}{27}$. 28. = 2.210.

Grando 10. Levis procella & fulgura 7 nocte
S b W 4x.

Altitud. maxim. 29. 29,9. N 1.	} media 29.6 $\frac{4}{30}$.
— — minim. 8. 29,2. S W b S 3.	
Dies frigid. 27. 39. NNE 1 ^x .	} media 32 $\frac{6}{30}$.
— calid. 9. 27. S W b W 2.	

Cholera, & morbus colicus passim: Anginæ, & febres putridæ haud paucæ. *Variolæ* jam frequentes a miseris *Salzburgeris*, Patria expulsi, huc advectæ.

Jure merito inter morbos maxime contagiosos ponuntur *Variolæ*, adeo ut vel unus puerulus hisce correptus, forte longe lateque sæpissime luem dispergit: Atqui nisi etiam una conspiret, contagium fovens, aëris constitutio, sæpe vel intra unum, alterumve domicilium, in ipsis quasi incunabulis, extinguitur morbus.—Hoc utique vel in ipsa peste quandoque notatur, quam Hyems frigida coercet*.

Nova Luna 2. SEPTEMBRE. *Plena Luna* 16.

Pluvia fere perpetua ad medium usque Septembrem, Africo subinde fremente, Vulturno inter-

* *Hodges* de Peste per initia.

interdum; a decimo octavo autem ventus orientem inter & Septentionem perstabat.

Pluvia 1. $\frac{1}{2}$ 3. $\frac{1}{2}$ 5. $\frac{1}{2}$ 6. $\frac{1}{2}$ 7. $\frac{1}{2}$ 8. $\frac{1}{2}$ 9. $\frac{1}{2}$ 10. $\frac{1}{2}$ 11. $\frac{1}{2}$ 14. $\frac{1}{2}$ 16. $\frac{1}{2}$ 18.

Dig. Dec.

$\frac{1}{2}$ 27. 28. = 2.912.

Procella 10 p. m. SW b W 4.

♀ Altitud. maxim. 30. 30,0. Eb N 1. } media 29.6 $\frac{2}{9}$.

— — minim. 10. 29,3. }
 Dies frigid. 29. 48. ENE 1. } media 39 $\frac{2}{9}$.
 — tepid. 1. 32. SW 3x. }

Multæ *Variolæ*, *morbilli* & tormina frequentia; Febris *catarrhalis* pueros infestat: Mensis vero fuit parum morbosus.

Nova Luna 2. OCTOBRI. *Plena Luna* 16.

Ineunte & exeunte mense ventus ab Oriente prævaluit, intermedio autem tempore fuit varius admodum, sæpe turbidus Auster perfremuit, labente *Baroscopio*, & pluvia ruente; a vicesimo tertio tamen nulla prorsus.

Pluvia 2. $\frac{1}{2}$ 3. $\frac{1}{2}$ 4. $\frac{1}{2}$ 5. $\frac{1}{2}$ 6. $\frac{1}{2}$ 7. $\frac{1}{2}$ 10. $\frac{1}{2}$ 11. $\frac{1}{2}$ 12. $\frac{1}{2}$ 15. $\frac{1}{2}$ 18.

Dig. Dec.

$\frac{1}{2}$ 20. 22. 23. = 3.330.

Procella 13. W S W 4x — 20. p. m. nec non insequente nocte S 4.

Maxima procella 23 Nocte S 4x. Maximæ pruinae 16. 17.

AB. 21. H. 10. NW b N 1 — 24. H. 9. W NW 1 — 25. NNW 1 — 27. H. 9. W b N 1.

♀ Altitud. maxim. 16. 30,4. ENE 1. } media 29.4 $\frac{2}{3}$.

— — minim. 6. 28,7. SW b S 3x. }
 Dies frigid. 22. 55. NNW 1. } media 45 $\frac{2}{3}$.
 — tepid. 5. 40. SW b W 2x. }

Variolæ

Variolæ & morbilli sparsim, *ophthalmicæ*, *rheumatismi*, & morbi colici frequentes: *Febres lentæ nervosæ* passim.

Nova Luna 31.
ultimo

NOVEMBRI.

Plena Luna 15..
Nova Luna 30.

Parca admodum Pluvia ante diem decimum septimum decidit, dum vel Subsolanus spiravit, vel ventus borealis, surgente *Barometro*; post irruit nimbofus Auster, multaque pluvia; quod *atmosphæram* humidavit plurimum, quæ fuit ante sicca fatis & tenuis.

Pluvia 8. ^{'''}17. [']18. [']19. [']20. [']23. [']24. ^{''}25. [']26. [']29.
Dig. Dec.

30. Grando gravis 27 primo mane = 1.874.

Procella 19 a diluculo ad feram vesperam S W 4.

———— 20 p. m. W S W 4_x — vehemens 25 p. m. S 4^x.

Maximus halo circa Lunam 10. 11. prima nocte ESE 2.

♂ Altitud. maxim. 9. 30,3. ENE 1. } media 29.7²³/₁₀.
— — minim. 25. 28,8. S 4^x.

Dies frigid. 9. 66, rigidum Gelu. } media 53⁷/₃.
— tepid. 20. 47, S W 3^x.

Pleuritides, *Peripneumonice*, & *ophthalmicæ* frequentes, præcipue mensis initio: Multi *rheumatismo* laborant, aliqui lenta febre. Tussis, anginæ, coryzæ, gravedines undique. *Variolæ* adhuc, *morbilli epidemici*.

Plena Luna 15. DECEMBRI. *Nova Luna* 29.

Per initia mensis aër tepidus & humidus, Libs fere perpetuus & pluviosus; ab undecimo ad vicesimum

cesimum quartum boreas perflavit, qui & *Barometrum* ad altitudinem enormem evexit, & frigidam fecit *atmosphæram* & paulo ficiorem: Ventus erat postea varius, frigidus, & pluvius.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 2. 3—5. $\frac{1}{6}$. 7—9. 12. $\frac{11}{20}$. $\frac{11}{25}$.

26—30. $\frac{11}{31}$. Grando cum fulgure & tonitru
Dig. Dec.

7. Nix 21 Nocte. = 2.404.

§ Altitud. maxim. 14. 30,7. NNE 1. } media 29.8 $\frac{2}{3}$.
— — minim. 3. 29,1. SW 2.

Dies frigid. 24. 72. ENE valde rigidum Gelu. } media 57 $\frac{1}{3}$.
— tepid. 2. 47. WSW 2.

Ophthalmiæ * *rheumatismi*, ac *morbilli* plurimi adhuc, *variolæ* passim: Multi vertigine corripiuntur. Anginæ, pleuriticæ & *peripneumonice* febres valde frequentes; haud paucæ lentæ *nervosæ*; longe plures tamen acutæ ab acri & inflammante viscido; quod, dum ad varias transfertur partes, varios producit morbos, *pleuritidem* puta, *peripneumoniam*, *anginam*, *ophthalmiam*, &c. prout nempe in hac, vel illa Parte consistat obstruens lentor. Nec mirum ideo, quod *ophthalmiam* in *anginam* interdum mutatam videmus, *anginam* in *peripneumoniam*. — Τῶν ὀδυνέων καὶ ἐν πλευρήσι καὶ ἐν στήθεσι, καὶ ἐν τοῖσιν ἄλλοιςιν μέρεσιν ἦν μέγα διαφέρωσι, καὶ αἰμαθιλέον.

Hippocr. Aphor. Sect. 6.

Tota Pluviæ Quantitas, quæ Ann. MDCCXXXVIII.
Dig. Dec.

decidit, fuit = 24.004.

Plena

* Per frigidas & humidæ aëris constitutiones diu durantes ophthalmias esse perfrequentes observavit *Frid. Hoffman*, *Medin. rational. Tom. 4. Part. 1. Cap. de Inflam. Oculor.*

Plena Luna 13. JANUARIO. *Nova Luna* 28.

Per anni initia pluviae multum & procellae, cecidit hinc *Barometer*, paulo tamen post, elucente fudo, resurgit, dum Corus intervenit; mox autem Libs nubilus; brevique iterum Corus; variante sic saepe vento variat quoque caeli facies: atqui per totum mensem aer fuit valde crassus & longe humidus, ac plerumque tepidior solito.

Pluvia $\frac{''}{1}$. $\frac{''}{2}$. $\frac{''}{3}$. $\frac{''}{4}$. $\frac{''}{5}$. $\frac{''}{6}$. 10—13. $\frac{''}{19}$. 20.

21. 23. $\frac{''}{24}$. $\frac{''}{25}$. 26. 28. 29. 31. Grando 1. 5.
Dig. Dec.

25. Nix 2 = 3.962.

Procella 3 nocte & tota die 4. W S W
4—6 Nocte W S W 4x.

———— 24. S W. 4—29 Nocte S S E 4x. Fulgur & tonitru 4. 25.

♀ Altitud. maxim. 11. 30,3. W N W 1 } media 29,7.
— — minim. 4. 28,7. W S W 4. }

Dies frigid. 2. 66. N W 1x. } media 54 $\frac{1}{2}$ $\frac{6}{9}$.
— tepid. 31. 50. S W 3x. }

Morbilli Epidemici, *Variolae* sparsim & ruri & in oppido: Plures acerbo admodum & pertinaci *rheumatismo* laborant, multos vehemens & diu durans arthritis excruciat. *Peripneumonia* & vera & spuria passim: Tussis convulsiva inter pueros frequens; acerrime quidem saepe post morbillos saevit, vix utique compescenda, nisi missione sanguinis tollatur *diathesis phlogistica*, ac colluvies acris lenibus expurgetur, miti nempe vomitione, & blanda catharsi, servata interim molli, diluente, accurata diæta: pessimus sane nutricularum mos est, carnem mox & piscem post morbillos porrigere,

gere, hinc enim sæpissime febris *peripneumonica* insequitur.

Plures gravi angina cum acuto aurium dolore capti sunt, cui non raro *Parotis* accessit sæpe in interiore aure, aut faucibus abscessus, imo nonnunquam *phrenitis* & strangulatio subita: Duos, tresve brevissime abreptos novi, attonitos quasi & prorsus stupidos, quibus vox primo mire admodum stridula, mox omnino interclusa fuit; horum tamen unus facilius multo quam quis crederet oblata quæcunque deglutiebat. — Dirum hoc symptoma quam maxime semper timendum est, quod inflammationem musculi *arytænoïdis*, & superiora asperæ arteriæ denotat; unde, occlusa penitus rima *glottidis*, spiritus protinus eliditur: estque stridulus hic clangor hujusce inflammationis signum *diagnosticum*. — In morbo hoc pestifero opportuna *bronchotomia* ægrum interdum vindicat ab imminente morte: Vana tamen est omnino, atque irritò celebratur auso, dum inflammatio pulmones etiam corripuit, uti funestum sæpe docuit experimentum. Hujus signa præcipua sunt pectoris oppressio, summa anxietas, perpetua *orthopnœa*, & suffocans quasi tusculula. Ita tamen non pertimescenda est hæc operatio, ut vix vena facilius tundatur; modo idoneus sit artifex. Quid quod memini, triginta abhinc annis, discipulum quendam chirurgicum vesano puellæ cujusdam amore percitum, qui *cartilaginem thyroideam* ter, quaterve scalpello pertudit, adeo ut lucernam extingueret illico flatus erumpens, dum officiose consueret vulnuscule magister chirurgus: quem monui, tandem advocatus, desisteret, potiusque, brachiis juvenis lectulo alligatis, prohiberet, ne violenta manu vitam impeteret rursus;

O

inde

inde emplastro solum adhærente, vulnera probe contegente, ex facili sanatus est.

Si qua unquam & cautela & festinatione simul est opus, in angina quidem suffocante necessarium est. Hoc tristi olim exemplo persens in quodam amico: erat hic sexagenarius fere, agilis, rubicundus, & *psychrolusia* gaudens fere quotidie. — Mane, die Saturni, frigidus, usus est pro more balneo, post meridiem gravi horrore correptus pene obriguit, pauloque post incaluit vehementer, mox accessit ardor faucium intolerabilis, ac dolor summus: Vesperi missus est sanguis; media nocte vocatus detrahi iterum ζxvi jussi, clysterem emollientem cum multo sale marino injici, *mannam*, *crêmorem tartari*, *nitrum ex decocto laxante* exhiberi affatim, *epispastica* largiora & acria cervicibus admoveri. Mane die solis, omnia pejora, adeo ut vel liquidi vel solidi deglutitio fere impossibilis, multo minus *mannæ*, &c. satis ad alvum solvendam. Hinc humeris cervicibusque affixis cucurbitulis extractus est sanguis ad ζx, locisque scarificatis applicata vesicantia, injectumque acrius *enema*; sed ne sic quidem ullatenus levatum est malum, imo jam vox evasit stridula valde, etiam & subinde intercisa prorsus; unde de *bronchotomia* fugeffi aliquid; id vero quasi esset hominem jugulare, non servare, mussitabant adstantes: timidulus factus, junior tunc medicus, destituti, ne ægrotum occidisse viderer nisi servassem. Secta adeo rursus est vena, ac repetitum *enema*: Iam paulo facilior deglutitio, multoque minus doloris, ast vox argutissima *, subinde nulla; porro *dyspnœa* maxima, anxietas summa, pulsusque vacillans.

*) Ὁξυφωνίη κλαυθμώδης, πονηρόν. Lib. I. Prorrhetic. Sect. 6.

cillans admodum, sæpe intermittens prorsus cum sudore frigidulo. — Jam tandem mihi maxime pœnituit neglectæ *bronchotomiæ*, fatis superque percipiens pulmones jam morbo esse obrutos penitus, facta *metastasi* lethali. Dum deliberavi quid ultra faciendum erat, vir bonus, inscius, alvum egressit *, mox distentione nervorum correptus occidit; vix elapsis triginta & sex horis a prima morbi insultura.

Est utique funesti plerumque eventus, dum augetur spirandi Difficultas vanescente subito angina, fauciumque tumore; idque notat ab *Hippocrate* ** *Celsus*, „Si angina subito finitima est, in „pulmonem id malum transit, idque sæpe intra „diem septimum occidit.” — Imo multo ante diem septimum, si ruit morbus ad laryngem & tracheæ lacinias musculosas, primo scilicet, aut secundo, aut tertio die; id ipsum quoque monente divino sene *lib. prognostic.* nec non *Coac. Prænot. 1. Sect. de Angina Edit. Dureti*: quinimo notante *** *Aretæo* etiam eodem die: nec mirum utique, cum & præcludatur spiritus, & sanguinis per pulmones transitus. — Omni igitur ope nitendum est, ut ad extra tumor vergat, admotis acerbis cataplasmatis, imo acerrimo ad collum anterius applicato vesicante; quod quidem, etsi haud usitatum, est tutum fatis & valde efficax auxilium: Nec certe omnino spernandum est **** *Celsi* consilium „incidere fatis altis plagis sub ipsis maxillis, „supra collum, & in palato circa uvam, vel eas

O 2

„venas

* „Οἱσι διὰ σφοδρότητος πυρρῆς, κόπριν ἐξαπὶν διαχωρεῖται θανάσιμον. *Coac. Prænot. 7. Cap. de Angina ex Edit. Dureti.*

** *Lib. 2. Cap. 7.*

*** Vide *Aret.* de Morb. acut. *Lib. 1. Cap. 7.* ubi accurata admodum habetur anginae descriptio & distinctio.

**** *Lib. 4. C. 4.*

„venas, quæ sub lingua sunt, ut per ea vulnera
 „morbus erumpat.” Atque hanc *methodum* a *Cælio Aureliano* laudatam video, utcunque molliter
 plerumque *methodici* tractabant ægros. Venæ
 quidem sub lingua in angina sæpe secantur felici-
 ter, at si vehemens urget morbus, febrisque iti-
 dem, non satis sanguinis fundunt: ideo a brachio
 prius debita quantitas emitti debet, recteque
 monet * *Aretæus* ex largo vulnere, & ad animi
 fere usque deliquium, ut gravis inflammatio
 nempe citius tollatur, ægrum aliter brevi suffo-
 catura. Porro in graviore casu suaderem cucur-
 bitulas scarificatas cervicibus apponendas atque
 summis humeris (occipitio, palis, & pectori et-
 iam vult ** *Cælius Aurel.*) mox his ipsis locis *epispas-
 tica*; Nihil enim negligendum est in tanto discrimi-
 mine, ubi quam brevissimo tempore de vita agi-
 tur, & ubi sæpissime parum valde agendum est
 per remedia ore assumpta: Clysteres adeo laxan-
 tes, irritante quodam sale adjecto, marino puta
 aut *cathartico* communi, injiciendi sunt subinde
 — non quod non purgantia refrigerantia protinus
 exhibenda sunt, si fieri potest, *nitrosa* quoque
 diluentia & *emollientia* affatim, hausto interim va-
 pore tepido relaxante perpetim, fauces etiam col-
 luendo, ac fovendo, liquore: gargarisationes
 vero fortes & frequentes utique minime laudo,
 quod & dolores augent & inflammationem.

Est tamen quædam anginæ species ubi, gar-
 garismata, imo & acriora, valent plurimum, a
 destillatione nempe falsa & pituitosa in fauces &
pharyngem, quæ tument quidem plurimum, at
 subalbidæ sunt & muco plurimo obductæ; at-
 qui febris tantum modica subest, respiratio
 autem

* De curatione anginæ.

** Lib. 3. C. 3.

autem est satis difficilis & deglutitio obstructa plurimum. In tali equidem casu non multa sanguinis missione opus est, sed *epispasticis* & *catharticis*: Suadet etiam *elaterium Aretæus*; habemus tamen mitiora multo, at efficacia satis: sinapi interim ex mulso & aceto coctum & idoneum facit gargarisma & perutilem vaporem, quodque mire elicit colluviem. Attamen fugienda sunt omnino hæcce, ubi magna subest inflammatio. Ficus enim hic & nitri decoctio ex aqua & lacte, melius multo est gargarisma & tutius longe, etiam & haud inutilis potio.

Sed hæc hætenus de angina; cujus quidem variæ cum sint species * variam quoque poscunt medendi methodum. At ea sane, quæ longis accedit morbis, vel lentis febribus, ubi nec tumor est extra, nec in faucibus aliquid conspicuum, sed aridæ sunt quodam modo & pallidæ, sanguinis dispendium & alvi purgationem minime fert, nedum indicat: *Cardiaca* contra idonea atque victum instaurantem postulat, his enim solis si ullis, levatur malum: Est tamen ut plurimum certus exitii nuncius,

Plena Luna 12. FEBRUARIO. *Nova Luna* 26.

Altam plerumque stationem tenuit *Barometer* hoc mense, etsi Libs sæpe furebat, pluvia quoque haud parca cadente; immensa tamen *atmosphæcæ* densitas mercurium sustinuisse videtur; porro *Corus* interfuit sæpe, *Subsolanus* interdum. Vix ullum gelu hoc, aut elapso mense: aer crassissimus semper ac humidissimus.

O 3

Pluvia

* De his vide *Celsum* Lib. 4. C. 4. — Nec non *Aretæum*, de Morb. acut. Lib. 1. C. 7.

Pluvia $\frac{u}{1}$. 3. $\frac{1}{5}$. 6—8. 9. $\frac{u}{10}$. 11. 13. 14.
Dig. Dec.

17. 18. $\frac{uu}{19}$. $\frac{1}{26}$. $\frac{1}{27}$. 28 = 2,876.

Maximus halo circa lunam 5. H. 9. p. m. magna AB. 23. H. 7. p. m. E 1.

♂ Altitud. maxim. 23. 30,3. E 1. } media 29,8 $\frac{7}{8}$.
— — minim. 19. 29,4. SSW 1.

Dies frigid. 6. 59. NWbN 1^x. } media 51 $\frac{18}{28}$.
— tepid. 27. 47. SWbW 3_x.

Ophthalmicæ, pleuritides & peripneumonice passim. Tumores colli fauciumque cum acerbæ sæpe dentium auriumque dolore valde frequentes: Haud raro nascuntur in meatu auriculari *apostemata*, vel in tonsillis, subinde *parotides* diu dolentes, tandemque aliquando suppurantes.

Rheumatismus & arthritis sævit maxime: *Variolæ* plurimæ.

Morbilli pustulosi, & maxime eminentes, admodum sunt *epidemici*; at, nescio unde, magis funestos edunt effectus quam vel mere maculosi; mox enim ab initio vehemens invadit tussis, & perpetua fere sternutamenta cum maxima ad oculos naresque fluxione, protinus ardens accedit febris cum delirio plerumque, & permagna præcordiorum oppressione; quæ fit etiam, morbi statu, multo violentior, adeo ut tunc affectio sæpissime evadat prorsus *peripneumonica*. Hinc stupor accedit, vel sævissimi dolores *colici*, sæpe *dysenteria*; Tussis autem usque ingravescit, unde haud raro expuitur sanguis, rupto in pulmone vasculo, interdum etiam ex naribus plurimus effunditur—Sanguinis missio *colicam* æque levat ac *peripneumoniam*; pernecessaria est utique, sine qua quidem vix aliquid proficit, post autem *ca-*
thartica

thartica lenia morbi reliquias expurgant feliciter, modo parvus sit victus & idoneus. Plures equidem pueros hic morbus opprimit, vehementi pulmonum inflammatione, aut lenta tabe & importuna admodum tussi consumptos. — Qui artuum lassitudinem * ac dolorem graviter diuque plorabant, imminente morbo, sævum admodum perpeffi sunt: quod in *Variolis* quoque sæpius notavi. An humorum acrimoniam indicat hoc *symptoma*, an globulos sanguineos in vascula fero sanguinis duntaxat idoneo impactos?

Plena Luna 14. MARTIO. *Nova Luna* 28.

Et ineunte & exeunte Martio sublimis fuit *Barometer*, ventus ab Oriente, aut Septentrione, per totum fere mensem, unde sudum plerumque: atqui inter 14 & 25, subsidente Mercurio, nix multa, pluvia frequens & grando. atque algida tempestas: rigidum gelu 18. 19. N E 1.

Pluvia 6. $\frac{1}{14}$. 18. 21. 22. $\frac{III}{23}$. 24. Nix 11.

Dig. Dec.

15. $\frac{1}{16}$. $\frac{1}{18}$. 20. Grando 17. $\frac{1}{22} = 1.512$.

Magna AB. 1. H. 10. p. m. N E 1. — magna variata AB. 15. H. 7. N b W. 2^x fuit tamèn majore ex parte coloris ferri igniti: hujus radii lucidi vel a S W & S E jaculati fuere: maxima rursus lucida versicolor AB. 30. H. 10. N b W 1. Centrum coronæ (ut dicitur) certissime ad plagam orientalem lineæ meridionalis divergebat per gradus fere quindecim, totidemque saltem ab ipso *Zenith* ad Austrum declinabat.

O. 4

§ Al-

* ὀσσηνόςπος. Hippocrat.

♂ Altitud. maxim. 30. 30, 4. N b W 1. } media 29. 7.
 — — minim. 22. 29, 1. E S E 2. }
 Dies frigid. 16. 66. N b W 2. } media 55.
 — tepid. 31. 46. N b W 1. }

Morbilli adhuc Epidemici: Variolæ, ophthalmicæ, pleuritides & peripneumonice plurimæ: non hic tantum sæviunt omnes hi morbi, sed & undique tusses convulsivæ, vehementes, suffocantes, morbillos sæpe & variolas insequuntur, quæ magnam sane edunt stragem. — Cum quarto ab eruptione morbillorum die probe desquamatur cuticula, quasi furfure crassiore aspersa, læta spes effulget; at parva certe, ubi pustulæ lividæ, aut luridæ fiunt. Tunc autem epispastica haud parce admovenda sunt, & frictiones calidæ per totum corpus mox adhibendæ; interea serum lactis vinosum, tepidum, forbillandum est affatim, paucis Sp. C. C. guttis, si languet pulsus, instillatis.

Coryzæ, raucedines, faucium collique tumores, apud omnes fere; haud pauci etiam angina corripuntur, quæ tamen est plerumque mucosa, nec multa febre, nec magna spirandi difficultate stipata: Parasynanchen hanc anginae speciem vocabant veteres. Pendens autem a multa colluvie serosa rectius epispasticis, blandis sudoribus, & alvum purgantibus, discutitur, quam larga & repetita sanguinis missione; utcunque sit prudens, in ipso morbi initio, venam secare: Hic etiam detergentia & paulo acriora gargarismata proficiunt, quibus quòque astringentis aliquid immiscetur utiliter. Sæpe equidem nimii sumus in emollientibus, ubi fluxio serosa quasi fauces inundat, quia plus humoris ibidem invitant.

Longe tamen alia debet esse ratio medendi, ubi urget pestifera *cynanche*, hic enim plerumque febris est acutissima, rubet tumetque vultus, usque

eo, ut interdum etiam liveat, torvi sunt oculi & inflammati, pulsant dolentque admodum tempora; mox succedit phrenitis, aut stupor somnolentus, difficillime trahitur spiritus, imo vix respirare valent nisi prorsus erecti, protinusque suffocantur nisi juvat cita, larga, & repetita sanguinis missio.

Plena Luna 12. *APRILIS.* *Nova Luna* 26.

Aquilo perflavit sæpissime hoc mense, interveniente subinde Cauro, interdum Vulturno, unde valde frigida tempestas: Nix, grando, gelu, frequenter per initia, sub finem pluvia, spirante Austro.

Pluvia 1. 2. 7. 11. 15. 21. 22. 24. 25. 26.

27. 28. 29. Nix 3. 4. 8. 9. Grando 8. 9.
Dig. Dec.

10. Acre gelu 5. N E 2 = 1.698.

Magna ignea AB. 20. H. 9. E N E 3. Procella 8.
N N W 4x.

Altitud. maxim. 11. 29, 8. NE 2. } media 29.4 $\frac{25}{30}$.
— — minim. 24. 29, 1. SE 2. }

Dies frigid. 5. 46. NE 2. } media 50.
— tepid. 30. 44. SW b S 2. }

Ophthalmicæ, *pleuripneumonix*, *anginx*, valde frequentes, multoque magis vehementes. *Variolæ* grassantur plurimum, at multo magis *epidemicæ* sunt *morbilli*, magisque etiam funesti. — Tussi gravissima infestantur pueri; febricitant sæpe haud leviter, ægreque admodum exantlatur tenax pituita, unde haud pauci distentione nervorum corripiuntur: Missione sanguinis levantur & usu *Oxymel. scillit. expressione Milleped.* &c. Tempestas est valde funesta tabidis. Longæ & difficiles *aphthæ*, ac faucium ulcera pertinacia haud raro febri-

febricitantibus * accidunt: *Hecticis* & *phthificis* utique sunt certa, imo & cita, mortis præfagia.

Febres tertianæ aliquæ; arthritis & *rheumatismi* sævissimi.

Plena Luna 12. MAIO. *Nova Luna* 26.

Mensis initio ventus ab Austro non parcam demisit pluviam: a 13. Subsolanus sæpe, mox Vulturnus, tunc Aquilo, Corus interdum: 15. fulgur, tonitru, pluvia, vento omni modo, & omni hora, variante: 16. Aquilo velox, nulla pluvia; nocte tamen vis immensa, etiam inter horam noctis undecimam & meridiem 17, pluviae digitus integer decedit, minime interea subfidente Baroscopio. Perstitit aquilo ad 19; inde ventus inconstans micante subinde fulgure: sub finem aquilo rursus, qui, contra quod solet, fuit hoc mense plerumque Austro tepidior.

Pluvia $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{5}{5}$ $\frac{7}{7}$ $\frac{9}{9}$ $\frac{10}{10}$ $\frac{11}{11}$ $\frac{15}{15}$ $\frac{17}{17}$ 18.
Dig. Dec.

19. 24. 30. = 3. 210.

Procella 2 Nocte S S E 4_x Fulgur & tonitru 18.

♀ Altitud. maxim. 25. 30,0. NE 1. } media 29. 5 $\frac{2}{9}$.
— — minim. 10. 29,2. SSW 3. }

Dies frigid. 2. 47. Sb E 3^x. } media 38 $\frac{7}{9}$.
— tepid. 27. 28. ENE 1. }

Ophthalmiæ, *anginæ*, *pleuritides*, *peripneumoniæ*, & veræ & spurix, frequentes: *Variolæ morbilli*, ac febres *miliares* passim. Tussis *convulsiva* plurimos infestat pueros, aliquos protinus suffocat. Plures solito a *pleuripneumonia* male judicata fiunt

* Φάργγξ ἐλακμένη, σὺν Πυρετῶ, δεινόν. Hippocr. Prognostic.

fiunt *empyici* *, rupto interdum in latere abscessu, haud raro intra pulmonem; qui facilius purulenta expuunt servantur, sin aliter brevi totus absumitur pulmo, magna accedente raucitate, & gutturis asperitate. — *Rauedo* frequenter utique pulmonarios vexat, eaque pertinax admodum; quod sane inter confirmatæ *phthiſeos* signa recte numeratur, nec profecto longe mors abest si *apthæ* accedunt, aut gutturis ulcera: pertimescenda est adeo in morbis pulmonum raucitas, maxime si virida sint sputamina aut quasi cœnosa.

Plena Luna 10. JUNIO. Nova Luna 25.

Infauſta, pluvia, frigida tempeſtas toto fere Junio, ventus ab Occidente plerumque, ad Austrum ſubinde vergens, haud raro etiam ad Septentrionem.

Pluvia. 1. 2. $\frac{1}{2}$ 5. 6. $\frac{1}{2}$ 7. $\frac{1}{2}$ 9. $\frac{1}{2}$ 10. 11. $\frac{1}{2}$ 15. 18 —
Dig. Dec.

20. $\frac{1}{2}$ 23. 24. $\frac{1}{2}$ 25. $\frac{1}{2}$ 26. 27. 30. = 4.218.

Fulgur & Tonitru 5. Noctu. Levis Procella
26 Mane SSW 4x.

♀ Altitud. maxim. 16. 29,8. NNW 1. } media 29.4 $\frac{1}{2}$ $\frac{8}{10}$,
— — minim. 10. 29,0. SSW 3. }

Dies frigid. 3. 38. NNE 1. } media 32 $\frac{2}{3}$.
— tepid. 29. 27. WNW 1. }

Variolæ & *Morbilli* adhuc frequentes: Febres *miliares* compositæ (ut dicuntur) haud raræ: multos torquet *rheumatismus*, & laterum dolor; nec paucos opprimit *peripneumonia*, at plerumque *notha*. Tussis sæviſſima paſſim apud pueros, quæ vix
ſedatur

* De ſignis empyematis perlege *Hippocr. Prognostic. & Libri, de Locis in homine, Sect. 28.*

sedatur, nisi post vomitus frequentes, & repetitas *rhabarbari doses*; tunc vero *decoct. cortic. Peruviani* brevi fugatur.

Plena Luna 9. JULIO. *Nova Luna* 24.

Perdurat usque frigida, ac humida tempestas, aër plerumque crassus valde & nebulosus, pluviae quidem plus fatis; unde fructus *ωραίοι* crudi prorsus & insuaves. Ventus ab Occidente praevaluit, ad Austrum sæpe flectens, sæpius tamen ad Septentrionem, interfuit Boreas interdum, aliquando Malacia. — Raræ admodum papiliones, rarissimæ cicadæ.

Pluvia $\overline{1}$. 3 — 5. 9. $\overline{10}$. $\overline{11}$. $\overline{12}$. $\overline{13}$. 14. 15.
 $\overline{18}$. $\overline{25}$. $\overline{27}$. 28. 29. $\overline{30}$. $\overline{31}$. = 3.172.
 Dig. Dec.

Fulgur & Tonitru 12 a. m. Malacia.

♀ Altitud. maxim. 20. 30,1. N b W 1^{\times} . } media 29. $6\frac{1}{2}$.
 — — minim. 11. 29,2. W S W 2^{\times} . }
 Dies frigid. 13. 40. NNE 1. } media 31. $\frac{9}{29}$.
 — calid. 23. 24. Malacia. }

Variolæ epidemicæ, haud tamen valde lethales, *morbilli* aliqui, tussis *convulsiva* atrox adhuc; Diu duravit angina quædam *apthosa*, quæ omnibus pene morbis acutis accedit, præcipue pustulosis; jamque etiam *peripneumonicos* vexat. — Molestum sane, ac sæpe periculosum est *symptoma*, ubi in febribus membrana faucium inflammatur, ac pustulis obsidetur: Paucae utique *variolæ*, in ipso faucium isthmo, multo plus nocent quam mille extra.

Plena Luna 7. AUGUSTO. *Nova Luna* 23.

Prior Augusti pars fuit læta fatis, posterior infelix admodum pluvia fere perpetua cadente, quæ

quæ segetes corrumpit maxime: *atmosphæra* porro, quæ vigesimum usque fuit sicca satis, jam facta est crassissima ac humidissima, Libs interea perflavit; Corus autem prævaluit initio.

Pluvia. $\overset{i}{1}$. $\overset{i}{2}$. $\overset{i}{5}$. $\overset{i}{6}$. $\overset{i}{12}$. $\overset{i}{21}$. $\overset{i}{22}$. $\overset{i}{23}$. $\overset{i}{24}$. $\overset{i}{25}$.

Dig. Dec.

— $\overset{ii}{27}$. $\overset{ii}{28}$. $\overset{ii}{29}$. $\overset{ii}{30}$. $\overset{ii}{31}$ = 2.016.

Fulgur & tonitru 23. Per magnus igneus halo circa lunam 5 H. 10. p. m. W. 1^x. Procella 21 Nocte S S W 4^x — 24 Nocte S W 4^x — 26 Nocte S W 4.

♀ Altitud. maxim. 18. 30,0. N 1.

— — minim. 29. 29,2. S W b W 3. } media 29.6 $\frac{2}{30}$.

Dies frigid. 31. 42. W N W 2^x. } media 31 $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{10}$.

— calid. 15. 20. N N W 1^x.

Variolæ epidemicæ, tussis convulsiva adhuc frequens, præsertim in *Cornubia* citeriore: anginae, & *peripneumonice* nothæ passim, multis pustulis, rubris & aquosis, statu morbi, erumpentibus, iisque plerumque salutiferis. *Rheumatismus* vexat plurimos, qui multo nunc felicius catharsi cedit quam venæ sectioni.

Magnus languor omnes opprimit; imo vel aviculæ contristantur, filet ipsa cicada.

Plena Luna 6. SEPTEMBRI. *Nova Luna* 21.

Pluviosus porro ac frigidus sequitur September; Libs furibundus sæpe ineunte mense, post 16 Vultur nus plerumque, intercurrente nonnunquam Malacia — Nimio squalore obruta tabescunt plurima frumenta.

Pluvia $\overset{iii}{1}$. $\overset{i}{3}$. $\overset{ii}{5}$. $\overset{ii}{6}$. $\overset{i}{7}$. 8—10. $\overset{i}{11}$. $\overset{i}{12}$. $\overset{i}{15}$.

Dig. Dec.

$\overset{ii}{17}$. $\overset{iii}{19}$. $\overset{iii}{20}$. $\overset{iii}{21}$. $\overset{iii}{22}$. $\overset{i}{26}$. $\overset{i}{27}$. $\overset{i}{28}$. $\overset{i}{30}$ = 3.452.

Levis

Levis Procella 3 Noctu S W 4_x — gravis 10 Nocte S W 4^x — 11. a. m. W S W 4.

Fulgura & tonitru 7 Nocte — Fulgura perpetua fine tonitru 10 Vesper — 21 Vesper — perpetua fine tonitru quoque 23 ab Hora 6 p. m. ad mediam noctem & ultra. AB. 12 & 13. Hora 8 a p. m. N. W b N 1.

♂ Altitud. maxim. 14. 29,8. NNE 1. } media 29.5 $\frac{3}{8}$.
 — — minim. 11. 29,0. W S W 4. }
 Dies frigid. 14. 48. } media 38 $\frac{2}{3}$.
 — tepid. 22. 32. SSE 1. }

Variolæ usque vagantur, hic autem benignæ satis sunt, aliis tamen in locis haud raro lethales. Tussis *convulsivæ* etiamnum frequentes: Febres lentæ *nervosæ* atque *miliares* passim, aliquæ etiam putridæ, aliquæ intermittentes.

Icterus & hydrops, jam sæpe quidem unitis viribus, plures opprimunt.

Tussis plurimæ, fauciumque tumores, colli *parotidum*, maxillarum, levi sæpe cum angina, ubique permolesti sunt.

Plena Luna 5. OCTOBRI. *Nova Luna* 21.

Ab ultimo Septembris diem ad usque vicissimum secundum Octobris Boreas perflavit assidue, unde sublimior *Barometri* statio, & ficca tempestas; porro inter 14 & 23 frigida valde: sub finem mensis infremuit pluvius Vulturnus. Gelu rigidum 18.

Pluvia $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{2}$ 13. $\frac{1}{2}$ 24. $\frac{1}{2}$ 25. $\frac{1}{2}$ 26. $\frac{1}{2}$ 27. 28 — 31.
 Dig. Dec.

Grando 28 = 1.516.

Procella 29 — 30. SE b S 4. AB. 19. H. 8. p. m. E N E 1.

♂ Alt.

☿ Altitud. maxim. 8. 30,3. E N E 2_x. } media 29.7 $\frac{29}{31}$.
 — — minim. 31. 29,1. S E 3_x. }
 Dies frigid. 18. 65. E N E 2, } media 52 $\frac{15}{31}$.
 — tepid. 1. 44. N N E 1. }

Ubique fere dominantur *Variolæ*, plerumque tamen sunt benigniores. Febres aliquæ putridæ, intermittentes aliquæ, ceu potius remittentes, quæ faciliter *eccoproticis* lenibus abiguntur, epoto subinde *haustu salino* cum *corticis Peruviani* tantillo — *Ophthalmiæ*, *anginæ*, *coryzæ*, *tusses humidæ*, *creberrimæ*; *Pleuritis*, ac *peripneumonia*, & vera & notha, frequens.

Spuria pleuritis plerumque nihil aliud est quam affectio musculorum externorum pectoris, quæ *rheumatismi* utique species est; at ubi ipsum *costarum periostræum* inflammatur, dolor sæpe vehemens urget, & pertinax admodum, unde respiratio haud raro impeditur maxime * — atqui jam ex facili discutitur, molli existente pulsu, fomentis idoneis, & leni *catharsi*.

Plena Luna 4. NOVEMBRI. *Nova Luna* 19.

Ipso mensis initio gravis decidit pluvia, austro fremente; a 6 ad 10 Aquilo frigidissimus prævaluit, mox Vultur diem ad usque 17 durans; frigidus hic quoque, ac sæpe nimbosus & pluvius, 21 vesperi gravis irruit procella, Libano-to furente vehementer, dum per plurima corrui pluvia; duravit hæc per integrum fere triduum, quo maxima fuit, imo & insolita, *Baroscopii* depressio, æstus autem maris immensi **: ad finem vero Caurus *mercurium* erexit.

Pluvia

* Vid. Libr. de Febribus Voll. II. Cap. de Pleuritide.

** De his Vid. Vol. I. p. 45.

Pluvia ⁱⁱⁱ 1. ⁱⁱⁱ 3. ⁱⁱⁱ 4. ⁱⁱⁱ 5. ⁱⁱⁱ 7. ⁱⁱⁱ 8. ⁱⁱⁱ 11. ⁱⁱⁱ 12. ⁱⁱⁱ 13. ⁱⁱⁱ 14. ⁱⁱⁱ 15.
ⁱⁱ 17. ⁱⁱ 19. ⁱⁱ 20. ⁱⁱ 21. ⁱⁱ 22. ⁱⁱ 23. ⁱⁱ 24. ⁱⁱ 25. ⁱⁱ 26. ⁱⁱ 27. ⁱⁱ 28.
 Dig. Dec.

ⁱⁱ 29. Grando 23 & 29 = 4.574.

Levis Procella 12 Nocte S E b S 4x. Procella 21 Vesperi S S S W 4 — tota Die 22 S W b W 4^x — 23 Mane S W 4. Fulgur & tonitru 21 Nocte — 23 Nocte.

☿ Altitud. maxim. 14. 30, I. SE b E 3. } media 29 $4\frac{12}{8}$.
 — — minim. 23. 28, 2.

Dies frigid. 10. 70. NNE 1. Gelu valde rig. } media 58 $\frac{10}{8}$.
 — tepid. 1. 48. S 3.

Pleuritides & peripneumonice, & veræ & spuria, haud infrequentes, nec febres nervosæ, ac militares; præcipue in Cornubia. Crebra tussis convulsiva inter pueros. Anginæ & tumores faucium, parotidum, ac maxillarum undique, qui sæpe suppurantur & intus & extra.

*Variolæ epidemicæ hic, & ubique, jamque multo peioris sunt notæ, sæpe cum lividis & nigris petechiis, sæpe sessiles sunt prorsus & subnigræ, sæpe vacuæ omnino, sæpius ac i admodum ac crudo ichore turgidulæ: Plures sane jugulant: Qui evadunt, plurimis molestissimis furunculis & ulcusculis frequenter admodum infestantur — Haud raro immensa fit, ipsis primis morbi diebus, salivatio, tenuis quidem ea & acris maxime, unde fauces & totum os mox exulcerantur. Semper mihi suspectus est utique præmaturus hic & crudus fluxus *, tædii quippe plurimum ægrotis ac doloris facit, arcetque protinus somnum; unde nec fauste replentur pustulæ, nec maturantur bene.*

Porro

* Vid. Libr. de Febr. Vol. II. C. de Variolis.

Porro magnam hoc sanguinis indicat acrimoniam; quod quoque valde frequens sterrnutamentum denotat, & enormis narium ac oculorum fluxio: unde hæc recte inter mala signa ponuntur — Nihil huic malo succurrit magis, imo & sæpe occurrit, quam tempestiva, summos inter humores & pone aures *epispasticorum* applicatio, quibus acris evocetur humor.

Plena Luna 4. DECEMBRI. Nova Luna 19.

Tempestas hoc mense fuit plane mirabilis; ad initium Boreas, rigidum gelu, mox pluvius & turbidus Auster, paulo post Libs furens, multaque pluvia, surgente tamen Baroscopio: 14 ac 15 Corus, 16 Boreas geluque recurrunt: 19 & 20 Vulturus velox; Libs iterum nimbosus 21; inde Eurus ad 28, intercurrente tamen Borea perfrigido 25 & 27: Hinc sævissima procella ab Oriente ad finem usque cum rigidissimo gelu & nive perpetua minutissima; brevi omnia penetrabile frigus adurit intus atque foras, vel generosissima vina congelans; quicquid aëri expositum est, dicto citius congeliat — ad ignes luculentos rigentes, etiam in lectulis algidi, adeo ob frigus horrendum torpemus, ut vix fere simus vitales.

Vehementissima tempestas ad finem Decembris perplurimas aves & aviculas abs terra abripuit, illasque ad immensam a littore distantiam abegit; quæ defessæ prorsus perlongo volatu ad naves se contulere medio in oceano, & a nautis erant facillime captæ: Mirum utique genus aucupii! — Ipse vidi, Januarii sequentis initio, forte tunc visitans nobilissimum comitem *Deloraine*, in navi præfidiari (*the Weymouth*) ægrotantem, artocream ex aviculis confectam, quas nautæ in reditu ab

Olyssipone ad portum nostrum captaverant, longe longeque ab ulla terra.

Pluvia $\frac{''}{3}$. $\frac{''}{4}$. $\frac{''}{5}$. $\frac{''}{6}$. 7. $\frac{''}{8}$. $\frac{''}{9}$. 10. 11. $\frac{''}{12}$. $\frac{''}{13}$.
Dig. Dec.
 $\frac{''}{14}$. 15. $\frac{''}{20}$. $\frac{''}{21}$. $\frac{''}{22}$. $\frac{''}{23}$. 24 = 4. 102.

Multa pluvia 21. 22. 23. etfi *Barometer* erat ad 30. 1. Libs porro perfurebat, atqui aër fuit longe crassissimus ac humidissimus immensa scilicet vaporum copia per *atmosphæram* diffusa.

Non potui nivis quantitatem æstimare, quippe quæ fuit a vehementia ventorum e recipiente diffusa.

♀ Altitud. maxim. 16. 30,2. NE. 1. } media 29.8.
— — minim. 4. 29,1. SS W 3^x. }
Dies frigidissima per Hominum Memoriam }
31. 90. E NE 4^x. } media 61 $\frac{26}{28}$.
— tepida — — — 10 52. SW b W 3^x. }

Febres *miliares* & *nervosæ* aliquæ, variolæ passim, anginae & ophthalmiæ crebræ: Tusses, *rheumatismi*, *pleuritides* ac *peripneumonice* sunt frequentes.

Tota pluviae quantitas Anno MDCCXXXIX
Dig. Dec.
= 36. 308.

Plena Luna 2. JANUARIO. *Nova Luna* 17.

Perfistit adhuc frigus enorme, quale quidem in hac regione haud perceptum fuit antehac unquam: Primo licet mensis die maxima fuit nivis solutio, decidente pluvia, mox tamen recurrit Boreas, ac gelu acerrimum, ad finem usque mensis perdurans — Quamvis enim omnia solis ardore liquantur interdiu, constringuntur noctu rigidissimo gelu. *Atmosphæra* fuit plerumque crassa

crassa valde & veluti offuscata fumo, inter 10 vero & 17 tenuissima. Dies frigidissimi erant 11. 15. 16. 17. 18. 26. 27. 28; adeo sævum regnabat frigus, ut vina omnigena, foras exposita, mox congelarentur; imo ac vel ipsum ad littora mare, quod utique hic accidit rarissime. Plantæ & arbores innumeræ pereunt, vel & ipsæ duræ genistæ, vix vides viridem herbam. Innumerabiles huc advolant aves aquaticæ, perplurimæ etiam ab exteris regionibus, vix unquam hic visæ.

Dig. Dec.

Pluvia ¹¹ 1. 2. 9. Nix & grando 8. 9 = 0.416.

Nullum vidi lumen boreale toto hoc mense, etsi ventus fere perpetuus e Septentrione spiravit.

☿	Altitud. maxim.	14. 30.4.	E N E 2	} media 30.1 $\frac{1}{3}$ $\frac{4}{1}$.
—	— minim.	1. 29. 1.	S W 2.	
	Dies frigidissimus	26. 84.	N N E 1.	} media 75 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{1}$.
—	tepidus	31. 69.	S E b E 3 ^x .	

Variolæ adhuc *epidemicæ* sæpe parvæ sunt admodum, sessiles & subnigræ, sæpe lethales; ægroti, his correpti, parum tument, perpaululum expuunt, unde non raro 8 aut 9 die suffocantur. Perpetuum est fere, quod per siccas ac frigidas aëris constitutiones, diu durantes, *variolosi* parcissime expuunt*; unde tali prævalente tempestate suaderem gargarisationem emollientem ac frequentem, potus tepidos, relaxantes, continuos, vaporem aquæ tepidæ, aut lactis dulcis, ore haustum, ut per hæc, laxatis fibris, attenuato sanguine, referatis salivæ ductibus atque absterfis, eliciatur *salivatio* libera, quæ in hoc morbo maximi semper est momenti.

Tumores faucium, *parotidum*, tonsillarum, &c. apud omnes fere, qui & tussi quoque vexan-

P 2

tur

* Vide Libr. de febr. Vol. II. Cap. de Variolis.

tur & acri destillatione. Anginæ, odontalgia, pleuritides, peripneumonice, sunt undique frequentes. Perniones innumeris molesti sunt, sæpe etiam in adultis ulcerant.

Febres lentæ, nervosæ aliquæ, aliquæ miliares: Asthma gravè admodum sævit plurimum, haud paucos senes jugulat.

Plurimi in vicinia, & hic quoque, tumore faucium, colli atque capitis corripuntur, mox inguinis & testiculorum dolore acuto, ac tumore: hunc morbum tamen sanguinis missio, & lenis alvi purgatio, ex facili discutit — sanguis subflavo glutine, haud autem valde tenaci, obducitur.

Plena Luna 1. FEBRUARIO. *Nova Luna* 16.

Siccus quoque & frigidus valde fuit hic mensis. Utcunque enim per initia Vulturus brumam asperrimam temperavit aliquantulum, rediit tamen mox Aquilo cum durissimo gelu: Ad finem vero ventus australis spirabat, qui pluviam fecit *atmosphæram* ac multo tepidiorem. *Barometer* altam tenuit stationem toto mense: Aër fuit interdum pertenuis, plerumque tamen crassus valde & fumosus, intercurrente subinde malacia: Maxima sæpe sæpius pruina; medio nempe die a solis fervore relaxata terra plurimos exhalavit vapores, quos frigus nocturnum mox condensavit, imo & gelavit forma pruinae. — Mare ad littora sæpius congelatum fuit hoc mense.

Pluvia 16. 19. 26. 27. 28. 29. Nix ali-
Dig. Dec.

qua 12 = 0.482.

AB. 11. H. 8. p. m. N. 1°. Enorme frigus
14; Thermom. 84.

§ Altitud.

☿ Altitud. maxim. 23. 30,5. ENE 1. } media 30.1 $\frac{2}{9}$.
 — — minim. 28. 29.8. SW 2. }
 Dies frigid. 14. 84. ENE 2^x. } media 68 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{9}$.
 — tepid. 29. 56. SSE 2. }

Pleuritis, peripneumonia, angina, rheumatismus,
 maxime frequens undique; missus ex his laboran-
 tibus sanguis crassus est valde & glutinosus, parum
 habet feri sublutei. Per plurimi *tussi, catarrho,*
asthmate sævo premuntur: Multi *xerophthalmia* la-
 borant. Innumeri, etiamque seniores, pernioni-
 bus dolentibus, aliquando exulceratis, crucian-
 tur. Febris quædam *catarrhalis* cum acuto capi-
 tis dolore & vertigine, accedente etiam aliquan-
 do *phrenitide*, multos detinet — *Phthisici* & *asth-*
matici jam pessime se habent — *Variolæ* adhuc
 passim.

Scabies foeda jam regnat undique inter po-
pellum.

Plena Luna 2. MARTIO. *Nova Luna* 16.

Perstat usque alta *mercurii* statio, aër crassus
 valde & frigidus plerumque, malacia frequens,
 præsertim mensis initio. Primo die, flante Vul-
 turno, multa decidit pluvia, post autem ventus
 inter N W & N E constitit: Gelu sæpe hoc men-
 se & maxima pruina.

Pluvia $\frac{'''}{1}$. $\frac{'}{3}$. $\frac{'}{5}$. 7. 11. $\frac{'}{14}$. 18. 23. 26. 27.
 Dig. Dec.

Grando 12 = 1.278.

Circius vehemens 8 mane. Magna AB. 12.
 H. 9. N N E 2. levis AB. Vesperi 13 N N W 1
 — 14 H. 9. N W 2: Per frequenter sane notavi
 AB. per duas, tresve noctes consequentes vento
 a plagis septentrionalibus spirante.

☿ Altitud. maxim. 30. 30,3. N 1_x.
 — — minim. 1. 29,7. SEbE 1_x. } media 30.0 $\frac{4}{31}$.
 Dies frigid. 13. 67. NNE 1. }
 — tepid. 18. 51. NWbN 1. } media 55 $\frac{18}{31}$.

Anginæ frequentes & faucium tumores; *rheumatismi* multi, & gravis sæpe arthritidis: *Variolæ* adhuc. *Asthma* sævissimum, diuque admodum durans, permultos premit; plures *phthifici* moriuntur. *Pleuritides* & *peripneumonice* plurimæ; per raro autem sanguinolenta expuuntur, ne libere quidem & copiose aliquid, unde haud parum in morbo discriminis.

Sanguis, ex omnibus *pleuriticis* & *rheumaticis* missus, est densus valde & tenax, & non sero factis imbutus.

Nescio unde, sed per plures menses, juniores atque etiam haud pauci adulti, lumbricis terebibus infestantur, qui per morbos sæpissime deiciuntur — An a corrupto frumento*, nec non immaturis & crudis fructibus, progenies hæc verminosa?

Plena Luna 1. APRILI. *Nova Luna* 15.

Siccus fuit hic mensis & frigidus maxime, stetit plerumque ventus Orientem inter & Septentrionem, Malacia interdum interveniente; Pruina sæpissime, & nonnunquam gelu, ad 15 nix sæpe, & grando post; permanfit nix super montes ad 26 usque,

Pluvia 8. $\frac{1}{12}$. $\frac{n}{13}$. 14. 25. 26. 29. Nix 20.
Dig. Dec.

21. 22. Grando 26. 27 = 0.802.

Levis procella 23. p. m. N N W 4_x.

Dies

* Vid. Mens. August. Anni 1739.

Dies frigid. 14. 62. ENE 2^x. } media 51.2³/₇.
 — tepid. 19. 45. NNW 2. }
 ☿ Altitud. maxim. 17. 30,2. Malacia } media 29.8²/₇.
 — — minim. 12. 29,3. E 2. }

Perdurante adhuc eadem aëris constitutione, iidem prorsus sæviunt morbi, jamque multo sunt severiores; pereunt permulti ruri & in oppido.

Morbis acutis jam sæpe accedunt *petechiæ*, etiam ipsis *peripneumoniciis*, hoc tamen accidit præcipue inter nautas; Horum vero sanguis parum glutinosus est, sed magis putridus, ac lividus quasi, ejusque serum aut viride est, aut turbidum maxime ac veluti luto foedatum; purulenta quoque protinus expuunt & persæpe foetida: a *scorbuto* * forsan hæc, qui longe longeque, his in oris saltem, dominatur.

Variolæ passim, & *pleuritis* quædam acerbissima, quæ haud paucos jugulat more *paraphrenitico*, quarto vix elapso die; horum sanguis extractus merum fere gluten refert.

Plena Luna 30 ult.

Nova 14.

MAIO.

Plena Luna 30.

Permanet usque ficca atque frigida tempestas, ventus fere perpetuus ab Oriente, flectens plerumque ad Septentrionem, ad Austrum etiam aliquando, sæpe velox, mox tamen omnino silens, maxime sub noctem, insolitum & plane stupendum fuit frigus pro anni tempore die 5, 6, & 7 mensis; imo haud parum nivis decidit quinto. — *Atmosphæra* fuit perquam crassa, etsi tam pluvix parum decidit.

Pluvia 4. 5. 12. 14 — 17. 20. 23. 26. Nix

Dig. Déc.

5. Grando 4. 5. 6 = 0.538.

P 4

Procella

* Vid. Libr. de Febr. Cap. de Peripneumon.

Procella 25. a. m. E 4. AB. 27. Vesperi
N W b W 1.

♂ Altitud. maxim. 9. 30, 1. N E 1. } media 29, 7 $\frac{11}{30}$.
— — minim. 4. 29, 3. N N E 2^x. }
Dies frigid. 6. 62. N b W 2. } media 42 $\frac{22}{30}$.
— tepid. 30. 32. Malacia. }

Perfurunt usque febres pulmonariæ, magisque multo jam sunt malignæ maculis nigris, lividis, fuscis sæpe stipatæ; dolent vehementius caput dorsumque, præcordia premuntur maxime; nunc quoque semper fere accedit phrenitis effera, ac persæpe angina quædam ulcerosa vel ab ipso initio, totas fauces sensim perreptans: Vel cruda prorsus, vel saniosa expuunt: Cruda, lurida, turbida urina, pessime significans, nihil unquam deponit. Fauste interdum, sub morbi finem, pustulæ erumpunt & furunculi — sæpe vero jugulat ægros hic morbus, dira anxietate jactatos, perpaucos intra dies, more quasi *paraphrenitidis*; imo etiam haud raro *hepatitide* correptos: nam & situs doloris & color ictericus & intensa urinæ flavedo hoc indicare visa sunt.

Jamque etiam grassatur febris putrida *petechialis*, quæ plurimos nautas orco demittit atque inter popellum multos. Hæ febres sæpe complicatæ videntur & unitis viribus sæviunt, pulmonaria nempe atque *petechialis*.

Variolæ nunc magis frequentes sunt, ut plurimum tamen mites, licet parce admodum expuitur: At discreti sunt plerumque generis, quod mirum utique videtur, quandoquidem alii morbi acuti monstri jam quid maligni alunt.

Tussis vehemens inter equos cum angina suffocante & febre plures obruit; imo & bubulum pecus tali etiam effectu sæpe abripitur. — Grex lanigera

Ianigera summa macie & arida tussi maxime laborat; pereunt oves innumeræ, quarum omnium jecur tumet multum & indurefcit, vesicula fellis autem, subatra bile turgida, ad enormem crescit magnitudinem.

Nova Luna 13 JUNIO. *Plena Luna* 28.

Major forte nunquam observata fuit siccitas, fontes arefcunt prorsus, & flumina deficcantur; *Pabula canescunt, cum frondibus uritur Arbor*; Ov. Quamvis *Hygrosopia* omnigena ficcissimam aëris temperiem denotant, tota *atmosphæra* tamen crassa valde & fumosa quasi apparet — unde, utique nescio, ni deficit forsan sufficiens in *atmosphæra* humor ad regularem luminis transmissionem — Sic corpora quædam videmus, quæ, humectata, pellucida sunt, arida vero opaca prorsus. — Subsolanus a 1 ad 5; a 19 iterum ad 25; cæterum Corus plerumque, haud raro etiam Libs.

Pluvia $\frac{''}{5}$. $\frac{'}{7}$. 8. 10. 11. 13. 24. Grando
Dig. Dec.

multa 7. p. m. = 0.742.

§ Altitud. maxim. 18 30,2. Malacia } media 29.7 $\frac{24}{8}$.
— — minim. 7. 29,3. SW b W 3.

Dies frigid. 12. 42. SW b W 2. } media 33 $\frac{3}{8}$.
— calid. 25. 25. SE b E 1.

Durat adhuc febris *pneumonica*, quam sæpissime comitantur *petechiæ* — Sanguis in hoc morbo detractus lividus valde imo & ater conspicitur, ac plerumque nimium solutus *, haud raro sane prorsus saniosus.

P 5

Variolæ

* In febre *peticulari* epidemica, quam accuratissime descripsit *Ramazzini*, sanguinem semper roseum, purpureum, solutum, invenit, minime vero glutinosum. vid. *Ramaz. zini* Constitution. Epidem. Ann. 1692, &c. Sect. 27. 47.

Variolæ frequentiores, sed ut plurimum benignæ indolis.—Febricula quædam cum pustulis rubellis & valde urentibus, quæ per ipsa morbi initia erumpunt, perfrequens; levis tamen videtur & evanescit cito magna cuticulæ asperitate relicta.

Febris nautica pestilentialis jam sævit maxime; en hujus historiam.

Ineunte vere ad hunc portum appulsæ sunt naves duæ bellicæ (*Panther* & *Canterbury*, quarum posterior mox a mari *mediterraneo*) ex his ægroti plusquam ducenti ad terram protinus delati sunt, horumque pars major febre maligna, imo pestilente laboravit; hinc in vulgum quoque sparsa maximam edidit stragem.—Nec vana forsan fuit suspicio, has quidem naves pestilentia quadam per Africas oras tunc longe lateque grassante, attactas fuisse, quoniam has inter & illas frequens fuerat commercium.

Levis rigor primo corripuit ægros, mox subitus ardor incerto prorsus ordine; pulsus interea fuit admodum inconstans, nunc incitatus valde nunc mire depressus; accessit proinde gravedo capitis, aut dolor acutus, sæpe occipitis, sæpe sincipitis, sæpius autem in temporibus, aut paulo supra oculos, qui quidem longe vehementior—perdolebant etiam ipsi oculorum globi luminaque refugiebant; Sompor interim perpetuus urgebat, at parcus admodum aderat revera somnus, tinnitu aurium semper molestante aut vertigine gravi. Fœdus valde & amarus in ore sapor vomitiones excitabat frequentes & biliosas admodum, multa tamen permixta pituita. Lingua fere subflava erat, aut fusca & sordida, raro autem valde arida, medio autem scabra. Jam extemplo plurimum debilitati discumbunt, anxii tamen & quasi perterrefacti, errantibus per omnia membra huc illuc doloribus.

bus. Urinæ tenues, crudæ, aquosæ aut luridæ, sæpe tamen rutilæ ceu tantillum inesset sanguinis intime permixtum, aut fortissimum aliquod lixivium referentes; parcæ hæ & tenues semper, & nihil prorsus deponebant:—Mali admodum omnis nunquam non omnes has notavi urinas.

Hæc quidem inter morbi initia, exactis autem tribus, quatuorve diebus in pejus multo ruebant omnia; jam enim vehementius ardet febris, mox phrenitis accedit, aut *coma* vigil, cum torvo aspectu & fulvo oculorum rubore; Jactatio perpetua, anxietas summa, vix vel ipsis astantibus tolerabilis; sæpe furor immanis, levis sæpe desipientia aliena subinde murmurans.

Petechiæ violacæ, lividæ, fuscæ, imo & ipsæ nigræ, sextum inter diem & undecimum sæpiissime prodibant, nunc citius, nunc tardius; quo magis floridæ, eo melius; fuscæ tamen quasi cutis lenticulæ, parvæ, innumeræ, male semper significabant, at pessime omnium vibices, & ungues atqui summi digiti lividi * aut plumbei — Funestum utique semper est hoc ultimum in morbis acutis, indicat enim stagnantem in extremis arteriis sanguinem — bonum vero omnino, ubi vividus adest unguibus color: — Medici est igitur, hos etiam diligenter inspicere.

Adfuit vel ab initio permagna præcordiorum oppressio, quæ aucta quotidie cum stringente quodam (hoc enim semper plorabant) cordis angore, & respiratione tremula & singultiente quasi (imo sæpe diro cum singultu ac languore summo, haud raro ad deliquium usque) maximum portendebat discrimen; cum & jam quoque tremores, subsultus tendinum, capitis vacillatio, incerti rigores

* Vid. Lib. de Febris Cap. de Febre putrid. malign.

rigores, frigidique sudores ingruerent — Pedes erant sæpe frigidissimi, dum facies, genæ præfertim, magno flagrabat ardore, profusus interea & valde foetidus sudor manabat talos ad usque; pulsus interim exilissimus erat, at quam citissimus: jam jamque instabat mors.

Frequenter autem *diarrhæa* foedissima miseros colliquabat, arida prorsus facta ac dura cute, corii ad instar, dum lingua, quasi fuerat indurata fumo, rigeat, impos fere motus, nedum loquelæ. Haud raro etiam in summo morbi statu *apthæ* subnigræ, ulcerosæ, totas fauces cruciabant gulamque, quas paulo post perpetuus insequeretur singultus; Saniosa inde, aut *gangrænosa dysenteria* ægrotos brevi conficiens — Levis attamen obrepens alvi fluxus circa undecimam, ceu arte, ceu sponte eveniens, salutis fuit plurimis, modo nec lividus nec liquidus nimium.

Jam nunc quoque (morbi nempe statu) interdum maximum attulit levamen larga pustularum eruptio, more veluti variolarum, quæ tamen nil nisi tenuem & acrem *Ichorem* continebant * — erumpebant etiam aliquando multo minores, at urentes admodum, quæ vero in squamas mox abirent: salutiferæ quoque & hæ. In quibusdam peralbas quasdam & latas maculas notavi, paulo eminentes, quasi ex urticæ morfu; hæ vero difficilis indicii.

Erant vero ægrotantes plurimi, ubi nihil horum plane, sed aut *parotides*, aut tubercula, aut in auribus *apostemata*, eos sublevabant: omnibus erat fere magna surditas, diu durans.

Multis fuit narium *hæmorrhagia* salutaris, at pessimum ubi paucæ, acres, subcruentæ guttulæ destil-

* Φλύκταινας veterum medicorum.

destillabant; nec utique juvabat semper copiosa; nam haud raro longe nimium profundebant nares, imo ad *syncopen* usque, præsertim sub Julii finem, cum esset sæpe prodiga valde: tunc etiam *dysenteria* cruenta sæpius accederet. — Vix ullam memini febrem, in qua *scotomiæ* & falsi oculorum splendores erant tam frequentes.

Nihil utique novi æque certum victricis naturæ signum ac liberum valde & copiosum sputum, benigno prodeunte sudore, aut fluente affatim fulva & crassa urina: perraro autem sedimenti aliquid deposuit lotium per totum morbi decursum; imo, cum interdum crassum fuisset admodum per horas aliquot, mox tenue prorsus reddebatur. Signum hoc semper est male judicatae febris: atque adeo hæc vel ex levissima causa fuit recidiva — Si quis carnem comederet vel piscem, nisi probe purgatus & confirmatus bene, certo certius hoc passus est magno hercle cum vitæ periculo; nec minus sane subiret discrimen sæpe ab acriore *cathartico*.

Mihi equidem haud levis noxa popello accidisse visa est a nimia comestura piscium, qui abundantissime hac tempestate undique scatebant, præcipue scombri; quippe qui lentos generant ac rancidos humores. Sudor vel sanissimi hominis, qui multo utitur pisce, longe magis foetidus est quam si carne solum et pane vesceretur — quini-
mo jam diu notum est, quod nimius piscatus *scorbutum* infert & morbos cutaneos.

Hæc adeo de febris natura, jam quoque de curatione pauca.

In morbis equidem curandis regulæ quædam generales servandæ sunt, cum eo tamen, ut propria quoque cujusque ægrotantis natura perspicienda

enda sit: ideo ex *Hippocrate Celsus* * dixit „Me-
„deri oportere & communia & propria intuen-
„tem:„ Nec in ulla re magis hoc necessarium est,
quam in sanguine mittendo, ubi & vires & ætas
& habitus diligenter sunt consideranda.

Ipso harum febrium inito rectissime mittitur
sanguis, plus, minusve, pro Ratione *symptoma-*
tum nempe **: Si pulsus sit validus, si febris ve-
hemens, si dolor acutus, repeti id debet, maxi-
me si pellicula tenax cruorem obtegit, minime
tamen si haud satis firma sit sanguinis *crasis* & te-
nuis nimium, præcipue si serum ejus sit luridum
valde, aut rubellum — Haud tamen fida satis a
colore & superficie cruoris desumitur indicatio,
nisi pleno flumine & impetu profiliat: cum per
Brachium destillat, aut exit quasi guttatim, falsa
semper & florida specie decipit.

Seçta imprimis vena, mox vomitum leni *eme-*
tico movere oportet, maxime si nausea urget, aut
vomitio; hoc enim modo exantlatur optime bili-
osa colluvies, fomes, si restaret, futurus morbi
— Hoc etiam ipsa natura indicat, sua sæpissime
sponte vomitiones concitans — Nec solum ipitio,
sed in quolibet morbi statu eluendus est ventricu-
lus, si urget vomendi conamen, aut ructatio bi-
liosa, oblida & ingrata valde *** — Vitellus ovi
putridus, vel ad perpauca grana datus, horren-
dam mox excitat choleram; stagnans & putrida
bilis haud multo minus virulenta est, quam pri-
mum igitur est ejicienda.

equi-

* *Cels. Præfat. p. 17. ex Edit. Almelooveen.*

** Perlege quæ de sanguinis missione dixi in febribus pu-
tridis malignis, *Libr. de Febr. Cap. de febre putrid.*
malign. petech.

*** Ubi ructus amari cum gravitate præcordiorum sunt, ad
vomitum protinus confugiendum est. *Cels. Lib. 1. C. 3.*

Sequitur plerumque post *emeticum* alvi dejectio, si vero non respondet, clystere leniore ducenda est: siue sic parum reddit, siue fuerat ante febris accessionem astrictior debito, *pharmacis* idoneis liquanda est, manna nimirum, *cremore tartari*, *rhabbarbaro*, sale *Glauberi*, &c. quæ scilicet in primis viis præcipue agunt, minimas saltem movent in sanguine turbas. — *Drastica* utique *cathartica* deprecor prorsus, utpote nocentissima: mitiora vero hæcce exterminant commode humores, qui in visceribus diutius morando majorem indies acquirunt acrimoniam, imo & in sanguinem per vasa *mesaraica*, venasque lacteas remigrant perpetuo. — Et post vomitum & post *catharsin theriacæ andromachi* aut *elixiris asthmatici* paululum administrandum est.

Hiscæ peractis paulisper jam cunctandum est, ut qua natura vergat scrutemur, nec officiosa medicamentorum farragine illam agamus deviam*; interea tamen diluentia quædam subacida propinanda sunt affatim, ut nova puraque materia corrupto sanguini admisceatur, ut acres ejus solvantur sales, atque peccans corrigatur acrimonia; hoc enim modo *crisis* promovetur optime, præsertim si lenia aliqua attenuantia ac solventia adjuncta sunt. Nec facile video, quæ alia medicina hoc tempore febris tentanda sit, ni forsan vis vitæ langueat, & torpeat sanguinis motus; tunc enim stimulis agitandum est idoneis, *epispastica* admovendo nempe; generosa porro exhibenda sunt *alexipharmaca*. — Sed ne nimius sis, obsecro medice!

* — Ἀκριαξέσων τῶν νούσων Ἡσυχίην ἔχειν βέλγιον. *Hippocrat.* Aph. 29. Sect. 2. Maximi profecto est hoc monitum in acutis, quis prudens medicus naturam durante paroxysmo vel febris intermittens interturbat?

medice! in salibus *volatilibus alcalinis* ngerendis, ruunt enim jam omnia ad summam putredinem, nisi humorum acrimoniam temperare potes, & sanguinis dissolutionem prohibere. — Ideo ubi calidiora medicamina exiguntur, admiscere f. oleo plerumque acida quædam, uti acetum, *limonii* succum vel *elixir vitrioli*, quod aromatibus imbutum haud contemnendum est *alexipharmacum*, cuiusque guttæ aliquot sæpius exhibendæ sunt, ex vino aromatite, aut *julepo* quodam *cardiaco* cum bolo ex *Confect. Cardiac.* Croco, *Rad. Contrayeru.* &c. — Sed nihil necesse est tradere formulas, cum qui, quid indicatur in re præsentē, calleat facilimo negotio potest adaptare remedia*: cave tamen ne calcaribus utaris cum opus est fræno; nec vehemens nimium esto in sudoribus exprimendis præcalidam medicinam urgendo, nam si probe diluitur sanguis, & servatur bene mistus, suo semper tempore, suaque sponte, ipsa natura sudorem profert** — Haud ibo inficias equidem, quod absque sudore quamrarissime solvitur febris, profusus tamen mihi semper suspectus est.

Hanc adeo in morbis hujusmodi curandis *methodum* plerumque sequor — Per initia febris, debitas post exinanitiones, *haustus salinos* præcipio, ex sale nempe *alcalino* fixo aut *volatili* (prout res postulat, quorum hic sudores, ille urinam magis movet) succo *limonum*, *aurantiorum* Hispalienfium, aut aceto vini acerrimo, bene saturato, cui admisceo aquam *alexeter.* simplicem Sp. Lavend. C. aut his simila. Hoc modo conficitur medicamen-

tum,

* Εἰ τις εἰδείη τὴν αἰτίην τοῦ νοσήματος, οἷός ἐστι προσφέρειν τὰ συμφέροντα. Hippocrat. de Flatib. initio.

** Πάντη δὲ ἀνοιγόμενον τε καὶ ἀναπνέον, καὶ κινέμενον τὸ σῶμα, συμφέρον ποιήσει. Hippocrat. de locis in Homin. Sect. 39.

tum, blandi ad instar saponis, crassos resolvens humores ac cum aquosa sanguinis parte olea salesque intime commiscens — Diluentia interim subacida assatim ministranda sunt, quæ, mediante hoc remedio salino, toti humorum massæ promptissime admiscuntur: Sic bene mistus & fluidus servatur sanguis, ejusque temperatur acrimonia; dum acres soluti sales per cutim, per alvum, per urinam effluunt perpetim, nec vero interea interturbatur natura, dum concoctionem molitur. Atqui si tardat nimis languetque, generosa magis medicina vacillantem refoveo; id maxime, si aut sudor sit frigidulus, aut urina pallida, aut eruptiones (pustulæ sint sive *petechiæ*) coloris minus vividi.

Per hæc efficitur plerumque, ut blandi tandem sudores erumpant, qui febrem tenuant quotidie; si tamen inæquales sunt, & parum constantes, aut subfrigidi, aut profusi admodum, hæud ita feliciter, mox enim rigor accedit sæpe, ac febris *exacerbatio*, pauloque post phrenitis; qua quidem ingruente alvus protinus *enemate* ducenda est, si fuerat astricta (vellem utique semper teneram potius quam constipatam per totum morbi decursum) si furor urget, ad cucurbitulas scarificatas, humeris cervicibusque affixas, confugiendum est; quo peracto *epispastica* admovenda sunt pone aures, occipiti, ipsis quandoque locis scarificatis; Tibiis proinde aut femoribus — Hæc vero maxime ex usu sunt, ubi vis naturæ torpet, languetque pulsus arteriarum — Jam autem bolis *cardiacis* adjicio *camphoram* ac succini salem, interposita quoque interdum uncia una, vel altera, *diacodi*, imo si vigilæ urgent, uno alterove, extracti Thebaici grano.

In hac fere medicina perfisto morbi usque statum, quo aut in melius, aut pejus multo ocyus mutantur omnia; nec dies jam sed & vel ipsæ horæ æstimandæ sunt: Si modo nec propitius adjuvat sudor, neque *diarrhæa* blanda, nec libera accedit expuitio, in malis æger est — Tentandum est tunc utique, quid possit lenis alvi purgatio, exhibendo nimirum *rhabarbarum*, *Mannam*, *Cremorem Tartari*, *Salem Glauberi*, &c. subveniendum est interea virium ruinæ *cardiacis* idoneis: vix meliora novi utique quam vinum rubrum generosum aromaticis incoctis, cinnamo scilicet, maci, nuce *moschata*, Cort. *Aurant.* *Hispaliens.* &c. cum aquæ dimidio, aut subaustrera quædam *alexipharmaca* cum *elix. vitrioli*, vel *limonium* succo; hæc quippe & vim fibrarum & sanguinis *crasin* confirmant, humorum autem putrefactioni obfistunt maxime. Quod quidem diligenter cavendum est, ubi aliter sanguis in saniem, lymphæ vero in *ichorem* degenerant, brevique obrepit omnium dissolutio putrida, ac si sanguini immistum fuisset viperæ * venenum.

Purgationem per inferiora poscunt hypochondria tumida, intestinorum murmura, abdomen tensum, alvus adstricta, caput grave, somnolentia nimia, vertigo, ingruens delirium, halitus foetidus valde, & præcordiorum oppressio cum ructu frequente. — Prohibent autem sudores faciles, constantes & æquales, pustulæ, aut *exanthemata* jam erumpentia, expuitio copiosa adveniens; nam vel in *peripneumonicis* *diarrhæa* sæpe sputa supprimit prorsus; quod quoque in *variolis* haud raro accidit infeliciter — minusque commode semper fert *catharsin* magnus virium languor.

Sub

* Vide Libr. de Febr. Capit. V.

Sub conditionibus autem supra expositis nullo non tempore morbi alvum moveo *, maxime declinante febre, ubi nulla alia via molitur natura *crism.* —

Tentatur sæpiissime, fausto admodum successu, hæc purgandi methodus in *variolis* confluentibus, nono, vel undecimo ab eruptione die, cum parum aliquid ultra per salivæ ductus, aut per cutis meatus exterminari possit: Quidni & in hac quoque febre? — Procul dubio ubi putrida colluvies atque corrupta bilis in ventriculo & intestinis abundant, quantocyus hercle expurganda sunt, ni vis usque fovere morbum, aucta in horas putredine *. — In hac febre profecto, de qua nunc agitur, & per vomitum & per alvum immensam vim biliosæ saburræ sæpius rejectam vidi, magno utique cum ægrotantium levamine; suavi mox accedente somno, ubi per plures dies noctesque summa antecesserat anxietas, ac vigilia perpetua — Dum ventriculus sane acribus gravatur sordibus, & putrida bile, laborat semper maxime caput, perturbantur spiritus, & prosternuntur admodum vires. — Nec inprimis tantum viis felices edit effectus vomitus, sed & per omnem undique vasculorum compaginem, ubi lentescentes attenuat humores, putridosque expellit **.

Nova Luna 12. JULIO. *Plena Luna* 27.

Hic quoque mensis fuit subfrigidus, aër autem maxime ficcus & quasi fumosus; Libs sæpe afflavit, Corus sæpius, Eurus interdum: Fons omnis & rivus exarescunt fere, *vix* viridis inventa est herba.

Q 2

Plu-

* Ibid. Cap. VIII.

** Vide Dr. Cheyne's *new Theory of Fevers*, p. 83 — 94.
Edit. 3. Ann. 1722.

Pluvia 4. 7. 9. 10. 12. 16. 19. 20. 26.
Dig. Dec.

30 = 0.608.

Tonitru 30. Pluvia gravissima ad Septentrio-
nem 28.

♂ Altitud. maxim. 15. 29,9. NN W 1. } media 29,6 $\frac{16}{31}$.
— — minim. 26. 29,3. SS W 3. }

Dies frigid. 22. 39. NN W 1. } media 31 $\frac{3}{31}$.
— calid. 3. 26. S W b W 2_x. }

*Variolæ jam epidemicæ, mites tamen plerum-
que; Rubeoli passim & morbi pulmonis; sub finem
mensis dysenteria frequens.*

Jam maxime furit febris pestilentialis pluri-
mosque demittit ad umbras; Funera certe nunc
sexies saltem excedunt solitum numerum: nec
solum hic, sed & per viciniam jam grassatur mor-
bus. — Anxietas horrida, jactatio perpetua, atrox
capitis dolor, cruciant ægrotos, atque mox ferox
accedit insania, pauloque sæpe post veternus, aut
nervorum distentio: alvus, urina, lachrymæ,
nil sentientibus effluunt, sæpe vox taucibus hæret
prorsus, sæpe lingua nigra aridissima, verba in-
condita, aut aliena balbutit. — Plurimis sub morbi
finem adest exulceratio faucium acerbissima, etsi
initio levis tantum erat aspretudo; difficillima
hinc deglutitio, nec sine summo tormento.
Parotides, bubones, furunculi admodum dolentes,
haud raro nonum inter morbi diem & decimum
quantum erumpunt; Salutaria hæc plerumque,
maxime si probe suppurant, pessima utique si
mox recedunt: interdum vero per plurimos dies
indurata permanent sine vel minima suppurati-
one, præcipue in cervicibus, ubi per menses et-
iam aliquando perdurant.

Circa

Circa hoc tempus quoque sæpe *diarrhœa* salutifera oritur, id potissimum si biliosa, aut subnigra, atqui non nimis liquida, dejiciuntur: Alvus autem saniosa, cruenta, aut valde aquosa, mala semper — hujus autem fœtor plerumque vel aniculis ministrantibus, imo & ipsis ægris, plane intolerabilis: interdum urget admodum pestifer tenesmus.

Urina vel in convalescentibus cruda perstat, ac sæpe tenuis, sæpe autem turbida, lactea, & oleosa quasi, nihil tamen omnino sedimenti deponit: evidens hoc magnæ cruditatis argumentum est; adeoque, licet ægrotantes pene restituti viderentur, frequenter tamen promptissime in * *recidivas* incidunt. Convalescentes sane, qui carnem nimis cito, aut pisces comedunt, in febrem certo certius relabuntur; præcipue haud probe prius purgato corpore. — Fortiora tamen *cathartica* hos etiam in idem periculum conjiciunt.

Quibus in meatu auriculari, aut pone aures, aut per cervices abscessus enati sunt, maxime si circa labia pustulæ plures urentes, certa fere spes salutis effulsit: omnibus ægrotantibus surditas ac tinnitus aurium accidit, diu sæpe post ruptum *apostema* durans.

Mirum est hercle, quod eruptio tantillæ materiæ morbidæ tam felices sortiatur effectus, quod tamen persæpe videmus: vix enim hoc modo ejici posse videtur morbi causa. Suspicio ego quidem hoc duntaxat esse signum, quod validæ adhuc sint naturæ vires, & quod sit usque sanguini motus sat expeditus per ultimas minimasque arteriolas; quibus deficientibus, nec matura-

Q 3

tur

* Febris, quæ sine ratione, sine bonis signis, finita est, fere revertitur, *Cels. Lib. 2. C. 7. Hippocrat. Aph. 12. Sect. 2.*

tur *apostema*, aut tuberculum, nec emergunt pustulæ. Hinc vides paulo ante mortem, succumbente nimirum prorsus natura, ulcuscula pallida, aut exiccata, & si quæ sint pustulæ, eas pallescentes, aut luridas, hærente scilicet in extremis vasculis sanguine.

Inter salutifera signa insuper fuit acidus, aut falsus in ore sapor, cum sputo multo; contra vero amarus & quasi ex ærugine (ut dicerent) fœdus certum fuit male judicati morbi signum, ac febris mox recidivæ, ni per vomitum, aut lenem *catharsin* ocyus expurgata forent putrida bilis & colluvies morbida. Quo quidem peractō felices quotidie experiebar *tincturæ corticis alexipharmacæ** effectus, & ad vires rescindingas & febris reliquias abigendas. Hujus est utique medicamenti roborare fibras arque debitam fluidorum constitutionem restituere, nec tamen interea prohibet morbose humoris exitum per cutis meatus: hinc longe tutius sæpe exhibetur quam ipse cortex *Peruvianus*, qui haud raro vehementer nimis constringit.

Per totam hanc insaluberrimam tempestatem *vesicatoria* immensam fere fundebant humorem, sanescebant vero difficillime; quosdam certe enormi fluxu consumebant prorsus.

Diu fuit undique piscium immensa quantitas, maxime scombrorum, quorum usu immodico procul dubio plures generantur morbi; augment enim & humorum putredinem ac labem *scorbuticam*, jam ubique grassantem, inter nautas præcipue, quorum gingivæ exesæ sunt admodum & halitus oris valde olidus—Rectissime ideo cum piscibus comeditur aceti plurimum, quod rancidum

* Libr. de febr. Cap. VIII.

dum eorum oleum corrigit, & putrescentem indolem — Nullus utique dubito quin largus aceti & pomacei usus foret nautis utilissimus in longis navigationibus *: imo hoc jam satis expertum est, adeo ut secum plurimi ad Indiam usque orientalem vinum pomaceum deportent: Acetum vero carnis & aquæ corruptionem prohibet.

Nova Luna 11. AUGUSTO. *Plena Luna* 25.

Maxima jam cœli est & soli mutatio, perpetuæ fere decidunt pluviae, atque omnia nimio diffuunt humore; unde messis infelix admodum, frumentum pene corruptum, & fructus prorsus fatui — Immensa scatet undique vis fungorum.

Ventus fuit australis sæpissime; haud raro sæviit Libs procellosus, hinc *atmosphæra* crassa valde, frigida, & maxime humida, præsertim sub mensis finem.

Pluvia $\overset{u}{2}$. 3. 4. $\overset{i}{5}$. 6. 10 — 12. 15. $\overset{i}{16}$. $\overset{i}{17}$. 18.
 $\overset{u}{20}$. 21. 22. 24. 25. $\overset{uu}{26}$. $\overset{i}{27}$. $\overset{e}{28}$. $\overset{u}{31}$ = 3.5 10.
 Dig. Dec.

Procella 26. a. m. S S W 4_x — 28. a. m. S W
 4. Magna pruina 29.

♀ Altitud. maxim. 30. 29, 9. S E 1. } media 29, $4\frac{2}{3}$.
 — — minim. 3. 29, 1. S W 2. }
 Dies frigid. 29. 42. N 1. } media 34 $\frac{25}{30}$.
 — calid. 1. 27. N W 1. }

Variolæ epidemicæ, quæ hic quidem parum sunt lethiferæ, longe aliter tamen aliis in locis.

Dysenteria cruenta, ac cholera frequens — multi levi angina atque faucium tumore vexantur cum doloribus vagis *rheumaticis*.

Q 4

Graf.

* Vide monitum nostrum de sanitate nautarum tuenda
 Vol III.

Grassatur adhuc febris nautica maligna, plurimosque trucidat, quosdam vel die septimo, imo interdum citius; multos autem vel ad vicissimum & ultra trahit — jam sæpe aut nullæ prorsus apparent *petechiæ*, aut raræ; sæpe tamen totum corpus maculant — crebro sudores pingues & foetidi ægrotos colliquant; haud raro quos febris fere reliquerat sæva *dysenteria* consumit: Solutis adeo sanguinis principiis, qua data portarunt humores.

Nova Luna 10. SEPTEMBRI. *Plena Luna* 24.

Ventus ab Occidente, ad Austrum plerumque vergens, prævaluit decimum usque octavum, continua fere ac gravi decidente pluvia, post autem contrario plane cursu spirabat, surgente *Baroscopio*, aëremque ficcabat.

Pluvia 1. $\frac{III}{u}$ 2. $\frac{u}{u}$ 3. $\frac{1}{u}$ 5. $\frac{1}{u}$ 6. $\frac{1}{u}$ 7. $\frac{1}{u}$ 9. $\frac{III}{u}$ 10. $\frac{1}{u}$ 11. $\frac{1}{u}$ 13. $\frac{1}{u}$ 15.

Dig. Dec.

16. 17. 22. 23. 24. = 3.628.

Levis procella 7. p. m. S. W b W 4^x — 27
Nocte E b S 4^x Paraselene 17. H. 7. p. m.
W N W 1.

♀ Altitud. maxim. 25. 30,0. N E 1. } media 29,6 $\frac{2}{3}$.
— — minim. 11. 29,0. W 3. }

Dies frigid. 30. 59. NE 1. } media 41 $\frac{1}{2}$.
— tepid. 6. 34. S W 2^x. }

Febres malignæ jam nec vi, nec numero, adeo sæviunt. *Dysenteria* plures cruciat; tussis quædam gravis *asthmatica* haud paucos. Tumores faucium, *parotidum*, maxillarum cum acerbo dentium dolore permultos divexant: Morbus colicus a *pomaceo* novello, cum alvo citissima plures exercet, *ophthalmia* passim, *variolæ* plurimæ.

Nova

Nova Luna 9. OCTOBRI. *Plena Luna* 23.

Fuit hic mensis multo frigidior solito, gelu ipso initio, etiam rigidum die decimo; Boreas plerumque spiravit, Eurus haud raro, pluvius auster nonnunquam: Alta fuit ut plurimum Barometri statio, aer vero crassus.

Pluvia $\frac{4}{4}$. $\frac{1}{5}$. 6—8. 16. 17. $\frac{2}{19}$. $\frac{1}{20}$. 21. $\frac{1}{23}$.

$\frac{1}{24}$. 28. 29. Grando 7. Grando & Nix multa
Dig. Dec.

23 = 1.914.

♂ Altitud. maxim. 27. 30, 3. N E 1. } media 29 $8\frac{2}{8}$.
— — minim. 20. 29, 3. S W 2_x. }
Dies frigid. 27. 69. } media 56 $\frac{1}{2}$.
— tepid. 20. 44. }

Febres lentæ nervosæ frequentes; permanent usque aliquæ malignæ, quibus sub finem accedit diarrhæa, interdum dysenteria mucosa cum sanguinis strigmentis.

Tussis, angina, faucium tumores, dentiumque dolores per plurimos corripunt. Jam regnat admodum colica pomacea, haud solito tamen cum furore, ob diarrhæam fere semper comitantem: Variolæ adhuc epidemicæ.

Nova Luna 8. NOVEMBRI. *Plena Luna* 22.

Fuit & November perquam frigidus, aer plerumque crassus, afflavit Aquilo sæpe, sæpe Corus, intercurrente frequenter Africo furente & pluvioso; maximæ subinde pruinae, haud raro rigidum gelu.

Pluvia ^{III} 1. ^I 2. 5. 7. ^I 9. 10. 11. 13. 14. ^{II} 16.
 20. ^{II} 21. 22. 23. ^{III} 25. ^I 27. 28—30. Grando 1.
 Dig. Dec.

5. 25. Nix multa ^I 2. 24. 25. = 3.844.

Procella gravissima 1 a primo mane ad noctem usque. N W 4x.

—— ——— 21 Mane S W b W 4 — 26 Nocte S W 4x.

Fulgur & Tonitru 25 Vesperi.

☿ Altitud. maxim. 18. 30, 2. N N W 1. } media 29.5 $\frac{14}{29}$.
 — — minim. 24. 28, 8. E 2. }

Dies frigid. 25. 69. N N E 1. } media 69 $\frac{20}{29}$.
 — tepid. 15. 50. S W b W 1. }

Variolæ usque grassantur; febres malignæ passim, lentæ ac *miliares* sparsæ, ruri præcipue: erysipelas, angina, tussis acres haud paucos corripunt. Plurimi colica *pomacea* laborant cum *diarrhæa* plerumque, adeoque, cito profligatur; solutum enim ventrem raro torquet admodum colicus morbus, saltem brevi cedit anodynis; iisque opportunus est locus post unam alteramve *rhabarbari dosin*; neque inter hæc melius est aliquid *philonio*, cave tamen ne alvum nimis cito strictam reddas, nam paulo post ut plurimum recrudescit dolor, congesta scilicet iterum acri coluvie; tenera iccirco semper per dies aliquot servanda est; probe autem interea muniendum est corpus a frigore, aliter, constricta cute, mox plectuntur viscera *.

Nova

* Consensum cutim inter & intestina probe novit *Alex. Trallianus* „*αυξῆσαι γὰρ τὸ πρῶμα* (ad intestina scilicet) *εἰς ὅσον ἂν πυκνωθῇ τὸ δέρμα*. *Trallian.* p. 216. ex Edit. *Goupyli*, sed etiam *Hippocrat.* Lib. 6. *Epidem.* Sect. 3. ipso initio *Lutet.* Fol. 1548.

Nova Luna 7. DECEMBRI. *Plena Luna* 21.

Per initia *Decembris* dira, procellosa, pluvia tempestas, Libs interim quotidie perfremuit: Die 2 & 3 fulgura sæva cum tonitru, grandine, pluvia; hinc aër factus est crassissimus & maxime humidus. Ab undecimo ad vicesimum, mutata penitus rerum facie, rigidissimum gelu, immensæ pruinæ, cœlumque sudum perflante Borea: inde vero Auster prævaluit atque *atmosphæram* densam valde ac udam maxime fecit.

Pluvia $\frac{iii}{1.}$ $\frac{i}{2.}$ $\frac{ii}{3.}$ $\frac{ii}{4.}$ $\frac{ii}{5.}$ $\frac{ii}{6.}$ $\frac{iii}{7.}$ $\frac{ii}{8.}$ $\frac{ii}{9.}$ 10. 19.

$\frac{iii}{21.}$ $\frac{ii}{22.}$ $\frac{iii}{23.}$ $\frac{i}{26.}$ $\frac{i}{27.}$ $\frac{i}{29.}$ 30. 31. Grando vehemens 2. Nix $\frac{i}{14.}$ $\frac{i}{15.}$ $\frac{i}{19.}$ 20. = 6.290. Dig. Dec.

Furens procella 1. Nocte S W 4^x — 2 p. m. S W b W 4.

Procella 3 S W 4^x — 5 W 4^x Vesperis — 6 primo mane W S W 4.

———— 20 ante lucem N W b N 4 — 21 toto die S S E 4. cum enormi pluvia, quæ omnem penitus nivem colliquabat; isto etiam die fulgura & tonitrua gravissima.

Nebula fœtidissima 27. W S W 1_x.

☿ Altitud. maxim. 31. 30,0. NW 1^x. } media 29.4.
— — minim. 22. 28,8. S S W 3^x. }

Dies frigidissim. 19. 80. ENE 1. } media 61 $\frac{2}{3}$.
— tepid. 8. 49. S W 3. }

Crebræ adhuc *variolæ*: *pleuritides*: *peripneumonice*; *rheumatismi* passim: Febres *petechiales* aliquæ adhuc, tussis vehemens, & *asthma* grave plurimos premit: morbus colicus frequentissimus, hunc tamen alvus cita admodum & biliosa brevi solvit.

Tota

Tota pluviae Quantitas Anno MDCCXL.
Dig. Dec.
= 24.042.

Nova Luna 6. JANUARIO. *Plena Luna* 20.

Ab initio mensis ad diem sextum spiravit *Caurus*, inde ad decimum quintum frigidissimus *Boreas*, tunc *Libs* pluvius irruit, a vicesimo sexto tamen ad finem usque fremuit subinde *Vulturnus* — Medio mense acerrimum gelu, aërque valde ficcus; dum autem *Africus* perflavit, factus est humidissimus, liquecente prorsus gelu.

Pluvia 2. $\frac{1}{16}$. $\frac{0}{18}$. $\frac{0}{19}$. $\frac{1}{21}$. $\frac{1}{22}$. 24. 25. $\frac{1}{27}$.
Dig. Dec.
28. 29. Nix 10. 12. 14. = 1.936.

Procella 27. Nocte & toto die sequente S E
b E 4.

⌘ Altitud. maxim. 1. 30,3. NW 1. } media 29.8.
— — minim. 16. 28,9. SS W 3. }
Dies frigid. 15. 79. ENE 1^x. } media 61. $\frac{22}{31}$.
— tepid. 22. 52. S W 3^x. }

Variolæ frequentes etiamnum, per plurimi *colica* laborant, multi sane ex usu *pomacei* novelli, haud pauci vero a superabundante bile; omnes liquida citaque alvus exercet, nunc biliosa valde, nunc mucosa. Multi acuti pectoris morbi; *anginæ* & *rheumatismi* frequentes. *Apoplexia* & *epilepsia* passim.

Tabidi pulmonarii jam pessime se habent, aucta nempe plurimum tussi & gravitate spirandi.

Febris *petechialis* jam paulo magis sævit.

Fœda admodum scabies dominatur maxime inter popellum, obstructis nimirum cutis spiraculis, a gravi longoque frigore, detinetur materia,

ria, quæ perspirare debebat, unde Glandulæ *miliares* obserantur atque roduntur tandem — In frigidis regionibus & tempestatibus semper grassatur *scorbutica* lues, densata plurimum cute, ac retenta nimium salina corporis fuligine — annon hinc hujus *prophylaxis*, annon hinc cura ex facili elicitur? Multo facilius utique curatur per æstatem quam durante hyeme asperiore.

Nova Luna 4. FEBRUARIO. *Plena Luna* 19.

Sublime ut plurimum stetit *mercurius* in *Baroscopio* hoc mense, idque etiam initio, licet *Vultur* nonnunquam flavit, imo & ipse *Auster*; aër autem tunc fuit humidus valde & crassus*; a decimo octavo tamen ad finem usque frequens ventus borealis *atmosphæram* tenuem fecit, perquam frigidam, & multo sicciorem.

Pluvia 1. 5 — 7. 10. ^u14. ^u15. ^u16. 17. 18. 19.
Dig. Dec.

26. Grando multa 15. 16. 17 = 1.456.

Barometer fuit ad 30.5 ** septimo etsi ventus SSE 2*.

Maxima vero tunc nebula. — *Procella* 16 mane S 4x.

Fulgur & tonitru vesperi. Quam maximus halo circa lunam 11. H. 9. p. m. S W b W 1.

☿ Altitud. maxim. 27. 30,6. ENE 1. } media 29.9 ⁵/₈.
— — minim. 16. 29,2. SbW 3. }

Dies frigid. 24. 72. ENE 1. } media 59 ⁹/₈.
— tepid. 6. 53. Malacia. }

Multæ adhuc *variolæ*: *rheumatismi*, *peripneumonice*, *pleuritides*, & veræ & nothæ passim. Tuss

* Vid. Vol. I. p. 181.

** Vide Vol. I. p. 181.

ses vehementes, & diri admodum *asthmatis paroxysmi* frequentes: hinc tempestas fuit maxime noxia tabidis, nam tussim movet Boreas, pulmones vero constringit ac sputa supprimit. — *Colica* & *diarrhæa*, seu tormina sæviunt plurimum.

Durat usque febris maligna, inter nautas vero præcipue, & maxime in *nosocomiis*.

Nova Luna 6. MARTIO. *Plena Luna* 21.

Præalta fuit *Barometri* statio toto *Martio*, ventus interea perpetuus Orientem inter & Septentrionem; aër vero ficcissimus ac frigidus valde, gelu frequens admodum, imo ad finem usque mensis asperum: per totum ne vel guttula pluviae.

Dig. Dec.

Nix 18. 19. Grando 28 = 0.072.

Maris æstus suppreslit maxime Boreas longe frequens, paululum etiam magna *Barometri* altitudo *. Hoc sane perpetuum est, quod adventante procellosa, pluviaque tempestate & sonitus maris permagni, & æstus enormes præcedunt, quinimo portendunt, his in oris saltem; contra durante apricitate, ventoque boreali, minimi sunt semper & fluctus & æstus maris.

AB. 5. H, 9. N N E 1. — levis 9. H. 8. E. 1^x — 21. Vesperi E N E 2.

§ Altitud. maxim. 7. 30,5. N E 1. } media 30.0 $\frac{9}{31}$.
— — minim. 31. 29,6. N 1. }

Dies frigid. 30. 68. E N E 2. } media 56 $\frac{19}{31}$.
— tepid. 9. 50. Eb S 1^x. }

Variolæ ubique *epidemicæ*, plerumque tamen paulo mitiores, nisi inter nautas, quorum plures quidem pereunt, una forsan conspirante febre mali-

* Vide Vol. I. p. 17.

maligna, quæ permanet adhuc: credo etiam quod *scorbutica* lues, qua hoc genus hominum jam maxime afficitur, variolas magis exitiales reddit: haud raro mictus adest cruentus, interdum sputa sanguinolenta.

Plurimæ *pleuritides* ac *peripneumoniæ*, eæque vehementes admodum *—sævit abunde *rheumatismus* & *arthritis*, nec infrequens est gravis *angina* *—sævissimum *asthma* quosdam diu ac crudeliter premit—Tussis importuna valde & laboriosa plurimos—Horum omnium fere sanguis extractus est perquam tenax. *Phthisici* haud pauci subito abripiuntur.

Nova Luna 4. APRIL. *Plena Luna* 19.

Manet usque *atmosphærae* constitutio sicca valde & frigida; initio mensis gelu & maximæ pruinae; ventus Aquilonius sæpius hoc mense, sub finem vero ab Oriente spirabat, aër interim tenuis & maxime siccus, medio autem largissimæ rorationes—Sub finem multa pluvia apud *Totness*, *Dartmouth*, *Kingsbridge*, &c. hic ne vel guttula.

Dig. Dec.

Pluvia 1. 5. 8. 9. 10. 20. 21 = 0.452.

Altitud. maxim. 3. 30,4. N 1. } media 29.9 $\frac{2}{3}$.
— — minim. 1. 29,5. N 1^x. }

Dies frigid. 2. 64. N 1. } media 47 $\frac{1}{2}$.
— tepid. 14. 41. Malacia. }

Variolæ quaquaversum *epidemicæ*; *pleuroperipneumoniæ* frequentes valde: *asthma*, tussis vehementis

* Όταν χειμῆριον γένηται ἤρ καὶ ὁπισθὸν χειμῶν, χειμεριναὶ καὶ αἱ νοῦσαι, καὶ βηχῶδες, καὶ περιπνευμονικαὶ, καὶ πνευγχικαὶ. *Hippocrat. de Humorib. Sect. 7.*

hemens, verbo & acuti & *chronici* pulmonum morbi invalescunt maxime: haud pauci sanguinis sputo corripuntur; permulti *phthifici* ad plures abeunt.

Plurimæ Febres putridæ, sæpe cum eruptione *miliari*, sæpe cum *petechiis* in australi *Dammonia*—Sedulo inquirens has plerumque esse propagines febris nauticæ contagiosæ invenio, ea nempe loca adeunte uno, alterove nauta convalescente: parum adeo tutum est recipere ex febre contagiosa recuperatos: diu sane vestibus adhæret morbi seminium.

Nova Luna 4. MAIO. *Plena Luna* 19.

Ineunte & exeunte mense aër erat maxime ficcus, medio autem densus & paulo humidior; quippe frequens decidit imber diem quartum inter & undevicesimum, postea vix guttula pluviae; afflavit sæpe Vulturnus, Aquilo tamen initio, sub finem Caurus. Ros erat subinde uberrimus, a vicefimo præcipue.

Erucae innumeræ hortis sunt infensissimæ.

Pluvia 5. $\frac{1}{6}$. 7. $\frac{1}{8}$. 10. 13. 15. 17. $\frac{n}{18}$. 19.
Dig. Dec.

= 0.928.

Procella levis 19 mane SSE 4^x. Imbres gravissimi 30 ad Septentrionem hic nulli.

♀ Altitud. maxim. 21. 30, 1. E b S 1.	} media 29.6 $\frac{2}{3}$.
— — minim. 18. 29, 1. S W b W 2 ^x .	
Dies frigid. 14. 52. N b E 1 ^x .	} media 37 $\frac{2}{3}$.
— calid. 27. 24. NNW 1.	

Vix unquam memini *variolas* magis ubique grassantes; *Rubeoli* passim, seu *rossalia* *Frid. Hoffmanni*.—Angina, tussis, *asthma* frequens. Fe-
bres

bres quædam tertianæ *, lentæ | quædam ac nervosæ, plures *petechiales*; jam autem multo magis floridæ sunt maculæ.

Nova Luna 2. JUNIO. *Plena Luna* 17.

Ventus hoc mense varius, Zephyrus autem prævaluit: aer plerumque crassus; fervida admodum sub finem tempestas. — Vis immensa cruciarum omnium generum omnia fere olera devorant: Cicadæ innumeræ, muscæ infinitæ ac afili pecora maxime infestant.

Pluvia $\frac{1}{2}$. 3. 6. 7. $\frac{1}{2}$. 9. 16 — 18. $\frac{1}{2}$. 19. 20. $\frac{1}{2}$.

Dig. Dec.

24. $\frac{1}{2}$. 26. 27 = 1.250.

Lumen insolitum 29. H. 11. p. m. Arcus nempe igneus lucidus valde ab horizonte prope S E ad gradus saltem nonaginta projectus.

§ Altitud. maxim. 13. 30,0 NW 1.	} media 29. $6\frac{1}{2}\frac{5}{8}$.
— — minim. 8. 29.3 WSW 2.	
Dies frigid. 10. 34. WbN 1 ^x .	} media 27 $\frac{2}{2}\frac{2}{8}$.
— fervid. 29. 18. S E 1.	

Variolæ maxime epidemicæ longe lateque permultos occidunt; hic tamen non sunt adeo lethales, nisi accedunt *petechiæ*. Aura ** subfrigida & potio subacida liberalis est *variolosis* nunc maxime necessaria, brevi aliter suffocantur; teterimus enim jam est odor confluentium *variolarum*: neque hoc inter mala signa numerandum est, modo cætera favent. Levis febris *rubeolosa*, seu pustulata passim. Anginæ, & faucium tumores crebri. Febres nauticæ sparsæ.

Nova

* Consule quæ dixi Libr. de Febribus Cap. II.

** Consule eundem librum Cap. de Variolis.

Nova Luna 1. JULIO. *Plena Luna* 17.
Nova 31.

Torrída valde & aridíffima tempeftas omnia fere aduffit, vix viridem vides herbam nifi in pratis humidíffimis, matura tamen hinc meffis & opima, frumentum optimum. — Menfis initio venit ab Oriente ventus, poft feptimum ab aquilone ad vicefimum ufque, inde ad finem parum erat conftans. Ros plurimus omni fere nocte. Innumerabiles garrulæ cicadæ: Mufcæ & afili armenta vexant admodum.

Quamvis *atmofphæra* eft ficciffima, ut *hygrofcopia* monftrant, levi tamen fumo offufcata videtur, quod quidem haud raro per ficcas valde & apricas tempeftates accidit *.

Dig. Dec.

Pluvia 5. 6. 16. 18. 20. 25. 28. 29 = 0.764.

Fulgura 3 nocte E S E 3. Tonitru quoque e longinquo. Permagnus lumen boreale & lucidum valde, effulgente licet luna, 12. per totam fere noctem, N 1.

♀ Altitud. maxim. 9. 29,9. NNE 1^x. } media 29.5⁸/₇.
 — — minim. 5. 29,3. ESE 2^x. }

Dies frigid. 20. 30,0. N 1. } media 22.⁴/₇.
 — fervid. 14. 14. N 1^x. }

Dies valde fervidæ 1. 7. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 24. 28.

Variolæ undique. Febres multæ putridæ magna cum oppreffione præcordiorum, arida lingua; ac Urina valde biliofa. Cholera & *diarrhæa* valde frequens; porracea, nigra, sæpe rejiciuntur; Tormina plerumque sæviunt multum, bilis subatræ plurimum dejicitur. Ob æftum enormem

* Vide Obfervat. Mense Junio 1740.

mem omnes maxime debilitantur sudore profuso pene digesti.

Non solum humidissima sanguinis dissipat fervida tempestas, sed & ejus partem maxime actuosam, vim porro fibrarum vehementer enervat. Quid inde? restat crassior atque segnior moles humorum, unde in vasis *meseraicis*, hepate, splene, & ubicunque tardior est, ex ipsa lege naturæ, sanguinis motus, obstructio facilis oritur & prompta nimis. Atqui cum & ipse calor immodicus sales oleaque corporis torreat quotidie & exacuat, fit major in dies majorque humorum acrimonia, inde bilis acerrima: hinc cholera, hinc tormina sævissima, hinc putridæ febres — Quid igitur? diluendus est affatim sanguis, demulcenda quoque perpetim hujus acrimonia. „Faciám utique, ast quo bibitur plus, eo sudatur „amplius.“ En & hujus mali remedium sine vel medicinæ tædio; admisce modo vini rubri generosi aliquid potioni dilutæ, mirabere sane expertus tantilli tantos esse effectus; constringit nempe vascula, cutis coarctat meatus, & confirmat humores: epoto tantum uno, alterove vini rubri Gallici, aut Portugallici cyatho, vidi multoties profusos extemplo sedatos sudores, etiam in ipsis febribus colliquantibus. — Cave tamen, cane pejus & angue, infusum *theæ*, calidosque liquores; nec verum interea, dum corpus æstuat, perfrigidi poculi pœnas lue.

Plena Luna 15. AUGUSTO. Nova Luna 29.

Sicca fuit satis & calida, imo nonnunquam fervida, tempestas hoc mense, unde messis lætissima ac fœcunda valde, nec tamen defuit tempestiva pluvia, quæ solum, exustum prorsus, re-

creavit maxime, ita ut sub finem *Augusti* renovata quasi viridisque videretur facies agrorum.

Ventus fuit varius, sæpius e Septentrione, qui cælum semper sudum & plerumque calidum fecit.

Pluvia 2. 5. 6. 7. 13. 19. 20. 21. 22. 25.
 Dig. Dec.
 20 = 2 140.

Immensæ interdum rorationes. Erucae & cicadae innumeræ.

☿ Altitud. maxim. 16. 30,0. NE 1. } media 29.6 $\frac{15}{8}$.
 — — minim. 21. 29.2. S W 1. }
 Dies frigid. 25. 36. E S E 2. } media 27 $\frac{25}{8}$.
 — fervid. 10. 20. N 1. }

Variolæ adhuc maxime *epidemicæ*, jamque multo peiores, maculis lividis scilicet haud raro stipatae. Febres putridæ, perlongæ (*mesenteriacæ* forsan) plurimæ inter popellum atque nautas præcipue; quædam vero valde *phreneticæ*, hæ autem multo citius jugulant. His tumidus est plerumque venter & astrictus; retenta ideo in visceribus biliosa colluvie, lenibus purgantibus commodissime fugantur; parum certe profunt sudores, minime vero præmaturæ, & ipso morbi initio erumpentes, qui certissime fere supprimunt urinam & alvum, obrepente mox phrenitide. Mirum est utique, quam multum atræ bilis * ἀνώ καὶ κάτω ejicitur sæpe. Sub finem mensis angina (plerumque mucosa) frequens admodum, dentium quoque dolor, fauciumque tumores multis infesti sunt. Cholera & *dysenteria* grassatur plurimum; idque semper fere accidit post æstates præcalidas,

* Ἡ μέλαινα χολὴ τῆ φθινοπώρου πλεῖστη τὴ καὶ ἰσχυροτάτη ἐστίν. Hippocras. de Natur. Hominis, Sect. 25.

calidas, non solum ob bilem adustam acresque factos corporis succos, sed adventante subito autumnali frigore patula cutis nimium cito occluditur, unde, quod perspirandum erat, ad interiora ruit.

Plena Luna 14. SEPTEMBRI. *Nova Luna* 28.

Quanquam & calida fuit *atmosphæra* & sicca mensis initio, pluvius tamen & procellosus *Auster*, septimo adveniens die, mutavit prorsus æris temperiem; vicesimo tepida valde & pulchra tempestas recurrit, flante plerumque ab Oriente vento, ros interim perplurimus; ad finem *Auster* iterum pluviaque.

Cicadæ adhuc infinitæ inter herbas, jam virides, lætissime garriunt.

Pluvia 4. ^{mm} 7. ^u 8. 9. 10. 14. 15—18. 28. 27.

Dig. Dec.

28. 30 = 2.756.

Procella 7 prima luce S S E 4—13 E 4. maxima *procella* apud *Londinum* & oras *Angliæ* boreales *8 die.

Fulgura 24 vesperi. AB. magna ad multam noctem durans 21 N E 1—27 H. 9 p. m.

Altitud. maxim. 21. 30, 1. N E 1. } media 29.5 $\frac{1}{2}$ $\frac{4}{8}$.
— — minim. *8. 28, 5. S b E 3^x. }

Dies frigid. 30. 41. N W 1. } media 32. $\frac{2}{26}$.
— calid. 23. 26. E S E 1. }

Variolæ usque grassantur. Febres *synochæ*; nec non intermittentes quædam *anomalæ*, quæ vero typum multo magis regularem servant post leniorem alvi fluxum, sive arte, sive sponte productum: Vomitu repetito sæpe eliduntur penitus.

Per plurimi tumore faucium dentiumque dolore & aurium vexantur; crebro inde in meatu auriculari abscessus: Aliqui angina gravi corripiuntur.

Diarrhæa & *colica* frequens, quibus medela facilis ex *rhabbaro catharsis* & repetita, fortior utique dira tormina plerumque movebat.

Plena Luna 13. OCTOBRI. *Nova Luna* 28.

Haud parca cadente pluvia per *Octobris* initia atmosphæra facta est longe humidior, atqui nonno ortus ab Oriente ventus ad decimum octavum duravit, cælumque fecit apricum plerumque ac siccum; inde Libs, mox Vulturnus, multam demisit pluviam.

Pluvia	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{13}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{19}$	$\frac{1}{20}$
	1.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	13.	15.	19.	20.
	$\frac{1}{21}$	$\frac{1}{22}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{1}{30}$	= 3.498.			
	21.	22.	24.	25.	26.	28.	30.				

Procella 21 nocte S W 4x — 25 noctu S E b S 4.

☿	Altitud. maxim.	14.	30,2.	ENE 1.	} media 29.5 $\frac{3}{4}$.
—	—	minim.	21.	29,0.	
Dies	frigid.	18.	50.	E b N 1.	} media 43 $\frac{1}{3}$.
—	tepid.	7.	36.	SW 2.	

Variolæ passim: multæ febres putridæ, ac *cattarrhales*; fluxiones porro & tumores faucium levi quasi cum angina frequentes, sæpius omnino sine febre. Multi *asthmate* premuntur. Pustulata febricula (*the Chicken and Pigs or Swine's Pox*) plures infantes ac puerulos corripit; sæpe abeuntibus vesiculis stigmata linquuntur quasi a *variolis*; quod quidem haud parvam denotat humoris acrimoniam, adeoque postulat purgantia idonea atque demulcentia. — Turpiter persæpe falluntur aniculæ

aniculæ, dum hujusmodi stigmata pro veris *variolarum* vestigiis jactitant.—*Variolæ* quippe & mora, & maturationis modo, ab his longe diversæ sunt —abeunt nempe *rubeoli* tertio, vel quarto, *variolæ* autem non nisi, licet quam citissime, post diem octavum.

Plena Luna 11. NOVEMBRI. *Nova Luna* 27.

Eurus initio, Aquilo sub finem prævaluit, Boreas interdum, sæpius tamen Libs & Auster pluviosus; ær fuit plerumque crassus valde ac tepidus, ad finem autem rigidum gelu invasit.

Pluvia $\frac{1}{1}$ 1. $\frac{11}{11}$ 6. $\frac{110}{110}$ 7. $\frac{1}{1}$ 8. 16. 17. $\frac{1}{1}$ 18. $\frac{11}{11}$ 19. $\frac{11}{11}$ 20. 21.

Dig. Dec,

$\frac{111}{111}$ 22. $\frac{1}{1}$ 23. $\frac{1}{1}$ 24. $\frac{11}{11}$ 25. 26 = 4.024.

Grando 23. Procella 19. p. m. S W 4^x — gravis 25 nocte S W 4^x.

Fulgur & tonitru ad mediam noctem ab H. 8. p. m. 6. S W 2.

☿ Altitud. maxim. 14. 30,4. ENE 1. } media 29.8 $\frac{16}{35}$.
— — minim. 23. 29,2. SW b W 3. }

Dies frigid. 30. 66. NE 1. } media 52 $\frac{4}{35}$.
— tepid. 6. 41. WSW 2. }

Variolæ sparsum — Jam ingruunt *morbilli*, ut plurimum quidem benigni: Febre pustulosa, & *rubeolis* pueri perplurimi corripuntur — Videtur adeo jam inesse sanguini *diathesis* quædam peculiaris ad exanthemata gignenda, quod sæpe sane notatur; *variolis* nempe, *morbillis*, papulis, & omnium generum pustulis, una grassantibus — Forte acris & biliosa colluvies, quæ mense *Julio*, *Augusto*, & *Septembri* intestina torquebat, nunc tendit ad cutim — Anne deducenda hinc est indica-

tio curandi per sudores, vesicantia, &c. in febribus per talem constitutionem sævientibus?

Febres lentæ *nervosæ* sparguntur, item *peripneumonice* nothæ. *Asthma*, angina, *rheumatismus* frequens.

Tusses & destillationes permultos laceffunt cum tumoribus faucium, dentiumque doloribus, sæpe admodum acerbis.

Plena Luna 11. DECEMBRI. *Nova Luna* 26.

Ineunte mense aër erat crassus valde, humidus ac subtepidus, post octavum vero multo frigidior, ad finem frigidissimus: Boreas perflavit sæpissime, Vulturnus frequenter, præsertim mensis initio, Auster interdum. Maxima fuit *atmosphæcæ* mutatio die ultimo, mane nimirum omnia rigidissimo constricta gelu, vesperi pluvia perpetua [Thermometro a Gr. 80 ad 65 ascendente, irruente Vulturno.

Pluvia 1. 5. 6. 8. 9. 10. 15. 17—19. 20.

Dig. Dec.

21. 31. Nix 25. 29. Grando 9 = 1.070.

Nivis plurimum erat difflatum.

§ Altitud. maxim.	1. 30,2.	E b S 1.	} media 29.7 $\frac{16}{30}$.
— — minim.	9. 29,4.	W N W 1 ^x .	
Dies frigidissim.	31. 80.	Mane ENE 1 ^x .	} media 63.
— tepid.	7. 50.	SSE 2 ^x .	

Etiamnum *variolæ*; *morbilli* frequentes; *anginæ*, *pleuritides*, *peripneumonice*, & veræ & spurie, plurimæ: *rheumatismi* atque *asthmatis paroxyfmi* vehementes multos corripunt. *Corycæ*, destillationes, tusses, dentium dolores fauciumque, colli, ac capitis tumores permultos affligunt undique.

Tota

Tota pluviae quantitas Anno MDCCLXI. fuit
Dig. Dec.

= 20.354.

Plena Luna 9. JANUARIO. Nova Luna 25.

Ipsa anni principio horrida tempestas, procella, pluvia, grando, fulgura, tonitru; nec multo laetior fuit totus hic mensis, quippe nimbofus admodum & squalidus: a 13. ad 20 perpetua fere procella, aer interim humidissimus ac valde nebulosus; tunc Eurus paululum dispulit nubes; mox autem Libs turbidus recurrit; ipso Januarii exitu Corus: a septimo ad decimum acre gelu.

Pluvia $\frac{''' }{1.}$ $\frac{'' }{2.}$ 3. 4. 6. $\frac{''' }{11.}$ $\frac{'' }{12.}$ $\frac{'' }{13.}$ $\frac{'' }{14.}$ 15.

$\frac{'}{16.}$ 18—20. 24—27. $\frac{'' }{28.}$ 29. 30. Grando 1.
Dig. Dec.

2. 17. Nix 7 p. m. E N E $2^x = 3.520$.

Procella 1. S W 4—2 primo mane W S W 4_x
—gravis tota nocte 13 S W 4^x —14 a. m. S W
4—15 W b S 4_x —16 S W 4—19 S W 4—28
S W 4.

Miror Barometri altitudinem tantis furentibus procellis.

✂ Altitud. maxim. 22. 30,2. E 1. } media 29.6 $\frac{7}{30}$.
— — minim. 14. 28,8. S W 4 }
Dies frigid. 10. 74. N N E 1^x . } media 57 $\frac{29}{30}$.
— tepid. 19. 50. S W 4. }

Variolae frequentes, morbilli epidemici: Pleuritides, peripneumoniae, anginae, permultae; arthritide & rheumatismo plurimi plectuntur.

Sub finem morbillorum saepius accedit saevissima tussis atque peripneumonia, quae morbum haud parum fatalem reddit: quamprimum haec

R 5 inva-

invadit, sanguis est protinus mittendus, qui plerumque est viscidus admodum & tenax: idque fere notatur in omnibus febre acuta, hac tempestate, laborantibus; utique haud boni est ominis, si fluidus sit & floridus nimium, quod anginosus accidit interdum & peripneumonice, atque ut plurimum pessime significat.

Plena Luna 8. FEBRUARIO. Nova Luna 23.

Quanquam per initia mensis blanda fuit satis tempestas, advolans tamen octavo Boreas, aërem fecit multo frigidior; post 13 ventus varius, 20. autem Boreas recurrit cum aspero gelu ad finem fere perdurans. Aër fuit persiccus & valde frigidus; *Barometri statio præalta.*

Pluvia 3. 4. 6. 12. 13. 15. 17. 18. 19. Nix
Dig. Dec.
11. 18. 22. 23. 24. Grando 21. 22 = 1.200.
AB. 20. N. 1. Procella 6 Nocte W S W 4x.

☿ Altitud. maxim. 27. 30.4. ENE 2. } media 29.9 $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{8}$.
— — minim. 19. 29.4. S W 2. }
Dies frigid. 28. 68. ENE 2. } media 61 $\frac{1}{2}$ $\frac{4}{8}$.
— tepid. 1. 54. W 1. }

*Morbilli epidemici, variolæ passim. Rheumatismus, & pleuropneumonice multos corripunt, tussis ac tonsillarum tumores plurimos: Sæva arthritis, & asthma grave frequens admodum. Diu spirante vento a plagis orientalibus * asthmatici semper pessime se habent; imo novi plures, qui, etsi lectulo inclusi, talem ventum mox adventantem præsentunt, atque prædicunt.*

Tabifica tussis, & foeda scabies plurimos equos consumit, ac jugulat.

Plena

* Vid. Not. F. 1728. Vol. I. de Aëre & Morbis Epidem.

Plena Luna 10. MARTIO. *Nova Luna* 25.

Siccus maxime & frigidus fuit totus hic mensis, aër tenuissimus, vix imberculus aliquis, nix nulla, perpetuus spiravit ab Oriente ventus ad Septentrionem plerumque vergens, hinc acresæpe gelu maximæque pruinae; minimi vero maris æstus, at alta semper *Mercurii* statio — Sub finem Martii graves ruebant imbres ad Orientem, hic nulli.

Dig. Dec.

Pluviola 26. 27 = 0.016.

Levis *AB.* 5. Vesperi N N W 2 — maxima 15.

H. 9. N b E 1 — 16 H. 10 N b E 1 — 24 H. 8. p. m. E N E 1^x.

Zona lucida subflava, ad modum iridis quasi a N E ad S W. extensa, transiens porro per ipsum lunæ corpus Die 6 H. 9. p. m. N b E 1.

☿ Altitud. maxim. 4. 30,5. N E 1. } media 30.0 $\frac{18}{29}$,
— — minim. 21. 29,8. E S E 1. }

Dies frigid. 1. 68. N E 2. } media 57 $\frac{27}{29}$.
— tepid. 31. 51. N b W 1. }

Sparæ *Variolæ*, *morbilli epidemici*, haud raro lethales: jam & pectoris & pulmonum morbi sæviunt admodum; pulsus est multum incitatus & valde durus, spiritus difficilis, & inter tussendum acutissimus dolor, sputa densa, tenacia, raro sanguine tincta — Sanguinis missio, & potio diluta, subtepida, liberalis, sola fere fuere remedia, nitro plurimo adjecto.

Tusses, *catarrhi*, dentium dolores ac faucium, omnes fere infestant: Angina vero & *rheumatismi* plures: Asthma pertinax & grave haud paucos premit; longi & sævi arthritidis *paroxysmi*.

Omne

Omnes pene equi, nisi stabulis bene curantur, scabie ac purulenta tussi vexati tabescunt; plurimi pereunt.

Plena Luna 8. APRILI. Nova Luna 23.

Ineunte *Aprili* tempestiva pluvia sitientes agros rigavit, pauloque post grata tellus lætam herbam & flores innumeros protulit, quos fovebat in dies ros uberrimus; his tamen infensa est maxime infinita quantitas erucarum omnigenarum. Post undecimum ventus, inter Orientem & Septentrionem fere perpetuus, siccissimam & tenuissimam reddidit *atmosphæram*.

Pluvia $\frac{'}{5}$. $\frac{''}{6}$. 7. 8. $\frac{'}{11}$. 12. $\frac{''}{22}$. Grando 6.
Dig. Dec.

II = I. 152.

✕ Altitud. maxim.	1. 30,4.	Nb W 1.	} media 29,8 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$.
— — minim.	7. 29,0.	N W 2.	
Dies frigid.	7. 57.	} media 46 $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{8}$.	
— tepid.	23. 38. E 1.		

Variolæ plures usque, *morbilli epidemici*, & sæpe funesti. *Rheumatismus*, *angina*, *pleuritides* * *peripneumoniarum* frequentes; *ophthalmicæ* crebræ—Sanguis febricitantium emissus jam fere semper est viscidus admodum. Tussés graves, *raucedines*, *tonsillarum* ac *maxillarum* tumores per plures affligunt. Tempestas est tabidis prorsus insensibilissima: *Febres tertianæ* aliquæ ** & *hemitritæ*.

Febris putrida contagiosa, ac *pestifera* valde, cum ingente virium damno, maxima præcordio-

* Vid. Libr. de Febr. Cap. II.

** Vid. Lib. de Febr. l. c.

diorum oppressione, tremore tendinumque subsultu, vigiliis, delirio, lingua nigra & sæpe arida valde, faucibus squalidis, & halitu foetidissimo, jam apud *Launceston* ejusque viciniam sævit admodum, estque profecto funesta maxime — Pulsus vacillat plurimum mox ab initio morbi, idque vel in robustis: Urina est plerumque lurida, & vapida quasi, sæpe subnigra & olida, rarissime aliquid inest sedimenti, interdum vero continet furfurosa quædam inæqualiter sparsa: haud raro statu febris erumpunt atræ *petechiæ*, sæpe papulæ, aut pustulæ livescences cum oleoso sudore ac valde graveolente: Nihil fuit lætius quam floridæ pustulæ in ipsa morbi ἀρχῇ, nihil funestum magis lividis & subnigris; meræ maculæ nunquam non aliquid mali denotabant. Alvus nigra, foetida maxime, & citissima, plures sub finem abripuit: Aliqui phrenitide post pervigilium correpti sunt, plures quasi veterno, idque sæpe vel ipso morbi initio; si insciis his oborta est alvi dejectio, certissima sequuta mors est, biduo vix exacto.

Genita hæc in carceribus febris, & per comitia provincialia disseminata longe lateque, plurimos letho dedit, optimaque sæpe elusit confilia — Certe qui fuere sanguinis prodigi nimis, ægrum utique, non morbum, jugulabant; per raro enim secundam sanguinis missionem toleravit, si modo ullam.

Tres tantum hac febre laborantes vidi, utpote tunc haud prospera valetudine gaudens, brevi domum petere cogebar: Sedulo autem pharmacopolas atque chirurgos de morbo percontans didici, sanguinem ab ægrotantibus detractum primo fuisse rutilum satis & valde fluidum, altera tamen vice missum lividum semper aut nigrum — Hoc ego ipse profecto notavi, imo vix concre-

tum

tum aliquid in sanguine cujusdam generosi, etsi diu ante extracto: Desideratus hic & a suis, & ab omnibus, die decimo tertio interiit stupidus, delirus, purpureis maculis & lividis pustulis aspersus.

Cui ignota sunt comitia *Oxonienſia* 1577, atque nupera apud *Taunton* anno 1730, ubi pestifera mephitis tot tantisque viris mox fuit exitio? — Perfrequens est utique generatio febris pestilentis in angustis immundisque carceribus; etiam ipse aër conclusus in fodinis, speluncis, puteis, tandem evadit exitialis admodum; idque longe citius si accedunt quoque plurima animalium *effluvia*, quæ & ipsa porro magis magisque in horas virulenta fiunt, brevique pestifera maxime *. — *Atmosphæra* stagnans, frequentia hominum polluta, mox valde rancet & ad respirationem inepta est prorsus: imo aquæ dulcis balneum forde cutanea fœdatum putrescit atque putet brevissime. — Nec mirum est hoc utique, quandoquidem a quolibet adulto homine uncia quadraginta fere rancidi vaporis quotidie exhalant.

Ocius hæc eveniunt omnia accedente calore; quo magis enim sales oleaque animalia attenuantur, & exagitantur tepore, eo magis ad putredinem vergunt — Putrescentium autem animalium corpora, maxime hominum, plus semper minusve noxium contagium dispergunt; magnas ideo post strages, putrescentibus nempe cadaveribus, febres pestilentes sæpius grassantur. — Carnis putrefactæ fœtor nobis est plane intolerabilis,

* Mirabilis sane est historia apud *Lancisium* (Lib. 1. Cap. 6. de repentinis mortibus) cujusdam juvenis, protinus extincti, dum effoderet quercum antiquam, cujus in caverna magna prægrandis serpens latitabat.

bilis, monente scilicet natura, ut hunc quam maxime vitemus — Profecto cum valde putidum expirant odorem ægrotantium corpora, a contagione summopere cavendum est; nam noxia admodum spargunt *miasmata*: id in *variolarum* maturatione præcipue notatur, tunc enim maxime fœtent, & longe longeque magis sunt contagiosæ, quam per initia morbi, ut omnibus notum est.

Purgandus est ergo frequenter, atque ventilandus, corruptus carcerum, navigiorum, ac *nosocomiorum* aër, ubi plurimi congesti sunt homines, ne longiore mora fiat pestiferus — imo & si sit aliquatenus pollutus fumis idoneis corrigendus est, quos inter utilissimus est aceti & camphoræ vapor.

Commodissima porro erit hæc aëris purgatio in ædibus privatis, ubi ægroti decumbunt*, apertis scilicet subinde fenestris, accensis focis, &c. inde namque non tantum illi, sed & ministrantes, puriorem respirabunt auram. — Memini equidem haud raro me fuisse gravitate capitis, nausea, languore valde affectum, dum per duas, tresve horas febre maligna laborantes visitassem, mox vero resectum prorsus obambulando in aëre aprico, aut equitando. Si hoc non datur acre acetum, camphora imbutum, olfacito subinde, atque expue sæpissime salivam.

Plena Luna 8. MAIO. Nova Luna 23.

Per *Maii* initia Eurus perflavit, isque fortis admodum, a 16. autem ad 24. Libs pluviosus *atmosphæram* humectabat plurimum, quæ fuerat ante siccissima. Non tantum agros irrigando gratissimæ fuerunt hæ pluvix, sed & insuper erucas per-

* Vid. Lib. de Febris, Dissert. de Variolis.

perimendo; grassabatur enim plurimum tunc temporis ista pestis herbarum. Porro maximum impendebat segeti nocumentum a novo quodam genere erucarum nigrarum (erant autem robustæ & prælargæ) hæ agmine vasto a montibus, torrentis ad instar, ruentes totos devastabant agros. Amœnissimus plane ac insolitus est telluris ornatus, flores infiniti!

Pluvia $\frac{''}{6}$. $\frac{'''}{7}$. 15. 16. $\frac{'}{17}$. 18. $\frac{'}{19}$. $\frac{'''}{20}$. 21 —
Dig. Dec.

24. 30 = 2.364.

Procella 4 E b S 4 — 5 E S E 4 — 6 Mane E S E 4_x. Halo quam maximus circa lunam 5. H. 9. p. m. E S E 4.

☿ Altitud. maxim. 1. 30, 2. Eb S 2. } media 29.6 $\frac{25}{30}$.
— — minim. 21. 29, 4. S W 3. }

Dies frigid. 5. 48. } media 38 $\frac{17}{30}$.
— tepid. 24. 32. S S W 2. }

Morbilli valde *epidemici*; *variolæ* & *peripneumoniæ* frequentes: *Tussis* & *asthma* per plurimos infestant, multi tabidi moriuntur; multi *Hydrope* laborant. *Febris* quædam *Catarrhalis* & *Rheumatica* passim proserpit, in qua lingua subatra est aut fusca & valde squalida, ora *aphthosa*, halitus teter, urina lurida, pulsus celer, mollis, submissus, crebro etiam *petechiæ* lividæ, tussis parva est, at magna præcordiorum oppressio — Mihi quidem videtur species quædam peripneumoniæ nuper maligne grassantis.

Plena Luna 7. JUNIO. *Nova Luna* 21.

Ne vel guttula pluviae decidit diem ad usque vicesimum *Junii*, aër interim fuit maxime siccus & cali-

calidus, ventus orientem inter & Arctum; post autem Auster haud parum pluviae demittebat.

Pluvia $\frac{''}{20.}$ $\frac{''}{21.}$ $\frac{''}{22.}$ $\frac{''}{23.}$ $\frac{''}{25.}$ $\frac{''}{26.}$ $\frac{''}{27.}$ $\frac{''}{28.}$ $\frac{''}{29.}$
Dig. Dec.

30 = 2. 020.

Permagnus halo circa lunam 3 H. 10. p.m. NN
E 2. Fulgur & tonitru 25 vesperi.

Altitud. maxim. 4. 30, 1. N E 2_x. } media 29. $6\frac{1}{3}$.
— — minim 26, 29, 3. S W b S 1. }
Dies frigid. 3. 32. N N E 2. } media 25.
— fervid. 13. 17. N 1_x. }

Morbilli sunt valde *epidemic*, & sæpe funesti, tussi admodum violenta consequente, ac febre quasi peripneumonica, quæ plurimos jugulat infantes. Ubi cuticula aspera fit valde & furfure velut aspersa quarto, vel quinto ab eruptione die, fausti est ominis; e contra ubi maculæ & papulæ luridæ sunt, aut lividæ, malum omnino — Febris putrida passim sæpe cum pustulis rubris ardentibus, sæpe cum permagnis *petechiis*.

Anginæ, pleuritides, peripneumoniæ, magis jam quam solent frequentes hoc anni tempore — *Ophthalmicæ* plures porro, & tumores capitis *erysipelatosi*. — Tussis vehemens *convulsiva*, non solum pueros sed & adultos etiam sæpe invadit, præcipue ad mensis finem — Multi canes rabidi discurrunt.

Plena Luna. 6. JULIO. Nova Luna 20.

Ad diem vicesimum quintum *Julii* tempestas frigida, atque plerumque pluviosa, vento fere quotidie variante, Cauro nunc flante, nunc Africo; aer fuit interim crassus ac multo humidior.

S

Pluvia

reticis, saxonaceis, deobstruentibus, chalybeatis, breviter optima & idonea medicina (quippe duos tresve medicos perdoctos consultabam) utebatur diligentissime — Multo hinc melius quod ad omnia fere se habebat, ni quod urinam parcam valde, turbidam & subnigram redderet usque. At per breves hæ induciæ! paulo enim post recrudescebant mala, adeo ut sub finem *Maii* redirent & icterus & ventris crurumque tumor; augebatur porro *Ascites* indies, in tantum utique, ut medio *Junio* decumbentem pene suffocaret moles aquarum, sursum nempe compulso septo transverso — Protinus ideo ad *paracenthesin* confugimus, quam firmo admodum animo perfert: detractus est feri subviridis, ad ignem concrefcentis congius quasi cum dimidio — Post duos, tresve dies se mire resectam percipit, imo redit brevi & stomachi & corporis vigor. Rus petit iterum, equitat alacriter, evanescit cutis flavedo, vividi sunt oculi, spiritus facilis. — Lætissima iam mihi spes salutis effulsit; sed enim quam vana! nam vix tribus exactis hebdomadis increvit rursus abdominis tumor ad molem enormem: iterum ergo emissæ sunt aquæ ad eandem fere quantitatem, sed ichorosæ, sed foetidæ, sed sanguinolentæ minimeque ad flammam coagulantes — Perstabat ex foramine *Trochare* facto, fluxus prælargus humoris subalbidus, purulenti, olidi, quo consumpta peribat optima matrona die *Julii* 27. — Sed quo me rapit dulcissimæ uxoris amor? — Ast! — *Quis desiderio sit pudor aut modus tam cari capitis?*

Ὀλύμπια δώματα ναίει — persequar ad astra.

Plena Luna 5. AUGUSTO. Nova Luna 19.

Per totum hunc mensem lætissima tempestas, prospera messis, optimum frumentum; aër fuit

ficcus admodum ac purissimus: ventus plerumque ab Oriente venit, sæpe haud parum calidus: maxima subinde roratio!

Innumerabiles vespæ, cicadæ, erucæ: multi canes rabiosi.

Dig. Dec.

Pluvia 16. 17. 26. 27 = 0.434.

☿ Altitud. maxim. 9. 30,1. E b N 1. } media 29,7 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$.
 — — minim. 16. 29,5. S 2^x. }

Dies frigid. 19. 34. E 2^x. } media 26 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$.
 — fervid. 3. 18. E 1. }

Morbilli adhuc epidemici, variolæ passim, cholera frequens: febres quædam intermittentes, quotidianæ ut plurimum: perpauci aliter morbi.

Plena Luna 3. SEPTEMBRI. Nova Luna 17.

Hic quoque mensis fuit plerumque ficcus, sed pro anni tempore valde frigidus, imo duodecimo mane glacies super plurima stagna, atque pruina maxima per agros; ventus ab Occidente sæpe vergens ad Austrum, sæpius tamen ad Septentrionem; a 16. ad finem Orientem inter & Septentrionem perflavit. Ob magnam ficitatem omnes fere fontes arescunt: maximæ rorationes sæpe ac pruinae.

Pluvia 2. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 14. 27. 28.

Dig. Dec.

29 = 1.402.

☿ Altitud. maxim. 18. 30,0. ENE 1. } media 29,6 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$.
 — — minim. 29. 29,1. N 2^x. }

Dies frigid. 12. 55. N b E 1^x. } media 41 $\frac{1}{2}$.
 — tepid. 1. 29. S W 2. }

Cholera, *ophthalmia*, *variolæ*, nec non febres putridæ passim: Juniores vermibus infestantur maxime.

Febr-

Febriculæ quædam levi cum angina quasi, tussi, dolore dentium fauciumque tumore frequentes valde: ex facili leni sudore discutitur, aut breviter mitiore *catarthico* fugatur. Haud dubio repentinum autumnii frigus fuit in causa hujus febriculæ, imminuta scilicet plurimum *perspiratione Sanctoriana*.

Morbilli epidemici, ac sæpe lethales, vehementissima tussis ut plurimum comitatur, unde haud raro peripneumonia suffocans sub finem, interdum spumofum atque sincerum sanguinem expuunt; hinc frequenter nimis cita mors aut certa *phthisis*. — *Diarrhæa* mucosa, perliquida, enormis *morbillos* sæpe subsequitur; inde abdomen durum & maxime tensum, at reliqui corporis summa macies, tandemque tabes funesta: idque semper fere, si atra dejiciuntur & valde foetida.

Optimum & tussis & peripneumoniæ remedium est opportuna sanguinis missio, ducta mox leni clystere alvo, imo blande purgata; *diacodio* interea licet compescere tussis sævitiam, acremque avertere distillationem admoto inter scapulas *epispastico*; *diætam* vero diluentem, mollem, omni carne vacuam instituere oportet. Sive derrepente recedunt pustulosæ maculæ, sive lividæ aut plumbeæ quasi evadunt, mox oritur summa præcordiorum oppressio, anxietas, delirium, &c; tali in casu linteis, aut pannis calidis protinus confricandum est totum corpus, porro ad *cardiaca* idonea confugiendum est, qualia sunt *Lap. de Goa*, *crocus* anglicus, *moschus*, *camphora*, ex *Julapia* temperato, aut vino tepido; nec utique novi meliora, nedum tutiora ubi *morbilli* evanescent, aut minus vividi spectantur. Erumpentibus *morbillis* ab aëre frigido madidisque sudore indusiis summopere cavendum est, his enim cre-

berrime reperiuntur *exanthemata*; neque interea æstuoso in aëre continendus est æger, nec stragulis nimium onerandus, nam & spirandi difficultatem adaugent, & sudores immodicos eliciunt, præcipue in adultis, quo nihil pejus — Facessentibus porro *morbillis diarrhæa* ingruit sæpissime: hic summa opus est cautela, nec sane præpropere sistenda est; porrige subinde modicam *rhabarbari dosin* cum nuce *Moschata* tosta, Decoct. C. C. C. — *Oryzæ* — *Fracastorii*; & misturam absorbentem aliquam ex Corall. rubr. lævig. Bolo Armena & Aq. Cinnam. tenui confectam exhiberi jubeo.

Plena Luna 3. OCTOBRI. *Nova Luna* 17.

Magna iam incipit cœli mutatio, plurima nempe ruente pluvia, furente quoque procella, & per initia, atque mensis exitum: medio tamen apricitas, Borea plerumque flante a 15. ad 22: *Atmosphæra* multo fit crassior ac humidior.

Pluvia $\frac{''}{2.}$ $\frac{'}{3.}$ $\frac{''}{4.}$ $\frac{''}{5.}$ $\frac{''}{6.}$ $\frac{''}{7.}$ $\frac{''}{8.}$ $\frac{''}{9.}$ $\frac{''}{10.}$ $\frac{''}{13.}$ $\frac{''}{14.}$

16. $\frac{'}{17.}$ 25. $\frac{'''}{26.}$ 27 — 29. $\frac{'''}{30.}$ $\frac{'''}{31.}$ Grando 3. Dig. Dec.

27. 31 = 4. 960.

Maximus maris æstus & procella vesperi 2. W S W 4 procella 3 primo mane & a. m. N W 4, Nox procellosa 5. W S W 4_x item 7 S S W 4_x — porro 26 W N W 4. Procella cum fulgure 27. primo mane — 29. Nocte S W b W 4 — 30 S W b W 4 — 31. p. m. S S W 4. Glacies 20. 21. 29.

☿ Altitud. maxim. 22. 30, 2. E N E 1^x . } media 29, 6 $\frac{4}{31}$.
— — minim. 3. 28, 8. N W 4. }

Dies frigid. 28. 59. N N W 2. } media 47 $\frac{10}{31}$.
— tepid. 10. 40. S W 3. }

Rheuma-

Rheumatismus & *diarrhæa* frequens, *dysentericæ* quædam: *raucedines*, faucium asperitates ac tumores plurimos vexant. *Variolæ* passim multæ adhuc, eæque sæpe malæ admodum indolis, *petechiis* scilicet lividis haud raro comitantibus: imo ipsi morbilli livescentes, jam multo plures jugulant quam *variolæ*, præsertim adultos, qui universa quasi *necrosi* pereunt anhelii, suffocati, stupidi prorsus. — Nil lætius evenit, abeuntibus *morbillis*, quam rupta & aspera valde cuticula.

Plena Luna 1.

Nova 16.

NOVEMBRI. *Plena Luna* 30.

Pluviosus fuit admodum & frigidus hic mensis, crebro etiam nimbosus: incipiente *Novembri* ventus ab Occidente venit, a decimo autem ad finem usque ab Oriente, flectens plerumque ad Septentrionem, aliquando tamen interfuit Vulturnus — Aër per totum gelidus, caliginosus, humidus — *Barometri* statio humilis.

Pluvia $\frac{iii}{1.}$ 2. $\frac{i}{4.}$ $\frac{i}{5.}$ $\frac{i}{6.}$ $\frac{i}{7.}$ $\frac{ii}{8.}$ $\frac{i}{9.}$ 11. $\frac{iii}{13.}$ $\frac{iiii}{20.}$ $\frac{v}{21.}$

22. 23. $\frac{iiii}{25.}$ $\frac{iii}{26.}$ 29. 30. Grando vehemens

Dig. Dec.

1. Nix 16 = 5. 267.

Procella 1 p. m. & insequente nocte S W. 4x.]

———— 10 nocte E 4x — 25 nocte S E 4x:

— vehemens 30 primo mane E S. E 4x.

Rigidum gelu 15. 16. 29.

✂ Altitud. maxim. 28. 30,0. N E 1. } media 29.3 $\frac{1}{2}$
— — minim. 23. 28,7. E S E 3. }

Dies frigid. 29. 68. N N E 1. } media 59 $\frac{1}{2}$.
— tepid. 1. 53. S W 4x. }

S 4

Idem

Idem usque dominantur morbi, atqui distillationes Coryzæ, tusses, *rheumatismi* multo sunt inferiores.

DECEMBRI.

Sæpe Boreas, sæpe hoc mense perflavit Vulturnus, unde *Baroscopii* statio fuit præalta, a 18. ad 22. intervenit Libs decidente pluvia — nec tamen hoc detrufit *Mercurium*, altior quinimo surrexit, adeo ut 22. gradum 30. 4. attigerit; quod quidem haud parum mirabar, sed *atmosphæra* erat crassissima, & Eurus mox prævalebat per dies aliquot — Sub finem tamen Libs recurrit. Acre sæpe gelu incipiente mense, a 12. ad 17. asperrimum.

Pluvia 18. ^u 19. 20. 23. 27. ^u 28. 29. ⁱ 31.

Dig. Dec.

Nix 3. 7. = 1. 342.

Ventus vehemens 14. 16 E N E 4_x. Procella 28. Mane S W 4_x. Circius furens 30 p. m.

⌘ Altitud. maxim. 22. 30, 4. S S W 1^x. } media 30, 0 ⁵/₃₁.
— — minim. 29. 29, 6. S W 3^x. }

Dies frigid. 15. 76. E N E 2^x. } media 6 3 ¹/₃₁.
— tepid. 31. 51. S W 3. }

Cita ac torminosa alvus multos adhuc exercet, imo interdum etiam cruenta: *Asthma* grave plures premit — tusses, raucedines, colli tumores & levis angina plurimos. *Variolæ* passim, *rheumatismi* multi. Peripneumoniarum aliquæ; & febres lentæ putridæ.

Tota pluviae quantitas anno MDCCLII.

Dig. Dec.

= 25. 783.

Nova Luna 14. JANUARIO. *Plena Luna* 28.

Densa fuit admodum ac humida, toto fere mense, *atmosphæra*, plerumque etiam frigida, *Barometri* statio interdum præalta, a magna partim aëris densitate. Ventus initio ab Occidente spiravit, a nono autem ad decimum octavum ab Oriente, declinans ad Septentrionem, isque frigidus & glacialis; inde Libs multo tepidior.

Pluvia $\frac{u}{1.}$ 2—4. $\frac{u}{5.}$ 7. 8. 10. 19. 24. $\frac{u}{25.}$
Dig. Dec.

26. 28, 31. Grando 6 = 1.512.

Magna *AB.* 12. H. 8. p. m. Nebula valde fœtida 22 Malacia. Procella 5 tota fere die W S W 4—26 p. m. & per noctem S W 4_x.

♀ Altitud. maxim. 11. 30,7. ENE 1. } media 29.9 $\frac{20}{29}$.
— — minim. 26, 29,3. S W 4_x. }
Dies frigid. 21. 69. NNE 1. } media 59 $\frac{22}{29}$.
— tepid. 7. 52. S. W. 3. }

Variolæ adhuc passim: *Rheumatismi*, pleuritides, tussis plurimæ; angina mucosa, tumores faucium dentiumque dolores frequentes; Febres aliquæ lentæ — Cervi perplurimi pereunt undique.

Nova Luna 13. FEBRUARIO. *Plena Luna* 27.

Crassa perstat & humida *atmosphærae* constitutio, est autem paulo tepidior, ventus incertus valde, variat fere quotidie; Corus tamen prævaluit!

Pluvia $\frac{u}{1.}$ 2. $\frac{u}{3.}$ 4. 6. 9. $\frac{u}{11.}$ 13. 14. $\frac{u}{15.}$ 22.
Dig. Dec.

23. 25. 27 = 1.584.

Procella & fulgura 3. p. m. S W b W 4.

S 5

♀ Altitud.

☿ Altitud. maxim. 8. 30,2. N W b W 1. } media 29.8½.
 — — minim. 3. 29,3.
 Dies frigid. 20. 64. N E 1. } media 54½.
 — tepid. 9. 51. W 1.

Febris *catarrhalis* & *variolæ* passim, tussis innumeros infestat cum tumore faucium, tonsillarum, & levi sæpe angina: febres aliquæ tertianæ. Tempestas fane est parum morbofa; atqui plurimi etiam seniores lumbricis rotundis vexantur.

Fœdissima scabies adhuc inter equos, quæ diu jam duravit.

Nova Luna 14. MARTIO. *Plena Luna* 28.

Frigidus succedit *Martius* aërisque temperies multo ficcior; ineunte mense malacia crebra, exeunte vero nimbofa tempestas *Barometrum* depri-mens plurimum; a 7. ad 21. ventus aquilonius & gelu subinde.

Pluvia 1. 3. 6. ⁰11. 13. 22. ^{III}25. 26. ^{III}27. 28.
¹29. 30. Nix & grando 7. ¹10. 11. 23. 25. 30.
 Dig. Dec.

= 2.946.

Maxima AB. 8 Vesperi N N E 1. Nubeculæ lucidissimæ sequi videntur venti cursum.

Procella 25 S W 4. — 26 a primo mane per totam diem S W b S 4, at vesperi & durante nocte circius vehementissimus — Turbo gravissimus 28 ab hora 5. p. m. ad 9. W N W 4^x.

☿ Altitud. maxim. 15. 30,2. N b E 1. } media 29.6⅔.
 — — minim. 26. 28,8.
 Dies frigid. 8. 66. N N E 1^x. } media 55⅔.
 — tepid. 5. 51. Malacia

Variolæ frequentes, Febres intermittentes plures & quotidianæ & tertianæ. *Rheumatismus*, nec non

non tormina passim; tusses ubique. Gravedines, dolor dentium, capitis & tonsillarum tumores cum asperitate faucium multos molestant.

Scabies foedat equos maxime, extrema macie confecti plures pereunt, aliqui angina atque tussi suffocantur.

Nova Luna 13. *APRIL.* *Plena Luna* 27.

Pars prior *Aprilis* fuit valde frigida, posterior tepida fatis; ventus ab Septentrione undecimum diem adusque, sæpe cum nive, grandine, gelu: a 13. ad 17. orientalis, post varius; plerumque tamen e plagis australibus.

Pluvia 1. $\frac{1}{4}$. 5. 8. 11. 13. 14. 18—21. $\frac{1}{23}$.
 $\frac{1}{25}$. $\frac{1}{26}$. 27. 28. Grando 1. 4. 5. Nix 2. 5. 6.
 Dig. Dec.
 = 1.662.

Levis *AB.* 1. H. 8. p. m. N b E 2. Fulgur & tonitru 21. nocte, *Circius* vehemens 22.

☿ Altitud. maxim. 6. 30,1. N 1. }
 — — minim. 26. 29,3. S S W 3. } media 29.7 $\frac{5}{29}$.
 Dies frigid. 2. 64. N 2^x. }
 — tepid. 30. 35. S S W. 2. } media 49 $\frac{21}{29}$.

Variolæ adhuc; multæ febres intermittentes*, tertianæ potissimum: Pleuritides & peripneumoniæ plurimæ: Febris putrida passim cum eruptione *miliari* rubra plerumque; omnes fere levi angina per initia corripuntur, sub finem cuticula multum desquamatur.—Plures tabidi moriuntur.

Dysenteria cruenta multos, inter popellum præcipue, perimit, vermes teretes fere semper ejiciun-

* Vid. Lib. de Febr. Cap. H.

ejiciuntur, etiam ab adultis, imo & a senioribus. Nescio pol unde, sed per plures jam menses juniores, nec non ætate provectos, longe magis infestaverunt vermes quam memini unquam. An ab immensa copia fructuum omnigenorum, quæ undique per æstatem & autumnum anni 1742 maxime scatebat? his certe utitur nimium vulgus semper cum abundant, imo & abutitur; quippe cerasa, pruna, poma perpetuo devorat.

Maxime sæviit hæc *dysenteria* in oppido *Plimton*, ejusque vicinia, solo scilicet pingui & uliginoso, morbisque plus fatis obnoxio, febribus lentis præsertim & intermittentibus: duravit autem ab initio *Aprilis* ad *Maii* finem. Huic plerumque accessit febris, rectius fortasse dicerem hæc fuit ipsius febris *symptoma*; nam ab ipso sæpe principio, atque ante ulla tormina, haud levis urgebat febriculofus ardor cum pulsu incitatore, ac lingua scabra; quid quod & sæpissime cum manifesto satis horrore ingruerat morbus, & non raro utique more *hemitritææ* cursum tenebat—Haud certe scio an fuerit febris *epidemica*, mox describenda, ad intestina translata: hoc sane mihi compertum est, *dysenteriam epidemicam* non esse frequentem veris sobolem*.

Ut ut fuerit, aderat semper febris plus minusve, sanguinem ideo plerumque incipiente morbo detrahi curabam, ne gravior foret intestinorum inflammatio, indeque acerbiora tormina, certiorque demum gangræna—Urgebant semper per morbi initia nausea & vomitio; monitis adeo naturæ obsecundans nunquam non ventriculum elui

* (Δυσεντερία) γίνεσθαι δεύτερος ὥρη, δεύτερον φθινώρον, ἥσαν ἦρος ἡνίστα χειμῶνος. *Aret. Cappad. Cap. de dysenteria ad finem.*

elui jubebam, dato *ipecacanhæ* decocto aut infusione, epoto mox affatim oryzæ aut pulli jusculo. Hoc peracto porrigendum est *rhabarbarum* subinde cum liberali, diluente & demulcente potione, qua lenitur acrimonia humorum & in sanguine & in visceribus, dum *rheum* acrem expellit colluviem. Ita sane necessaria est lenis alvi purgatio initio omnis *dysentericæ*, ut si hæc omittatur, astringentia vero & *opiata* præpropere dantur, mox gravissima accedant tormina, stomachi ægritudo, singultus, *aphthæ*, tandemque intestinorum *sphacelus*, quem cita mors excipit—Hoc equidem monitum in *dysenteriis* curandis perpetuo observari debet; in hac autem, de qua nunc agitur, pernecessarium est utique, quia procedente morbo lumbrici fere semper ejiciuntur. Quid sperandum hoste in imis visceribus hærente? Quid si hostem calomelano expugnes? Hoc feci hercle sæpius, nec pœnitendo certe eventu, quinimo læta sæpe reportata victoria.

Non ita tamen purgantibus insistendum est, quasi nil ultra desiderat morbus; tormina namque *anodynis* subinde sopienda sunt, nimiusque porro fluxus humorum est cohibendus; interea corroboranda sunt etiam intestina—facit ad hæc omnia commode satis *confectio*, ut dicitur *Fracastorii* (præcipue nuce *Myristica* tosta, aut Cinnamonomo adjecto) si debita exhibeatur *dosi*, & si sit necesse, *extracto Thebaico* adjuta. Decoct. C. C. C. aut lac dulce cum aquæ fontanæ duplo & cinnamomi paululo coctum, aut serum lactis tenuissimum, in quo ferrum ignitum sit extinctum, forbenda sunt subinde. Si bilis acris abundet, si *dysenteria* sit valde cruenta, & sinceri sanguinis plurimum dejiciatur tinctura Rosar. rubr. probe acicula juvat, aut vinum rubrum austerum dilutius

—Ple-

—Plerumque, sub morbi finem, exeruciat maxime gravissimus quasi intestinorum descensus, & perpetuus desidendi conatus; hoc nihil æque levat ac *diascordium*, aut theriaca Andromachi, ex lacte dulci, aut decocto albo, clystere data. Sed de morbo *dysenterico* mox plura.

Sub finem *Aprilis* per omnem hanc regionem grassata est febris quædam levis plerumque, interdum vero haud parum truculenta, senibus & pueris pulmonariis. — Simul & semel innumeros corripuit horrore quodam vagante, & gravitate capitis, mox quoque dolor ejus accessit, artuumque porro & dorsi, plurimos tamen universa quasi lassitudo molestavit. Protinus maxima fuit destillatio acris per oculos, nares, fauces, sæpiissime etiam in pulmonem, unde sternutamenta fere perpetua, ac vehemens plerumque tussis: omnibus adfuit pectoris quædam strictura, & gravitas permolesta. Secundo adeo die invaluit febris, pulsusque multo citatior factus est, aucta quoque spirandi difficultate, præcipue si sanguinis missio fuerat neglecta. Sitis utique non admodum urgebat, at lingua erat peralba, veluti cremore lactis suffusa: oculi leviter inflammati, atque in ima orbita dolentes, lumina refugiebant.

Non uno tenore processit febricula, sed nunc algor, mox ardor incescit, nullo prorsus servato ordine; cum eo tamen ut haud raro tandem in tertianam aut semitertianam * facesserit. Erat autem ominis multo peioris *peripneumonia* **, seu *pleuropneumonia*, quæ quidem ob sanguinis abundantiam, atque tussis vehementiam accedebant interdum, his præsertim, qui calidiore regimine & medicina usi fuerant: nec infrequens, eandem ob

* Vide Libr. de Febr. l. c.

** ibid.

ob causam, erat pleuritis aut *rheumatismus* acutus, præcipue neglecta sanguinis missione, ineunte morbo.

Sanguis extractus fuit nonnunquam valde glutinosus, plerumque tamen floridus, at non multo sero scatens; varius autem fuit in variis, quo magis ardebat febris, utique eo tenacior: qualiscunque vero visus est sanguinis status, haud magnum ejus dispendium ferebat hic morbus; imo, si vel peripneumoniæ aliquid subesset minime largam sine maxima virium ruina, raro plus vice simplici venæ sectionem tolerabat: nec in hac solum, sed in omni febre *catarrhali epidemica*, hoc fere perpetuum notavi; namque minuendo naturæ vires nimium *perspirationem* inhibet, indeque acrem auget colluviem. — Aliqua tamen sanguinis missio, ipso morbi initio, in robustis adultis, laute viventibus, *plethoricis*, juvat semper.

Per totum febriculæ decursum sputabant largissime, quod pectori levamen erat maximum; tussis autem importunitas haud leviter *tracheam* atque pulmones exasperabat; oleum ideo amygdalinum, *sperma ceti*, imo & papaveris aliquid, *diacodium* puta, *tinctur. Thebaic.* aut *Elixir paregoricum* desiderabat: Ultimum hoc porro utiles blandosque sudores movebat, nec interea gravabat pectus. Frequenter equidem pulmonum gravitas & præcordiorum oppressio *Oxymel Scillitic. Lac Ammoniac. Syrup. Croci*, aut tale quid deposcebat — atqui, hoc in casu, fuit instar omnium fere lene *emeticum*; quod quidem, mox post venæ sectionem, totum hoc sæpissime discussit, & non uno solum nomine opem tulit.

Pars ægrotantium longe major faciles, æquales, benignos habuere sudores secundo, vel tertio die,

die, qui, una comitante exspuitione larga, febrem quinto profligarunt, sæpe etiam citius, manente tamen ut plurimum haud parvo virium languore — Hæcce autem nihil promovit felicius quam diluens, demulcens, tepidus potus; serum nempe lactis dilutissimum, hordei, aut avenæ, aut conditi Eryngii decoctum; hederæ terrestris, tussilaginis, *glycyrrhizæ*, infusio; imo per plurimis *Coffe* potus profuit maxime cum lactis dulcis pauxillo — Apagæ vero *sales spiritusque*, ut vocant, *volatiles*, calida *alexipharmaca*, & id genus alia, quæ turbant certe plurimum, parum vero utiliter exturbant morbum. — Cæterum febrem, acrius atque diutius inhærentem, *haustu salino communi* * moderabar.

Crebro autem sub febriculæ finem multæ, rubræ, urentes pustulæ erumpebant, sæpe repentina, imo & profusa diarrhæa accedebat sævis interdum cum torminibus, facta nimirum morbosæ materiæ ad intestina *metastasi* — Hinc forte & *dysentericæ* plurimæ, quæ & hic quoque tunc temporis passim grassabantur; mucosæ fateor, raro cruentæ — Adeo temen parum cohibendus erat hic sese levandi naturæ conatus, ut per alvum sæpius sponte faceretur morbus; atque ideo Manna, *rhabarbaro*, *tartaro solubili*, *tamarindis*, &c. promovendus: fortiora tamen purgantia horrenda plerumque excitabant tormina viresque penitus disjiciebant.

Febris hæcce, utcunque longe lateque maximè vulgaris, paucis fuit exitio; quandoquidem tertio ut plurimum quartove die evanuit, modo se recipere mature ea correpti — Res fuit hercle *diætæ* potius

* Vid. supra mense *Junio* 1743.

potius accuratæ, ac debiti regiminis, plerumque quam medicinæ elaboratæ; non quod non interdum multo plus curæ atque diligentia poposcit. Sudores æquales, at moderati, sputa multa, facilia, urinæ largæ, lutulentæ facile sublevabant morbum: mirabar sæpissime immensam urinæ subsidentiam; qua tamen nil auspiciatus.

Eadem prorsus videtur hæc febris, quæ per totam Europam, hoc vere, sub nomine *Influenza* grassata est: apud gentes tamen australes longe magis quam hic fuit pestifera; quinetiam & apud Londinenses ipsos funera auxit maxime, imo uno duntaxat hebdomade ad mille saltem.

Nova Luna 12. MAIO. *Plena Luna* 27.

Sicca fuit admodum, perpulchra & calida *atmosphæra* diem adusque vicesimum secundum; Boreas perpetuus ad xvii, inde Vulturnus, post xx Libs pluviosus.

Pluvia 16. 20. 22. 23. 25. 26. 27. 28. 29.
Dig. Dec.

30 = 0.866.

Fulgur & tonitru e longinquo 20 p. m. levis procella 27 nocte S. Wb S 4x grando 30 — ♂ & ♀ conjunctissimi sexto die H. 11. p. m. adeo ut unum tantum planetam quasi exhibeant.

♀ Altitud. maxim. 8. 30, 1. N E 1. }
— — minim. 21. 29, 2. S S W 2. } media 29.6 $\frac{24}{27}$.

Dies frigid. 1. 36. Malacia. }
— feryid. 7. 22. N N E 1. } media 30 $\frac{13}{27}$.

Plurimi *apoplexia* correpti sunt, & plures erepti, nec hic tantum sed & aliis in locis: an ab enormi, ac intempestivo æstu sanguinem subito nimis expandente? Febres quotidianæ & tertianæ
T creber-

creberrimæ longe lateque; *variola* & *morbilli* passim. — Tussis ferina * frequens & pertinax maxime, sæpe post *morbillos* funesta — Fugat hanc optime modica sanguinis detractio, & levis alvi purgatio, confert rusticatio, frequens equestatio, atque accurata & lenis *diæta*; ubi parum hæc proficiunt, medicamenta ex argento vivo præparata & *cortice peruviano* raro fallunt, quoniam lentorem attenuant sanguinis, & vermes pellunt, qui jam diu per plurimos maxime sunt infesti, nec cedit plerumque tussis nisi his ejectis: — Haud raro prodest balneum frigidum, ubi omnia incassum exhibita fuere: cave tamen ne adsit febricula, vel hæmoptoe.

Dysenteria cruenta, aut mucosa, sævit maxime apud *Plimton* & vicinitatem: per plures lumbricos dejiciunt, nec tamen inde multum levantur; imo sæpe haud multo post frigido sudore correpti mox animam agunt: credo quod *gangræno*sa sanies fœdos hos inquilinos expellit: unaque cum his exeunt interdum carunculæ lividæ, foetidissimæ, haud dubia utique signa *sphaceli* intestinalium. **

Venæ sectionem, quam superiore mense ad *dysenteriam* consului, jam etiam magis necessariam invenio ipso protinus morbi initio, ob magnum sane & insolitum tempestatis calorem: turgescit enim inde quamplurimum rarefactus sanguis, atque majorem excitat inflammationem. — Vix unquam utique datur *dysenteria epidemica*, ubi intestinalia non sunt, aliquo saltem gradu, inflammata — Ubi autem viget inflammatio, ibi recte semper mit-

* Consule quæ dixi de Pertussi puerorum, Vol. I.

** Ἡν ὑπὸ δυσεντερίης ἐχομένῳ οἷον σάβης ὑποχωρήσῃσι, θανάσιμον. *Hippocr. Aph.* 26. Sect. 4.

mittitur sanguis quamprimum; vires, ætas, pulsus, constitutio & anni & ipsius ægrotantis modum statuunt.—Movenda dein est leniter alvus (deterſo prius ventriculo, ſi nausea & vomitio urgent) blandis tamen ſemper purgantibus utendum eſt, quæ namque ex aloe, ſcammonio, aut colocynthide confecta ſunt, in hoc morbo toxica ſunt prorſus, non remedia—Omnium ſane optimum eſt rhabarbarum, quod exhibendum eſt ſæpius (toſtum id ſemper ſi ab Indis venit orientalibus) cum nucis moſchatae aut cinnamomi pauxillo—Tinctura hujus ex vini ſpiritu, utpote refinosa nimis, parum proficit; longe melior eſt quæ vino rubro extrahitur.

„Adeone vero purgandum eſt, ſi cruenta ſit alvus & perliquida? etiam; acris etenim inteſtinorum colluvies ſit longiore mora acrior longe, vellicatque multo magis, unde majorem excitat inflammationem, ipſumque adeo auget morbum.—„At ſanguine tincta eſt alvi proluvies—ſit ita; „nocetne modica ſanguinis exſpuitio in pulmonum inflammatione; nonne hæc ſæpiſſime, ſub certis conditionibus, morbum expedit?—Si alterutrius *meſentericæ*, aut *cæliacæ* arteriæ ramuſculi, inteſtinorum tunicas perreptantes, obſtruuntur, facta reſolutione, facta coctione, obſtruens materia ſæpiſſime in cavo inteſtinorum funditur; ſolvitur adeo obſtructio, ſolvitur inflammatio, ſolvitur morbus—dolentes, inflammatae *hæmorrhoides* internæ ſanguinem frequentiffime emittunt: an periculo eſt hoc ægrotanti, an levamento?—Si ſit igitur alvus moderate tantum cruenta, nihil horreſco; leni eluo potione irritantem acrimoniam, imo & corruptam blande expurgo colluviem, quæ cito aliter exulcerata facit inteſtina, tandemque *ſphacelata*, cujus ſigna ſunt certiffima ventris pro

T 2

luvies

lucies atra, oleosa, foetidissima cum lividis carunculis, sudores frigidi, singultus, delirium. Porro singulare quoddam in hoc casu nonnunquam observavi, *symptoma* semper lethale, urinam nempe limpidam, at parcam valde; id præcipue in perbono quodam hujus oppidi sacerdote, cui primo nausea, vomitio, alvus torminosa atque cruenta valde levi cum febre, lingua perarida, urina fere nigra: die quinto omnia magis pacata, sexto tamen recrudescebant tormina, dejectio atra saniosa cum grumis quasi carnosus horrendi foetoris, urina perparca, frequens autem, at prorsus limpida, etsi *rhobarbarum* assumpserat quotidie; mox adeo singultus, leve delirium, sopor nimius, tandemque nono, finis omnium malorum, mors. Hic utique intestina ita *sphacelata* videbantur, ut nil omnino ad sanguinem transmitterent.

In nullo sane morbo magis necessaria est diluens & demulcens potio quam in *dysenteria* — in hac utique pura puta aqua fontana haud parum pauperculos juvabat, qui ad fontem quendam sacrum, si diis placet, & *antidysentericum*, confugere — innocuus saltem erat & purissimus, multoque magis nomen *aquæ vitæ* meruit quam *spiritus vini ardens*, hoc titulo celebratus, quo se nimium sæpe in hoc morbo popellus abutebatur. Aquæ bene frigidaë potionem commendat vel ipse *Celsus*, * si vetus vitium est; atqui inter initia egellidam suadeo, quippe quæ & intestina eluit melius, & per *meseraica* vasa & *lacteæ* ad sanguinem diluendum transit facilius: cum vero elota sit acris viscerum colluvies, ea tunc firmanda sunt, adeoque tunc haud perperam exhibetur frigida — hac sola utique, opii pauxillo adjecto, nonnunquam *dys-*

* *Cels.* Lib. 4. C. 15.

entericæ curationem consummavi, probe purgatis prius intestinis — Non multum equidem probo oleosa & glutinosa; si horum aliquid, derasis ac mucos naturali privatis intestinis, desideratur decoct. alb. Emulsio Amygdalina cum Gum. Arabic. mucilago Semin. Cydonior. exhibeantur; in victu porro Gelatina C. C. cum Icthyocolla, Salop, Panatella, aut id genus alia.

Sed hæc de *dysenteria* obiter — Nunc quid febris *epidémica* facit, videndum est — Sane grassatur usque plurimum, jamque frequenter plus habet *peripneumonice* indolis, interdum magis ad putridæ naturam accedit; in alterutro casu sanguis emissus parum videtur viscosus, etiam licet pectus haud parum opprimatur — hanc porro febrem nunc comitantur magna faucium asperitas, quandoque ipsa Angina — Statu morbi frequentes pustulæ urentes erumpunt, faustæ semper, sequiturque permagna cuticulæ desquamatio: rarior autem jam adest *diarrhæa*, multoque, si accedit, levior est; calida namque tempestas magis nunc ad extra evocat humores, adeoque pars longe major ægrotantium blando, at universali, oborto sudore mox facile liberatur; atqui plures febre quadam intermittente corripiuntur* — Quotidianæ certe & tertianæ febres jam ubique regnant; exeunte atamen mense *catarrhalis epidémica* fere penitus accessit.

Nova Luna 11. JUNIO. *Plena Luna* 25.

Siccus quoque, & calidus ut plurimum, fuit hic mensis, medio tamen interfuere duo, tresve dies perfrigidi; spiravit Aquilo frequenter, sub-

T 3

folanus

* Vid. Lib. de Febr. l. c.

Solanus interdum, Auster raro, aliquando ventus
siluit prorsus: exeunte mense rorationes maxi-
mæ — Stupenda pruina, imo ipsa glacies xiii. pri-
mo mane, idque per totam fere Angliam.

Pluvia 3. 5. $\frac{1}{10}$. 12. 13. $\frac{1}{14}$. 15. 17. 26.
Grando 13 meridie cum fulgure & tonitru.
Dig. Dec.

= 0.838.

Procella, fulgur, & tonitru 14 nocte — Ful-
gur & tonitru primo mane 26 — Levis AB. 28.
nocte N 1.

✕ Altitud. maxim. 6. 29,8. N b E 1.	} media 29,6 $\frac{5}{8}$.
— — minim. 3. 29,3. S 1.	
Dies frigid. 13. 46. N b E 1.	} media 28.
— fervid. 7. 20. E 2.	

Variolæ adhuc & *morbilli*, tussis convulsivæ plu-
rimæ: febres putridæ & *peripneumonicae* passim, in-
termittentes vero, tertianæ poissimum, *epidemi-*
cæ *; tussis, tumor, ac faucium asperitas, permul-
tos molestat.

Nova Luna 10. JULIO. *Plena Luna* 25.

Frigidus insequitur *Julius*, atque ideo, quod
solet plerumque, pluviosus; sæpe Libs turbidus
frenuit. haud raro Vultur, *atmosphæra* hinc
valde spissata est ac humidata.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 4. 5. $\frac{1}{6}$. $\frac{1}{7}$. 8. $\frac{1}{9}$. $\frac{1}{10}$. 11. 15. $\frac{1}{17}$.
Dig. Dec.
18 — 20. $\frac{1}{21}$. $\frac{1}{22}$. 23. $\frac{1}{25}$. 30. 31 = 2.866.

✕ Altitud. maxim. 29. 29,8. N W b W 1.	} media 29,4 $\frac{1}{2}$ $\frac{5}{8}$.
— — minim. 7. 29,0. S W 3 _x .	
Dies frigid. 10. 38. S E b E 2.	} media 32 $\frac{1}{2}$ $\frac{5}{8}$.
— fervid. 21. 25. S W 1 _x .	

Vario-

* Lib. de Febr. l. c.

Variolæ sparſæ adhucdum. Febres intermittentes plurimæ, præcipue tertianæ*; perpauci cæteroquin morbi.

Frigida fortasse craſſaque atmophæræ intemperies hyemis, ac veris elapſi, plurimum congeſſerat ſeroſi lentoris, qui pro variis hominum temperamentis, nunc febrem intermittentem, nunc catarrhalem, nunc putridam induxit.

Nova Luna 8. AUGUSTO. *Plena Luna* 24.

Favente Deo longe felicior eluxit *Augustus*, lætamque produxit meſſem: Tempeſtas fuit ſæpe fervida valde, atqui dum agros torret canicula, herbæ vberriſimo rore foventur. Ventus ab Oriente plerumque ſpiravit, ſæpe vero deflexit ad Arctum, Libs rarus, Malacia frequens.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 2. $\frac{u}{5}$. 6. 15. 19. 20. 29. 30.
Dig. Dec. = 0.700.

Fulgur, tonitru, & graviffima pluvia apud *Launceſton* 17 p. m. — hic etiam fulgur, tonitru, & pluvia 29 nocte.

§ Altitud. maxim. 23. 29, 9. NN E 1. } media 29.6 $\frac{1}{2}$ $\frac{7}{8}$.
— — minim. 5. 29, 3. SW 2^x. }
Dies frigid. 29. 34. E SE 2^x. } media 27.5 $\frac{5}{8}$.
— fervid. 9. 19. E 1. }

Variolæ ac morbilli paſſim, multæ adhuc febres intermittentes ruri; apoplexiæ aliquæ, & cholæræ: pauci admodum ægrotant.

Nova Luna 7. SEPTEMBRI. *Plena Luna* 22.

Durat uſque perpulchra & maxime ſicca tempeſtas,

T 4

* Libr. de Febr. l. c.

pestas, quin & saluberrima *: Fontes & rivuli pene exarescunt penitus, at immensa vis roris decidit quotidie. Ventus fere perpetuus ex Oriente, intercurrente tamen nonnunquam Aquilone, Austro rarissime.

Dig. Dec.

Pluvia 2. 5. 6. 8. 16. 17 = 0.250.

♀ Altitud. maxim. 24. 30,0. E N E I. } media 29.8.
— — minim. 5. 29,6. S I.

Dies frigid. 30. 48. N E I. } media 36.
— calid. 19. 30. E b N I.

Ineunte mense haud pauci febre quadam anginosa correpti sunt, quæ paulo post more *pneumonico* pulmones invadebat, magno interdum cum ægrotantium periculo. *Asthma* frequens, scabies undique, paucissimi aliter morbi.

Nova Luna. 6. OCTOBRI. *Plena Luna* 22.

Pluviosa tempestas ingruit, citoque pede irruit hyems, crassus hinc fit aër & humidus. Initio mensis Corus prævaluit, a x. ad xiv. frigidus Boreas, tunc Vulturnus, pauloque post nimbofus Auster.

Pluvia $\frac{1}{3}$. 4. $\frac{III}{6}$. 7—9. 15—17. $\frac{1}{18}$. $\frac{1}{20}$. 21.

Dig. Dec.
 $\frac{1}{22}$. $\frac{1}{23}$. $\frac{1}{24}$. $\frac{II}{25}$. $\frac{III}{26}$. $\frac{III}{27}$. 29. 31 = 3.658.

Levis procella 16 S E b S 4_x—23 Vesperi S S W 4_x—Vehemens 23 media nocte S E b S 4^x—gravis tota die 25 S 4. Amplissimus & subluteus halo circa Lunam 19. H. 8. p. m.

♀ Altitud. maxim. I. 30,0. N I. } media 29.5 $\frac{1}{2}$ $\frac{6}{8}$.
— — minim. 25. 29,0. S 4.

Dies

* — οἱ ἀνχοὶ τῶν ἐπομβριῶν εἰσὶν ὑγιεινότεροι. Aph. 15.
Sect. 3.

Dies frigid. 14. 55. N E 1. }
 — tepid. 27. 39. Malacia. } media $44\frac{1}{2}$.

Febris quædam *sporadica*, quæ & fauces ac pulmones graviter afficit. Tussis, dolores & tumores faucium frequentes; *rheumatismi* graves passim.

Nova Luna 5. NOVEMBRI. *Plena Luna* 20.

Ineunte *Novembri* Corus plerumque spiravit, medio Boreas, a XIX. autem nunc Libs, nunc Auster, nihilominus altam fatis stationem retinuit *Barometer*, *atmosphæra* vero crassa fuit valde ac tepida.

Pluvia $\frac{''}{1}$. 2. $\frac{'}{3}$. 4. 5. $\frac{''}{6}$. 11. 16. $\frac{''}{17}$. 18. $\frac{''}{19}$.

Dig. Dec.

20. $\frac{''}{25}$. $\frac{'}{28}$. $\frac{'}{29}$ = 2.512.

Fulgur & tonitru 2 H. 4. a. m. Pruina & gelu
 14 N F 1^x.

§ Altitud. maxim. 24. 30.2. S b E 1. }
 — — minim. 18. 29.4. S W b W 2. } media 29.9.

Dies frigid. 14. 62. N E 1^x. }
 — tepid. 6. 42. W S W 2. } media $49\frac{2}{8}$.

Blanda admodum tempestas, pauci morbi; febres tamen quædam anginosæ, *scarlatinæ* & pustulosæ; tussis crebræ.

Nova Luna 5. DECEMBRI. *Plena Luna* 20.

A primo ad diem septimum *Decembris* perflavit Eurus, post Corus, aut Libs, interdum Aquilo: a XXIV. ad finem usque ventus perpetuus ex Oriente, isque sæpe perfrigidus: præalta fuit ut plurimum *Baroscopii* statio.

Pluvia $\overset{.}{1}$. $\overset{.}{8}$. $\overset{.}{9}$. $\overset{.}{14}$. $\overset{.}{15}$. $\overset{.}{16}$. $\overset{.}{17}$. $\overset{.}{18}$. $\overset{.}{19}$.
Dig. Dec.

Grando $14 = 1.514$.

Maximæ pruinae sæpissime hoc mense, gelu rigidum frequens.

Altitud. maxim. $21. 30,6. NE 1.$
— — minim. $17. 29,1. SW 2.$ } media $30.0\frac{1}{29}$.
Dies frigid. $31 73. ENE 2^x.$ }
— tepid. $8. 46. SW 3^x.$ } media $59\frac{22}{29}$.

Tempestas est adhuc maxime salubris, morbi multo rariores solito: tussis frequentes, etiam convulsivæ plurimæ inter pueros, pleuritides, & anginae aliquæ, rheumatismus passim.

Tota pluviae quantitas, anno MDCCXLIII.

Dig. Dec.
 $= 20.908$.

Nova Luna 3. JANUARIO. Plena Luna 18.

Constans ab Oriente ventus, toto fere mense, mercurium barometricum in alto sustinuit loco, flectens vero plerumque ad Septentrionem aërem fecit siccum & frigidum valde, hinc gelu sæpe asperrimum; imo 28, 29, vel ipsum mare ad littora congelatum erat.

Dig. Dec.
Pluvia $\overset{.}{7}$. $\overset{.}{11}$. $\overset{.}{15}$. $\overset{.}{30}$. Nix $27 = 1.068$.

Altitud. maxim. $18. 30,6. ENE 1.$ }
— — minim. $7. 29,6. S 2.$ } media $30.0\frac{12}{30}$.
Dies frigidissim. $29. 76. NE 1.$ }
— tepid. $11. 56. S b E. 2.$ } media $64\frac{1}{3}$.

Tussis inter omnes fere vehemens & laboriosa; sævissimi asthmatis paroxysmi: dolores dentium, rauco, fauciumque asperitas plures molestant; pleuritis, vel peripneumonia, corripit multos,

multos, *ophthalmia* aliquos — *Tussis convulsiva* inter pueros *epidémica*, ad quam profligandam magis fuit necessaria sanguinis missio quam memini unquam, etiam in puerulis tenerrimis, quorum sanguis haud raro non levi obductus erat glutine: porro non ita feliciter successit *corticis peruviani* decoct. quod sane perpetuum est ubi sanguis est densus admodum ac tenax, atque inflammationibus aptus; unde pessime pleuriticis & peripneumoniacis exhibetur.

Nova Luna 2. FEBRUARIO. *Plena Luna* 16.

Varia fuit tempestas variusque ventus hoc mense, frequens autem ab Oriente *Barometrum* tenuit ad altum satis gradum, *Malacia* subinde per initia; per totum *atmosphæra* densa, ac sæpe frigida, haud multum tamen gelu.

Pluvia $\frac{1}{7}$. $\frac{1}{8}$. 9. 11. 17. $\frac{n}{19}$. $\frac{n}{20}$. 21.—23

$\frac{1}{24}$. 26. 28. 29. Grando 9 N b W 1^x—24 N
Dig. Dec.

W 3 = 1.722.

Circius vehemens 24 p. m. — vehementissimus 28 noctu.

— — 29 a. m, Maximus & lucidus halo circa Lunam 18.

§ Altitud. maxim. 13. 30.3. E S E 2. } media 29.8.
— — minim. 29. 29.2. N W b W 4. }

Dies frigid. 6. 67. E 2. } media $56\frac{1}{2}$.
— tepid. 23. 49. W S W 2^x. }

Variolæ aliquæ, rubra *miliaris* eruptio cum febricula passim & febres rheumaticæ — *Tussis* violenta inter omnes fere, pluribus *catarrhalis* est prorsus, multis tamen *asthmatica*; hinc peripneumonia frequen-

quenter oritur, haud raro sputum sanguinis, quod quidem aliquos in tabem pulmonariam præcipitat. — Tussis *convulsiva* etiam adultos quosdam corripit, qui solummodo repetita sanguinis missione levantur, & vomitu leni.

Nova Luna 3. MARTIO. *Plena Luna* 17.

Incipiente *Martio* perplurima grando, Cauro sæpe perflante: a XII. ad XXIII. ventus Orientem inter & Septentrionem constitit, inde Libs; ad ipsum finem Aquilo: aër fuit ficcus plerumque & frigidus.

Pluvia $\frac{''' }{1.}$ 2. $\frac{' }{3.}$ 4. $\frac{'' }{5.}$ 6. $\frac{' }{7.}$ $\frac{'' }{9.}$ 11. 23. 25.
 $\frac{' }{26.}$ $\frac{'' }{27.}$ 28. 30. Grando 2. 3. 6. 7. 8. $\frac{' }{10.}$
 Dig. Dec.
 Nix 8. $\frac{1}{31} = 2.632$.

Procella 2 N W b W 4^x — 5 S W b W 4 — 11 N W b N 4_x. Lumen boreale fulgidum valde 22. H. 9. p. m. E N E 2_x.

♀ Altitud. maxim. 15. 30, 1. E N E 2. } media 29.5 $\frac{2}{3}$,
 — — minim. 5. 29, 2. }
 Dies frigid. 14. 62. N N E 2. } media 55 $\frac{26}{100}$.
 — tepid. 28. 46. W S W 2 }

Febres aliquæ tertianæ, & semitertianæ: Tussis molestissima & pertinax admodum undique, quæ ex naribus sæpe, sæpe de pulmone, sanguinem erumpere facit, accedit interdum peripneumonia — hinc *phthisici* plures, præsertim qui antea fuerant *asthmatici*. Pleuritis & *rheumatismus* passim, sub mensis finem *pleuoperipneumonia* frequens valde — Cruor extractus est perquam crassus atque maxime tenaci & flavo obductus glutine.

Nova

Nova Luna 1. APRILI. *Plena Luna* 15.

Ineunte mense nix & grando multa flante Aquilone, mox turbidus auster; a xii. ad xvi. Eurus, inde Aquilo rursus; Corus sub finem. Aër fuit sæpe gelidus valde; maximæ pruinae sæpissime per medium mensem, imo & interdum gelu.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{III}{4}$ 6. $\frac{III}{7}$. 8. $\frac{1}{9}$. $\frac{II}{10}$. $\frac{III}{12}$. $\frac{II}{15}$. 22. $\frac{II}{28}$.

30. Nix & grando $\frac{1}{1}$. 2. 3. 4. 9. 26.

Dig. Dec.

= 3390.

Procella 7. p. m. S 4x Gelu 14. 15.

§ Altitud. maxim. 19. 30,1. N N E 1. } media 29,6 $\frac{3}{29}$.
— — minim. 5. 29,0. S S W 3x. }

Dies frigid. 3. 65. N N E 3. } media 50 $\frac{6}{29}$.
— tepid. 24. 41. NWbW 1. }

Pleuritides & peripneumonix valde frequentes, sæpe conjunctæ sæviunt: multi *asthmate*, multi *rheumatismo*, multi pleuritide spuria, laborant, plurimi tussi gravissima. *Morbilli* passim, *variola* quamplurimæ per viciniam, nec non in citeriore *Cornubia*; haud paucæ febres tertianæ* — *Paraphrenitis* solito frequentior.

Vix sane observavi unquam cruorem, ab ægrotantibus detractum, magis densum atque glutinosum quam hoc tempore, idque sæpe post quartam, imo & sextam sanguinis missionem — hoc profecto notavi præcipue in primario nosocomii nautici chirurgo, qui ineunte mense *paraphrenitide* fuit peremptus.

Bonus hic & ingeniosus certe vir mane, tertio *Aprilis*, inhorruit, mox rigore maximo correptus,

* Vid. Lib. de Febr. l. c.

reptus, inter visitandum ægrotos, se recepit, protinus sævissimo dolore dorſi ac imi pectoris dextri percitus succubuit, febricitavit vehementer - Miſſus eſt extemplo ſanguis ad \mathfrak{z}_{xvi} ; me dein arceſſiri voluit - Fotum emollientem, & laxans *enema*, præcipio, *nitrique* plurimum & *ſpermatis ceti*, potum diluentem, porro & ſubtepidum, liberalem; furente tamen uſque dolore, ſub noctem alteram ſanguinis miſſionem ad \mathfrak{z}_{xvi} , fotumque iterum, & *enema* e lacte dulci cum ſale marino plurimo, quo bis, terve dejecit alvus; mox *Diacodii* \mathfrak{z}_{ss} ſumpſit ac *Tinct. Thebaic.* gut. xxiv — Tota nocte ejulavit, difficillime ſpiravit, tuſſicula arida vexatus nil expuit — bene mane adeo, die quarto, \mathfrak{z}_{xiv} ſanguinis detractæ ſunt, fomenta etiam & *cata-plaſmata* demulcentia admota, pauloque poſt injectum eſt emolliens *enema*, quo rejecto epotus eſt hauſtus *anodynus*: pacata hinc omnia per horas aliquot, acceſſit veſperi ſomnus — Infidæ autem hæ induciæ! Nox maximis in moleſtiis acta; febris vehemens, ſpiritus brevis, interruptus, difficillimus, dolor acerrimus, ſitis ingens, lingua arida — Ergo v. *Aprilis* H. 9. a. m. repetitur V. S. ad \mathfrak{z}_{xii} . ſaltem, *Mannæ* porro \mathfrak{z}_{x} . cum ſale *mirabil. Glauber.* \mathfrak{z}_{ss} ex juſculo avenaceo aſſumptæ ſunt; ter hinc, quaterve, reſpondit venter, sæviſſimus tamen uſque urget dolor, pulſusque celerrime vibrat, exilis quidem, ſed durus admodum: bis noctu repetita ſunt *anodyna*, unde ſopor aliquis, at perturbatus valde — Cum parum hæc omnia proficere viderim *camphoram* cum *nitro*, &c. exhibui, *hauſtusque ſalinos* ex *Sal. C. C. ſucco Limonum*, &c.; ut nimirum per ſudores forſan morbum elicerem; femoribus porro atque dorſo *veſicatoriâ* applicari juſſi — Sudavit paululum inæqualiter, mox autem rigor invaſit, dolorque dorſi

dorsi & lateris immanis recrudit, adeo ut jam non modo exclamaret, sed & fureret plane — quinta adeo vice, die 6. nempe, post meridiem, sanguis emittitur ad ℥xv . circiter: ad fomentum dein & *clyisma*, nec non *anodyna* confugimus, hinc quies aliqua, sed languor magnus, obrepfit denique somnus. Post sex vel octo horas inalgescens horruit, ejulavit, deliravit, se flammis atque ferro excruciatum intus, dextro e latere, exclamavit; (durum valde, sed retractum, persensit hypochondrium dolens *) anhelavit quasi ex citissimo cursu, interim maximo nisu, at summo angore, quasi gladio perfoffus, suspirium edere anxie desideravit — Dubius, omnino quid facerem ultra sextam sanguinis missionem suadeo ad ℥xii . circiter, fomenta iterum *cataplasmata* & *anodyna* — Supervenit sopor, tremor, tendinum subsultus, singultus: atqui se relevatum prædicat; quievit utique plurimum, sed aliena murmurans & incondita — Frigidulus occupat sudor frontem, dum genæ intenso rubore flagrant, nigrescunt ungues, frigescunt manus; facilius vero movet, imo & se sponte in lecto erigit, melius se multo autumans, modo gravitas spiritus immensa, & aliquantulusque lateris dolor ac pondus abessent — At ego hominem plane moribundum video, septo transverso nempe *sphacelato*: tamen sopores inter, singultus & deliria, atterit noctem, die 7. mensis, paulo ante meridiem, obiit vir, si quis alius, vita dignus longiore. — Mox post mortem lividum quasi a contusione apparuit totum latus dextrum, os *ilium* adusque. Hic casus fuit vere *paraphreniticus* **, cuius perpaucae extant apud scriptores medi-

medi-

* Si Septum transversum percussum est, præcordia sursum contrahuntur. *Cels.* Lib. 5. C. 26.

** Lib. de Febr. Cap. de Pleuritide.

medicos historiæ: credo equidem longe sæpius occurrit quam vulgo putatur.

Ab hoc ægroto intra quatrimum detractæ sunt sanguinis uncix fere centum, cuius singula portio erat quam maxime viscida, etiam ultima, licet sero permulto tenuissimo limpidio innatabat crassamentum (parvula velut insula globosa, pene tamen prorsus submersa) quod firmissimo quasi corio erat obductum, vix utique scalpello penetrandum. *

Nova Luna 1. — *MAIO. Nova Luna* 30.
Plena 15.

Ventus orientalis hoc mense prævaluit, a xix. ad xxiv. Zephyrus: Aër fuit siccissimus, sub finem valde calidus — blandissima plerumque tempestas.

Pluvia $\frac{''}{3}$. 8. $\frac{'}{10}$. 11. 12. $\frac{''}{13}$. 18. 21. 22.
Dig. Dec.

Grando 13 = 1. 236.

Fulgur & tonitru 3 nocte.

♂ Altitud. maxim. 15. 30. 1. E N E 1. } media 29.6 $\frac{26}{8}$.
— — minim. 22. 29. 2. S W. 3. }

Dies frigid. 14. 47. E N E 2. } media 36 $\frac{6}{8}$.
— fervid. 30. 20. E N E. 1. }

Febres intermittentes *epidemicæ*; Pleuritis & peripneumonia frequens, *morbilli* passim: *Varioles* plurimæ, quarum haud paucæ mali admodum moris; forsan a profusis sudoribus; quibus adulti, præcipue ineunte morbo, sæpe corripiuntur — Sed & puerulis non multo minus sunt exitiales, qui nimirum confluentibus, nigris, cruentis non raro obruuntur.

Plena

* Lib. de Febr. Cap. de Pleuritide.

Plena Luna 13. JUNIO. *Nova Luna* 29.

Sicca duravit & calida tempestat ad diem mensis vicesimum, Eurus interea spiravit frequenter, postea vero ventus ab oris australibus multam invexit pluviam, aëremque fecit multo frigidior.

Pluvia 4. 5. 8. 10. $\frac{0}{20}$. $\frac{1}{21}$. $\frac{0}{22}$. $\frac{0}{23}$. $\frac{0}{24}$. 25.

$\frac{0}{27}$ Dig. Dec. 28. 29. 30 = 2.786.

Fulgur & tonitru 5 vesperi — 22 Hora 9. p. m. — 23. p. m. Nebula valde foetida 26. p. m. Malacia.

Altitud. maxim. 14. 29.8. EbN 1. } media 29.5 $\frac{5}{29}$.
— — minim. 28. 29.0 SSE 2. }

Dies frigid. 24. 36. S b W 2. } media 27 $\frac{2}{29}$.
— fervid. 17. 16. NNW 1. }

Febres intermittentes sparsim, tertianæ ac hæmitritææ potissimum; pleuritides, peripneumoniæ, & anginae aliquæ. Variolæ epidemicæ, interdum valdæ malignæ, utpote petechiis & hæmorrhagia aliquando stipatæ.

Plena Luna 13. JULIO. *Nova Luna* 28.

Per initia mensis pluvia frequens, parca post; aër plerumque crassus, ventusque varius, Malacia interdum; a xvi. ad xxii. spirabat Eurus.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. 4. 6. 8. 9. $\frac{1}{10}$. $\frac{0}{22}$. 24. 30.

Dig. Dec. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. = 1.344.

Levis Procella 3. p. m. S W b W 4x.

Altitud. maxim. 7. 30.0. NNW 1. } media 29.6 $\frac{20}{29}$.
— — minim. 3. 29.2. }

Dies frigid. 4. 36. WNW 1. } media 29 $\frac{4}{29}$.
— calid. 20. 22. E 1x.

V

Vario-

Variolæ epidemicæ, sane sunt haud parum funestæ; sæpe parvæ, atræ, sessiles cum foveola in pustularum medio livida aut nigra—interdum crudo difflluunt *ichore*, qui subiectam carnem erodit, imo & nonnunquam ipsa gangræna afficit—Linguae, faucesque sub morbi declinationem sunt valde squalidæ, ac frequenter scabræ admodum & atræ; accedit porro sæpissime *diarrhœa* profusa; aliquando tragœdia clauditur more peripneumonico: largissime tamen plerumque expuunt ægri, præsertim per initia. Si quid in his *variolis* malignis possit medicina, id utique faciunt *alexipharmaca* subaustrera cum acido plurimo*; *tinctura* utor sæpissime *corticis Peruviani alexipharmaca* cum multo *Elixire* aut *Spiritu Vitrioli*, sæpe vino rubro gallico his acidis adjectis, præsertim sub febris decessu, interea potionem liberalem, acidulam, demulcentem suadeo atque victum idoneum—Proficiunt hæc interdum maxime, sed ut plurimum atras *variolas* atra mors sequitur.

Ubi ingruente morbo *variolæ* luridæ, lividæ, aut parum acuminatæ visuntur, febrisque adest lentior, generosa quædam *cardiaca* exhibenda sunt, *epispastica* porro applicari debent, quicquid contra reclamât *Sydenhamus*, ejusque sequaces (quos inter, in plurimis, etiam & ego sum)—*Crocus* hic & *Pulv. Contrayerv.* & *Moschus* & *Theriaca Androm.* imo & dulce vinum locum habent—Miram sane vim habet *Moschus* per cutim expellendi, nec tamen interea calefacit nimium: Si crudæ sunt pustulæ, si prorsus aquosæ *myrrham* adjicio, cui inest coctioni fovendæ plurimum—Atqui quando turget sanguis, furit febris, ardent omnia, porrigere talia bacchantis est medici, non prudentis,

* Lib. de Febr. (Cap. de variolis.)

qui diis manibus devovet ægrotos — utinam non talia vidissem! — Adeo nihil in hoc morbo perpetuum est, nedum utique in ullo.

Plena Luna 12. AUGUSTO. *Nova Luna* 26.

Incipiente *Augusto* benigna satis fuit tempestas, ab xi. autem ad finem usque pluviosa plerumque & frigida vento mutante subinde; initio mensis ros perplurimus.

Pluvia 1. 3. 11 — 14. 15. 16. 17. 19. 22.

Dig. Dec.

23. 25. 26. 27. 29. 31 = 2.074.

Procella 17 nocte S W 4 — 28 W S W 4x — 31 primo mane S W 4.

Fulgur & tonitru 13 vesperi.

♀ Altitud. maxim. 4. 30,0. N W b W 1. } media 29.6 $\frac{6}{29}$.

— — minim. 18. 29,1. S W 3x. }

Dies frigid. 30. 41. N W 2. } media 31 $\frac{28}{29}$.

— calid. 5. 25. N W b W 1. }

Plurimæ *variolæ*, febres intermittentes passim, tussis frequentes, sub finem mensis anginae aliquæ: Nisi a *variolis* paucissima funera.

Plena Luna 10. SEPTEMBRI. *Nova Luna* 25.

Et frigidus fuit & valde humidus hic mensis, Libs sæpe perfremuit; a xvii. ad xxiv. Vulturnus furens, hinc humilis *Baroscopii* statio, at maris æstus tumidi, ac inordinati admodum — xxvi. vehemens procella mane E S E 4x Meridie S S E 4 Vesperi S S W 4x vastissimos concitavit fluctus atque maris æstum immensum, qui longe lateque inundavit littora; multo sane magis quam fuit visum antehac unquam*.

V 2

Pluvia

* Vid. Vol. I. P. 45.

Pluvia 1. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13.
 15. 17. 18. 20. 21. 24. 26. 27. 30 = 4.470.
 Dig. Dec.

Halo amplissimus circa Lunam 8. H. 8. p. m.

☿ Altitud. maxim. 2. 29,9. WNW 2. } media 29,3 $\frac{4}{9}$.
 — — minim. 26. 28,9.

Dies frigid. 30. 48. NW 1. } media 39 $\frac{1}{2}$.
 — tepid. 9. 34. S S W. 3.

Variolæ multæ, jam vero paulo mitiores; *morbilli* passim: perpauci certe hic morbi; *colice* tamen, *rheumatismus*, ac tussis quosdam vexant; *alvi fluxus* plurimos.

Plena Luna 9. OCTOBRI. *Nova Luna* 23.

Nimbosa tempestas hoc mense & valde squalida, pluvia fere perpetua, immensa undique diluvia; infremuit Libs sæpissime, intervenit autem Caurus frequenter, haud raro Vultur, XII. ac XIII. Boreas frigidus.

Pluvia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 14. 15.
 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 28. 30. 31.

Dig. Dec.

= 5.608.

Procella levis 2. S W 4x — vehemens admodum 3 nocte W S W 4x.

— — — 4 a. m. W b N 4 — 8 Vesperis S W 4x — 9 S W 4 — 22 primo mane W S W 4x.

Fulgur & tonitru 3 nocte — perpetua fulgura & tonitrua nocte 22 S W 4 — Maximus maris æstus 9.

☿ Altitud. maxim. 13. 30,2. NE 1. } media 29,4 $\frac{2}{3}$.
 — — minim. 4. 28,6.

Dies

Dies frigid. 13. 60. Gelu. }
 — tepid. 19. 42. S W b W 3. } media 48.

Variolæ passim; tormina & alvi fluxus perplurimos exercent: oriuntur hæc credo majore ex parte a *pomaceo* novello — Poma namque ob nimium madorem citissime putrescunt, hinc forte magis ad *diarrhæam* disponunt, quam si firmiora fuerant & generosiore succo prædita. — Tusses sævæ & creberrimæ, hinc aliquando peripneumonia, aut pleuritis — peripneumonix nothæ quoque haud sunt raræ. Febres putridæ nonnullæ. In genere tamen multo pauciores sunt morbi acuti quam quis crederet, habita scilicet ratione tempestatis infaustæ — frequentes forsan procellæ dirimunt pravas ac morbosas *atmosphæcæ* congestiones, vehemens veluti motus oceanî aquarum putrescentiæ obstat.

Plena Luna 9. NOVEMBRI. *Nova Luna* 23.

Per initia *Novembris* pluvia tempestas & interdum nimbosa, Corus sæpe, haud raro *Africus*: a x. ad xxi. Aquilo, subinde *Malacia*, Libs dein furens ad xxv.; *Boreas* post & *apricitas* pulchra.

Pluvia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 13. 16.
 22. 23. 24. 25. Nix & grando 9. 17.

Dig. Dec.
 Pluvia nivosa 20 nocte = 3.740.

Procella 2 Meridie S W 4x — 6 Nocte S W 4x
 — 22 Nocte S b W 4. *Circius* vehemens 17 —
 Acre gelu a 17 ad 21.

Altitud. maxim. 29. 30,5. E N E 1. }
 — — minim. 23. 28,7. S b W 3x. } media 29.7 $\frac{5}{8}$.

Dies frigid. 20. 69. N b E 1. }
 — tepid. 7. 44. S W 1^x. } media 56 $\frac{11}{8}$.

Pleuriticæ & peripneumonicæ febres intermittentes porro ac *variolæ* passim; *rheumatismi* plurimi: tussēs, dentium dolores, faucium, auriumque, cum tumore glandularum, valde frequentes — Colica quamplurimos infestat, partim a *pomaceo* novello, partim etiam ab abundante & acriore bile; tormina sæpe sunt admodum sæva magno cum ardore urinæ.

Plena Luna 8. DECEMBRI. *Nova Luna* 22.

Altam tenuit stationem *Barometer* hoc mense, aër autem fuit plerumque crassus valde, sæpe perfrigidus, sub finem multo lenior — ineunte *Decembri* Aquilo persæpe flabat, exeunte Corus atque Libs, vento interdum omnino silente.

Pluvia $\frac{1}{8}$. $\frac{0}{9}$. $\frac{1}{10}$. 11. 17. $\frac{1}{20}$. 21. $\frac{2}{22}$. 23. 25.
 Dig. Dec.

28. Grando 12. Nix 13 = 1.394.

Procella 11. p. m. ad mediam noctem durans N W b N 4.

AB. 14. H. 9. p. m. N E b N 1 — 24. Vesperi N W 2^x.

☿ Altitud. maxim. 14. 30,6. N E 1. }
 — — minim. 11. 29,3. } media 30.0 $\frac{2}{3}$.
 Dies frigid. 14. 70. valde rigidum gelu }
 — tepid. 23. 50. S W b S 3. } media 57 $\frac{25}{30}$.

Morbi colici plurimi, ab acrimonia bilis aliqui, plures longe tamen a *pomaceo* impuro, nec bene defæcato — in his alvus est plerumque cita, sæpe accedit *dysenteria* mucosa, sæpe biliosa, aliquando cruenta.

Tussēs

Tusses innumeræ cum tumore faucium, maxillarum, *parotidum* — Peripneumonia passim — febris *catarrhalis* valde frequens; solvitur sæpe multa effluente crassa ac ardente urina.

Gallos inter & Hispanos captivos sævit admodum febris quædam *catarrhalis* maligna, jugulatque per plurimos: accedunt sæpe *petechiæ*, haud raro *parotides*, sæpe pustulæ urentes aquosæ: dolet initio maxime caput, dorsum, ac regio præcordiorum, protinus supervenit phrenitis, anhelosa respiratio, tremor, subsultus, brevi mors.

— Tota pluviae quantitas anno MDCCXLIV.

6 Dig. Dec.

= 31.444.

Plena Luna 7. JANUARIO. *Nova Luna* 21.

Incipiente anno altum fuit *Baroscopium*, sæpe Boreas, sæpe perflavit frigidus admodum Vulturus, hinc gelu acre frequenter: post vicesimum mensis diem nunc Libs, nunc Caurus: aër erat plerumque maxime humidus præsertim gelu liquante atque nive.

Pluvia 3. 4. ^{'''}10. ^{''}11. ^{''}12. 13. 20. ^{''}21. 22. 23.

^{''}25. ^{''}27. ^{''}28. 30. Nix ^{''}9. 17. Grando 27.

Dig Dec.

31 = 2.910.

Gravis procella cum nive perpetua 9. S E 4.

☞ Altitud. maxim. 1. 30,4. N 2. } media 29.62 $\frac{1}{2}$.
— — minim. 26. 28,7. S W 3. }

Dies frigid. 9. 69. S E 4. } media 61 $\frac{2}{3}$.
→ tepid. 25. 54. S W 3. }

Morbi colici adhuc passim; *rheumatismi*, pleuritides ac peripneumoniæ, & veræ & nothæ, spar-

sim. Plurimi faucium, maxillarum, parotidum, imo & capitis sæpe tumore laborant, accedente tussi plerumque & coryza: *ophthalmice* frequentes.

Febris *catarrhalis* maligna jam grassatur maxime, & per plurimos captivorum mittit ad inferos; etiam nunc haud raro nostrates, qui cum his multum versantur — Plures sæpe diutissime trahit, sæpius autem magis est acuta & more peripneumoniæ, aut anginae suffocantis, jugulat — accedunt sæpe *petechiæ*, sæpe *dysenteria* cruenta — hæc tamen nec certo ordine, nec tempore — Horum multi gangræna pedum corripuntur a frigore forsan & sordibus.

Plena Luna 5. FEBRUARIO. *Nova Luna* 20.

Frigidus admodum fuit hic mensis, Boreas per sæpe flavit, interdum Vulturus, Libs rarissime: aër siccus semper & tenuis, gelu subinde asperri- mum: præalta erat medio *Februario Barometri* statio.

Pluvia $\frac{1}{5}$. 9. $\frac{1}{14}$. 19. 22. Grando 2. 6. 23

Dig. Dec.

Nix $\frac{26}{26}$. 28 = 0.838.

Nix plurima 26. etsi ventus erat W S W 3. Therm. 70.

Magna AB. 9. H. 10 noctis N N E 1. — Levis H. 7. p. m. E N E 2^x.

✕ Altitud. maxim. 18. 30,6. E N E 2^x. } media 29.8 $\frac{2}{3}$.
— — minim. 5 29,2. S E 1^x.

Dies frigid. 25. 75. N E b N 1^x. } media 65 $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{8}$.
— tepid. 15. 58. E S E 2.

Asthma sævissimum plures premit; tusses, pleuritides & peripneumoniæ valde sunt frequentes; imo

imo & sæpe graves admodum, quippe difficulter & parce expuitur — Sanguis extractus est perquam tenax, & crassissimo glutine obductus. serum autem viride, aut subflavum, at perliquidum — hoc quoque in *rheumatismo* notatur, qui jam haud paucos graviter & diu torquet.

Inter captivos sævit usque febris 'maligna catarthalis, immensamque stragem edit; ministrantes aniculas, imo & quosdam chirurgos nunc invadit, etiam & occidit. — Sæpe in summo febris incremento, sæpe sub finem, erumpunt pustulæ aquosæ, urentes, crebro papulæ livescentes, interdum luridæ, aut subatræ maculæ, *aphthæ* frequenter — Nihil horum autem multum juvare videtur, longe magis enim est ex re ægrotantium sputum abundans (modo non sit lividum, saniosum, fœtidum, quod frequenter nimis evenit) blandusque & æqualiter diffusus sudor — profusum vero extimesco semper, qui sæpe oleosus, mox frigidus, tandem fit lethalis; idque certo certius obrepente horrore — Nil in tali casu magis est ex usu quam vinum rubrum cum aromaticis coctum — præcipue si urget *diarrhæa*, five mucosa, five cruenta: quod frequenter accidit.

Plena Luna 6. MARTIO. *Nova Luna* 22.

Per initia *Martii* pluviosa fuit valde & squalida tempestas, aër inde crassus admodum & humidus; spiravit sæpissime Libanotus, Corus crebro, Vultur internum.

Pluviâ ⁱⁱⁱ4. ⁱ5. ⁱ6. ⁱ7. ⁱⁱⁱ8. ⁱⁱⁱ9. 10. ⁱⁱⁱ11. ⁱⁱ13. 15 —

ⁱⁱ17. ⁱⁱ24. 25. 27. ⁱ28. ⁱ29. Grando & Nix ⁱ1. 2.

Dig. Dec.

3 = 4.694.

Procella primo mane 1 W S W 4—9 Nocte
S W b S 4_x—29 Nocte N W permagnæ nebulæ
a 24 ad 27.

♂ Altitud. maxim. 25. 30,0. N W 1.	} media 29.5 $\frac{2}{3}$.
— — minim. 10. 29.1. W 3.	
Dies frigid. 2. 64. S W b W 2. Nix.	} media 51 $\frac{4}{30}$.
— tepid. 21. 42. N 1.	

Tusses valde frequentes, tumores colli, maxillarum, capitis undique; plurimæ febriculæ *catarrhales* — maligna sævit adhuc maxime inter captivos, nec non inter nautas nostros — Pleuritides ac peripneumonix haud paucæ & veræ & spurix.

Plena Luna 5. APRILI. *Nova Luna* 20.

Pluvius quoque erat hic mensis & algidus Corus initio spirabat, a XIV. ad XXVIII. Boreas fere perpetuus, pluvia tamen decidente frequenter ea vero valde frigida.

Pluvia 1. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

17. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 28. 29. Grando
Dig. Dec.

gravis 7. 11 = 3.912.

Circius vehemens tota nocte 3. — prælargus halo circa Lunam 2. H. 10 noctis — fœtidissima nebula per totam diem 13. S 1_x — Glacies ubique 27 mane E N E 2.

♂ Altitud. maxim. 16. 30,1. ENE 2 _x .	} media 29.5.
— — minim. 21. 28,8. N 2 _x .	
Dies frigid. 27. 55.	} media 48 $\frac{10}{30}$.
— tepid. 14. 40. E 1.	

Rheu-

Rheumatismus passim, *ischias* solito frequentior, eaque certe acerbissima: pleuritides & peripneumoniæ, tam veræ quam nothæ, haud paucos corripunt; tussis, tumores faucium, atque dentium dolores cum gutturis asperitate plurimos: quædam febres intermittentes, inter juniores *morbillosæ* & *scarlatinæ* aliquæ.

Catarrhalis febris usque grassatur, diu interdum trahit ægrotos, cito sæpius cursum absolvit, sub finem plerumque expuunt largissime lentam salsamque pituitam, crebro sine ulla tussi, cum importuna sæpe tussicula, id porro multo cum levamine; urina est tenuis ut plurimum, raro valde rubra, lingua subalbida, vix unquam nigra aut scabra, leve tamen delirium, seu desipientia fere semper adest morbi statu.—Plures etiamnum jugulat *catarrhalis* maligna.

Plena Luna 4. MAIO. *Nova Luna* 20.

Blanda satis tempestas ineunte mense, Euro afflante; post diem autem decimum uda, frigidaque, Libs fere perpetuus.

Pluvia 2. 11—15. 16. 17. 18. 19. 20.—
Dig. Dec.

31. Grando 16—19. a. m. = 1.732.

Procella 16 primo mane S W 4x. Fulgur & tonitru 19. a. m.

♀ Altitud. maxim. 5.30,0. E N E 2.	} media 29.4 $\frac{26}{31}$.
— — minim. 16. 28,9.	
Dies frigid. 20. 48. W S N 2x.	} media 40 $\frac{8}{31}$.
— tepid. 6. 33. E 2.	

Morbilli, ac febres *scarlatinæ* hic & per viciniam *epidemicæ*, gravis sæpissime accedit tussis & affectio peri-

peripneumonica, queis nil magis occurrit quam opportuna sanguinis missio.

Multæ febres *catarrhales* adhuc, quædam prævæ admodum & diu durantes: urina plerumque cruda est valde, subinde quasi lactea, nihil prorsus deponens per totum morbum; lingua est humida ut plurimum, at squalida & sublutea; atque expuunt affatim, idque fausto semper omine — contra ubi lingua fit nigra & arida, parceque produnt sputamina, raro evadunt; mox enim anhelantes, tremantes, palpantes facti fato tandem succumbunt, nisi obstant *vesicatoria*, ac sudor liberalis, qui sane (nescio unde) jam haud ita facilis erumpit: alvus etiam fusa largiter ægrotantibus frequenter succurrit maxime. — Capitis gravitas & vertigo per initia febris fere semper adsunt, leve delirium vero & surditas procedente morbo; toto decursu scireatus maximus, etsi tussis interdum abest omnino. — Usque adeo per salivæ ductus molitur natura *crisin*.

Variolæ, febres *miliæres* & pustulosæ passim; scabies frequens, *ophthalmiæ*, nec non anginae aliquæ.

Haud infrequens est peripneumonia quædam notha, quæ diutissime sæpe perdurat, demumque instar febris lentæ *nervosæ* opprimit ægrotos, etsi initio haud parum exarserat — Horum sanguis extractus tenuis ut plurimum & floridus spectatur, quod mala inter signa semper est, nec largam hujus effusionem patiuntur tales sine summo vitæ discrimine, quamvis valde difficilis videatur spiritus ac magna pectoris oppressio: mirum est utique, quantum detracto cruore mox debilitantur * — Sæviit hæc præcipue per australes provin-

ciæ

* Vide Libr. de Febr. Cap. de Peripneumon. notha.

ciæ oras; nec fuit alia forsan quam *catarrhalis* epidemica in pulmones maxime conversa — *Campiora*, *Crocus*, *Lap. Contrayerv.* *Gum. Ammoniac.* *Oxymel Scillitic.* cum sero *sinapino* tenuissimo aptissima fuere remedia; *vesicatoria* porro perquam utilia. — Pustulis sub finem erumpentibus, ac sudore, raro pereunt.

Plena Luna 3. JUNIO. Nova Luna 18.

Fuit & hic mensis frigidus admodum & pluvius, Africo sæpissime perflante, Coro sæpe, interfuit autem Vulturnus a xxi. ad xxiv. — Aër fuit maxime crassus ac humidus, tristisque tempestas; hyemalem potius quam æstivam putares, adeo omnia sunt uda & squalida: raro vides papilionem, imo vix muscam; torpent omnia.

Pluvia 1. 5. 6. 7. 8. 9. — 13. 14. 15. 19.
Dig. Dec. 22. 23. 24. 25. 27. 28 = 2.760.

Tonitru & fulgura gravissima 22. nocte inter horam x. & xii; longe lateque perfrémuit hæc procella.

♀ Altitud. maxim. 18. 29,8. W N W 1. } media 29.5 $\frac{5}{8}$.
— — minim. 25, 29,2. S W 3x. }
Dies frigid. 12. 48. W N W 2. } media 37 $\frac{1}{3}$.
— calid. 22. 24. S. E. 2x. }

Crebri adhuc valde sunt *morbilli*, quibus sæpe etiam adulti corripuntur: *rheumatismus*, tumor faucium, angina, tussis frequens: febres intermittentes passim.

Febris putrida maligna jam grassatur multum, sæpe cum pustulis rubellis, sæpe cum *petechiis* — enormes interdum *hæmorrhagiæ* ex ore, naribus, utero accedunt; præcipue ubi maculæ prælargæ sunt

sunt ac lividæ, aut nigræ, aut violaceæ * — Levis adest horror initio, mox dolor capitis & gravedo cum vertigine, in plurimis nausea & vomitio; protinus in omnibus magna præcordiorum oppressio & anxietas permolesta, adeo ut perpetuæ urgeant vigiliæ, unde certo certius obrepat delirium, tandemque aliquando veternus. Urina plerumque est maxime cruda ac tenuis, raro aliquid deponens, sub morbi finem vero interdum livida quædam aut furfurosa quasi, nonnunquam etiam nigra prorsus. Lingua, dentes, faucesque nigræ, aridæ, squalidæ sunt, ex ore fœdus admodum exspirat halitus. Pluribus accidit *diarrhœa* mucosa, aut subnigra, cum strigmentis interdum sanguinolentis. — Multi diu conflistant morbo, haud pauci intra dies octo succumbunt; nec desunt plures, qui prorsus evadunt.

Maximè sæviit hic morbus inter captivos, nautas atque nostros, multos etiam jam per viciniam attigit — An ex contagione, an ab ipsa *atmosphæra* constitutione, haud certe scio; parum namque contagiosus videtur nisi in ipsis *nosocomiis*: magna utique est undique virium ac animi dejectio apud omnes, etiamque sanos.

Plena Luna. 2. JULIO. Nova Luna 18.

Jam tandem æstas affulget, pluvix parum nisi ipso initio & sub finem mensis, afflavit plerumque ventus septentrionalis, australis rarissime. Sol fuit fervidus sæpe, multo hinc tenuior facta est *atmosphæra*, & sicciior longe, maxime subinde rorationes, interdum nebulæ lenissime spirante vento.

Pluvia

* Libr. de Febr. Cap. de putrid. malign. petech.

Pluvia $\frac{u}{1.}$ 2. 3. 18. 19. $\frac{1}{27.}$ $\frac{iii}{28.}$ Dig. Dec.

Altitud. maxim. 30. 30,0. N b W 2. } media 29,7 $\frac{6}{30}$.
 — — minim. 1. 29,2. S W b S 2. }

Dies frigid. 30. 36. } media 28 $\frac{12}{30}$.
 — fervid. 13. 22. N 1. }

Febres quædam intermittentes, quædam peripneumonix, *ophthalmicæ* plurimæ — *Morbilli epidemici*, iique sæpe funesti; tussis vehemens, ac *hæctica* febris, plerumque accedunt, durantque diu; sæpe alvi fluxus colliquans evanescentibus *morbillis*, haud raro *ophthalmia*, angina, & ulcera faucium succedunt, aliquando *parotis* cum *erysipelate* capitis; plus semel hoc mense notavi faucium & oris gangrænam, maxillæ porro & vomeris ossis cariem, unde mortem miserrimam; post *morbillos* scilicet.

Febris putrida maligna, quæ dudum sæviit, dominatur usque, maxime inter nautas atque captivos; sæpe cum maculis parvis, obscuris vel subatris, cum luridis interdum papulis per totum corporis habitum; sæpe pustulæ largæ, erodentes erumpunt: Jam insuper magis urget vomitus quam antehac, quem *diarrhæa* gravis mox excipit: porro haud raro multo magis diffluunt sudoribus: adeo tamen parum hæc juvare videntur, ut potius vires pessudent plurimum — Atqui si fluxus alvi cito nimis sistitur, delirium obrepit certissime, aut sopor profundus, cum duro abdominis tumore, ac singultu; quo non aliud magis pestiferum *symptoma*. Omnes fere morbi statu plus minusve delirant, ac surdescunt semper — Quicquid fuit emissum sanguinis, vel rutilantem & speciosam habuit faciem, aut lividam, aut atram, & muco viridi vel livescente obductum, semper-

semperque solutum nimis * — Proxime mihi accedere videtur hæc febris ad naturam illius malignæ, quam Anno 1740. descripsi, adeoque medicina utor eadem fere, Deo dante, fatis feliciter.

Plena Luna 1. —

Nova 16.

AUGUSTO. *Plena Luna* 30

A tertio die mensis ad decimum septimum pluvia multa, & triste cœlum: flavit initio Vultur-nus, postea Libs — hinc vero ad finem usque apricitas pulchra, longe grata messoribus: maximæ nunc rorationes; jamque tandem læte garrunt cicadæ innumeræ, porro muscæ, modo quasi reviviscentes, volitant ubique, valdeque sunt molestæ.

Pluvia	$\frac{''' }{4}$.	5.	$\frac{'' }{6}$.	8.	$\frac{''' }{9}$.	$\frac{'' }{10}$.	$\frac{'}{11}$.	$\frac{'''}{12}$.	$\frac{''}{13}$.	$\frac{'}{14}$.
	Dig. Dec.									
$\frac{''' }{15}$.	$\frac{'}{16}$.	20.	21.	23.	= 3.516.					

Multa fulgura & procella 8 Nocte S S W 4, — 9 mane procella S W b W 4 — 15 Nocte S S W 4_x nebulæ magnæ 24. 27. 28.

⌘ Altitud. maxim. 28. 30,0. N N W 1. } media 29.5 $\frac{6}{31}$.

— — minim. 9. 29,0. S W b W 4. }

Dies frigid. 17. 40. W b S 3. } media 32 $\frac{23}{31}$.

— calid. 3. 25. E S E 1. }

Morbilli frequentes, *variolæ* sparsæ, at mitiores *ophthalmiæ* plurimæ, *dysenteria* passim. — Sævit adhuc febris maligna inter nautas atque captivos rarior tamen multo est alibi, nec ita frequenter *petechiis* foedata.

* Vid. Libr. de Febr. l. c.

Nova Luna 14. SEPTEMBRI. *Plena Luna* 29.

Ineunte *Septembri* pluvia frequens, ab octavo autem die ad vicesimum octavum, nisi decimo sexto, nulla prorsus, nebulæ interim sæpissime, & rorationes maximæ: sol fervidus medio mense, at maxima pruina xx. Ventus ab Oriente spiravit toto fere mense, a xx. ad xxviii. velox admodum.

Pluvia $\frac{v}{2.}$ 3. 4. $\frac{v}{5.}$ 7. 8. $\frac{v}{16.}$ 28. 29. $\frac{v}{30.}$

Dig. Dec.

= 1.078.

Fulgur & tonitru mane 2. Procella 22 E S
E 4x.

Maximus halo circa Lunam 26 nocte.

☿ Altitud. maxim. 11. 30, 1. E 1. } media 29, 6 $\frac{2}{3}$.
— — minim. 2. 29, 2. S E b E 2. }

Dies frigid. 24. 46. E 3. } media 35 $\frac{8}{10}$.
— calid. 15. 26. E S E 1. }

Variolæ frequentes, *diarrhææ* & morbi colici passim; aliquæ *dysentericæ* cruentæ. — Plures adhuc febre putrida, maligna laborant cum *petechiis*, delirio, singultu, &c. — *Asthma* sævissimum multos opprimit; plurimique tumore faucium, maxillarum, *parotidum* vexantur; *ophthalmiæ* multæ.

Morbilli epidemici etiam inter adultos ac plures jugulant, sæpe more peripneumonico, sæpe lenta *hectica* tabe; haud raro *dysenteria* cruenta accedit, sæpius vero enormis mucosa *diarrhæa*, nonnunquam accidunt dirissima oris ulcera, atque inde maxillarum caries.

Nova Luna. 14. OCTOBRI. *Plena Luna* 29.

Tristis fuit admodum & maxime pluvius hic mensis, vix dies unus & alter apricus, aër valde
X crassus

crassus & humidus ; Corus perflavit initio, post Libs furens sæpissime, Auster subinde, non raro sub finem Vulturnus.

Pluvia $\frac{n}{1.}$ $\frac{v}{2.}$ $\frac{v}{3.}$ $\frac{m}{4.}$ $\frac{v}{5.}$ $\frac{v}{6.}$ $\frac{v}{8.}$ $\frac{v}{9.}$ $\frac{v}{10.}$ $\frac{v}{12.}$ $\frac{m}{15.}$
 $\frac{v}{16.}$ $\frac{v}{17.}$ $\frac{v}{18.}$ $\frac{v}{19.}$ $\frac{v}{20.}$ $\frac{v}{21.}$ $\frac{v}{22.}$ $\frac{v}{23.}$ $\frac{v}{24.}$ $\frac{v}{26.}$ $\frac{v}{28.}$
 Dig. Dec.

$\frac{v}{29.}$ $\frac{v}{30.}$ $\frac{v}{31.}$ Grando 3. 22 = 5.896.

Circius vehemens 1. mane. Procella 5. mane
 S 4—8 S W 4x p. m. Iris vivida lunaris 1. H.
 7. p. m.

♂ Altitud. maxim. 14. 30,2. E 1. } media 29.3 $\frac{2}{9}$.
 — — minim. 5. 28,7. S 4.
 Dies frigid. 30. 54. S S E 2x. } media 46.1 $\frac{1}{9}$.
 — tepid. 11. 38. S S W 2. }

Morbilli adhuc plurimi: *variolæ epidemicæ*; morbi colici & *rheumatismi* passim, *ophthalmicæ* multæ: quidam peripneumonia notha laborant, aliqui *apoplexia* perculsi sunt. Tussis, coryzæ, gravedines, ac febriculæ *catarrhales* permultæ; febres lentæ & *nervosæ* haud raræ.

Nova Luna 12. NOVEMBRI. *Plena Luna* 28.

Venit ab Oriente ventus ad diem xiv., ad Septentrionem vergens plerumque, tunc Aquilo, mox Auster furens pluviam demisit plurimam, paulo tamen post rursus frigidus Aquilo; ad ipsum finem Libs. *Atmosphæra* fuit ut plurimum gelida, crassa admodum ac humida.

Pluvia $\frac{v}{1.}$ $\frac{v}{2.}$ $\frac{v}{12.}$ $\frac{v}{13.}$ $\frac{v}{14.}$ $\frac{v}{18.}$ $\frac{v}{19.}$ $\frac{v}{20.}$ $\frac{v}{21.}$
 Dig. Dec.
 $\frac{v}{22.}$ $\frac{v}{23.}$ $\frac{v}{26.}$ $\frac{v}{30.}$ Nix 15. 16 = 3.522.

Fulgura

Fulgura multa sine tonitru 1 Nocte S E 1^x.
 Procella 18 S b W 4 — 19 p. m. S W 4^x. Circius
 vehemens 19 nocte. Subitus admodum & ma-
 ximus *Baroscopii* descensus 18., a 29. 7. scilicet
 ad 28. 8, intra sex vel octo horas. Gelu rigidum
 16. 17. 21. 25. Densissima & valde foetida nebula
 23. p. m.

§ Altitud. maxim. 6. 30,3. E N E 1^x. }
 — — minim. 19. 28,7. N W 1. } media 29.7 $\frac{2}{3}$.
 Dies frigid. 16. 71. N b W 1. }
 — tepid. 1. 46. S E 1^x. } media 57 $\frac{1}{3}$ $\frac{6}{10}$.

Variolæ undique *epidemicæ*, jamque quædam
 malæ admodum sunt indolis; utcunque per to-
 tum autumnum fuerant benignæ. *Ophthalmicæ*
 plurimæ, ac *epiphoræ* pertinaces admodum. Pleu-
 ritides aliquæ & peripneumoniæ.

Ineunte mense febris quædam *catarrhalis* re-
 currit, seu potius ingruit; vehemens dolor capi-
 tis atque pectoris oppressio urgent, nausea per-
 petua ac vomitio pituitosa, pulsus valde velox,
 at mollis, raro tensus; lingua sordida, sublutea
 vix unquam *arida*; urina turbida admodum palli-
 dam, at flavescentem, prælargam, per totum
 morbi decursum, deponens subsidentiam. Ex-
 puunt omnes largissime. — Sanguis rarissime val-
 de tenax est, interdum vero nonnihil glutinosus,
 omnes vertigine & somnolentia nimia laborant.
 Quosdam *diarrhæa* lenis liberat, quosdam sudor
 blandus æqualis, plures liberrima sputamina ma-
 xime secta prius vena & proritata vomitione;
 ubi nimirum artis est, subsidium adhibere naturæ.

Nova Luna 12. DECEMBRI. *Plena Luna* 27.

Incipiente *Decembri* flavit Boreas, consequen-
 te frigida & sicca tempestate: ab xi. ad xv. plu-

vius Vulturnus, pauloque post turbidus Auster; sub finem mensis Eurus: aër fuit crassus valde, & medio mense humidus maxime.

Pluvia 1. 11. 12. ^{///}13. ^{///}14. 15. [—]16. 17. 19. 20.
^{///}21. 22. [—]23 — 25. 26. ⁿ30 = 3.410. Dig. Dec.

Procella 13. p. m. S E b S 4_x — 19. tota nocte S 4 — 20 mane S W 4.

— 23 nocte S W 4 — 24 tota fere die S W b W 4.

☿ Altitud. maxim. 2. 30,4. E N E 1^x. } media 29. 5²/₃.
 — — minim. 14. 29,0. S S E 3^x. }
 Dies frigid. 7. 70. N E 2^x. } media 59²³/₃₀.
 — tepid. 19. 50. S 4. }

Tussis vehemens, *asthmatica*, frequens: *variola* maxime *epidemicæ* longe lateque; quædam confluentes sunt, parvæ, fessiles, nigræ, quædam tamen valde benignæ. — Febriculæ pustulosæ (*the Chicken and Swines Pox*) plurimæ inter pueros: pustulas has subrubras & aquosas pro variolis sæpe agnoscunt mulierculæ (nam & vestigia crebro diu relinquunt) haud raro tamen paulo post tristi eventu vident errorem, dum variolæ, eæque malignæ, re vera invadunt.

Jam increbescunt valde febres peripneumonicae, periculosa quidem & haud raro lethales. Aliqui parum aut nil expuunt, plures biliosa admodum sincera & perliquida aut spumosa & minime cocta, nonnulli saniem fere subatram: anhelant maxime & summa pectoris gravitate premuntur — Majus mihi videtur impendere periculum peripneumonicis, ubi permagna urget pectoris oppressio, & grave quoddam præcordiorum pondus, etsi levis tantum & obtusus adsit dolor, quam

quam si pectore, aut latere magis acute torquentur: hic enim sanguis missio certum plerumque adfert levamen: in priore casu, ita sæpe non juvat, ut etiam haud parum sit noxia. Jam utique plures occurrunt peripneumoniæ, ubi immensa est pectoris gravitas, & spirandi difficultas magna, & tussis haud levis, & multus in pulmone strepitus, quæ vix tamen admittunt venæ sectionem* — Sperares forsan magnum a repetita sanguinis missione auxilium, accidit e contra debilitas maxima, sputi suppressio, anxietas gravissima, vigiliæ perpetuæ, mox delirium, tremores, frigidi sudores, tandemque nimis frequenter mors inopinata; sæpe etiam inter gemitus & colloquia. — Atqui hunc sanguinem inspicere diligenter; nimium semper apparet solutus, quamvis floridus plerumque, & speciosus, & diu feri tenax: aspice altera vice detractum cruorem, crassamentum lividum vides, & laxum maxime, plurimo fulvo, turbido aut subviridi, aut subrubicundo innatans sero: tertia, nigrum fere & saniosum, vix ullo modo cohærens — Pessimi hoc semper ominis notavi in peripneumonia, & plerumque lethale. **

Sunt autem & nunc multi *pleuroperipneumonia* laborantes, præsertim ruricolæ, quibus dolor est pectoris aut lateris vehemens, tussis violenta, spiritus ex ore fervens, interruptus, difficillimus, pulsus plenus, durus, atque velox, rubicunda ac turgida facies — Postulant hæc citam & largam sanguinis missionem, imo & repetitam, unde mox relevantur plurimum — Horum autem sanguis densus admodum & viscosus est, ac dum frigescit pellicula obductus albida, & coriacea qua-

* Vid. Libr. de Febr. l. c. & Cap. de Peripneumonia.

** Ibid.

fi — Porro sanguine misso, diluentia subacida, nitrosa, & quæ sputo movendo sunt, morbum ut plurimum brevi solvunt.

At prior peripneumonix species, hoc mense hic magis sæviebat, in qua urina plerumque initio erat cruda prorsus, sæpe tenuis, subinde autem quasi lactea, sub finem vero parca, turbida, subnigra. Lingua atro veluti mucro oblita, vel sicca admodum & prærubra, colore corticis granati æmula, sæpe tamen glabra valde, livescens, & splendida quasi, at aridissima, cum bulla nigra interdum ad linguæ apicem — Pestifera hæc & funesta sunt; potissimum si saniosa, nigra, & valde foetida sputamina ejiciuntur.

Res est hercle non levis momenti, duas has peripneumonix species probe distinguere, maxime per initia morbi; cum & ingens pectoris oppressio & spirandi difficultas, febris ardor & sævitia tussis, utramque comitentur, & æque postulare videantur sanguinis missionem. Prior attamen, & jam frequentior peripneumonia, vix quartam sanguinis partem adimi patitur sine summa virium ruina, quam posterior & fert facile, imo & sæpissime poscit. — Unde igitur petenda distinctio est?

Si pulsus celer valde, exilis & contractus est, aut mollis, inæqualis & vacillans, si anima ducitur laboriose & cum frequente suspirio, potius quam cum anhelatione æstuante, si urget magis pectoris gravitas quam dolor, si urina cruda est, tenuis, & vapida, si profusi aut inæquales, frigiduli sudores erumpunt, si languor magnus & manus tremulæ, cautissime profecto mittendus est sanguis & perparce; si modo liceat omnino secare venam. At si frigefactus cruor nimis apparet

ret solutus, & parum firme cohærens, utcunque floridus sit, protinus siste manum, ni jugulare vis ægrotantem. Si de mittendo sanguine dubitas, an scilicet conveniat necne, hoc certe cognosces signo; nunquam igitur dubio in casu, prima vice, esto laticis vitalis prodigus; qui sæpe corrigendus est utique, non profundendus: — At si plenus, velox, tensus, aut durus pulsus valide vibrat, ardetque febris, si fervidus expirat spiritus atque densus, si pectus dolet admodum, rubetque vultus & turget, mittendus semper est sanguis pleno & flumine & modo; etiam bis, terve, repetenda est venæ sectio si urget usque spirandi difficultas atque dolor, maxime si extracto cruori inhæret crusta subflava & glutinosa valde.

Nunc grassatur plurimum febris quædam putrida, diu admodum sæpe detinens ægrotos, multisque certe lethalis: haud raro ad vicesimum diem, imo aliquando ad tricesimum usque protenditur.

Levis rigor initio totum pererrat corpus, subito mox calore incertoque exceptus; sic vicibus alternis: lassitudo insuper & vagus dolor omnia fatigat membra; nunquam non protinus accedit capitis dolor, sæpe acutus admodum in fronte, in temporibus, in sincipite, interdum in imis oculis; Pulsus interea celer, tremulus, inæqualis est, etiam & haud raro intermittens plane, ac fortiore digiti pressu interruptus prorsus. — Urina vero tenuis est ac mera quasi vappa, aut jumentorum instar turbida *, sed nihil omnino deponens ** — haud multum inarescit lingua, nec fiunt valde, fordescunt tamen semper fauces —

X 4

Vomi.

* Οὐρον ἀναίεσταμαγμένον. οὐρον ὑποζυγίων. Aph. 70. Sect. 4.
Vide Holler. in Aphorismum.

** Ibidem.

Vomitibus interim biliosus, viridis, aut fuscus urget vehementer, sæpe haud parum foetidus; anxietas enormis, jactatio perpetua, ac pervigilium contumax, semper, accedente morbi statu, delirium inferunt & tremores, tendinumque subfultus: sub finem lingua labiaque tremula fiunt, nigra & aridissima, dentes atrii & sordidissimi. Singultus, oculi vitrei, sudores frigidi, ungues lividi, pulsusque deficiens, instantem denunciant mortem; licet interdum stupidi sine sensu, motu, aut loquela jacent per dies aliquot integros priusquam extremam agunt animam, coxis interea natibusque *necrosis* affectis.

Hoc modo huic feбри succumbunt multi; at sæpius multo magis effera sævit — Premittit ipso morbi *insultu* anxietas, & præcordiorum pondus immane, acerbissimus capitis atque dorsi dolor, vomitio perpetua, viridis, atra, horrenda, singultus continuus, nigrescit lingua, dentesque protinus, furit mox phrenitis, toto corpore tremunt, tandemque frequenter *caro* premuntur, nec evigilant unquam — Sextum inter diem ut plurimum & nonum erumpunt *petechiæ*, sæpe lividæ, sæpe etiam aterrimæ, quæ interdum repente vanescunt, profuso fluente sudore, vel *diarrhœa*; quibus ægri sæpissime laborant. Crebro sanguinem stillant nares, aliquando profundunt, unde delirium sæpe mitescit, sed inde vires deprimuntur maxime — quod idem de fluxu alvi dicendum est, qui multo sæpius accidit — Citius equidem tardiusve semper fere, durante febre, per alvum molita est natura *crisis*, at frequenter nimis morbus tantum morti cessit; haud raro autem successit victrix natura — Si dejectiones nigræ, perliquidæ, aut saniosæ sunt, & maxime foetidæ, utique nihil spero, præcipue si absque voluntate descendunt:

nec

nec multo sane melioris est ominis inflatum atque durum abdomen, perdurante ventris cursu, præsertim si singultus advenit, & perpauca redditur urina: quam subatram pene notavi, imo & nonnunquam plane nigram.

Hanc habes hujus febris historiam, lector; quam sive, *scorbuticam*, sive malignam, sive pestilentem dices, nihil moror; est sane valde funesta, atque haud paucal prodit magnæ putrescentiæ, etiam & contagii, signa. Quicquid est perparcam, si modo ullam admittit sanguinis detractionem, ex majore vena saltem, sine stupenda virium jactura — Vomitus autem plerumque moveo, seu promoveo potius, quia sponte fere urget semper; alvumque *clysmate* duco, si sit astricta. Mitioribus postea utor *alexipharmacis*, iisque subausteris, & acido imbutis, inter quæ vix meliora, nedum tutiora, probo quam vinum ipsum rubrum cum aquæ ferme dimidio, in quo porro macis & cinnamomi paululum sit injectum, adjecto malo *aurantio* Hispalensi tosto, ac deinde contuso & infuso: jucundus admodum est hic potus & morbo percommodus. Si vis alia, *Tinct. Rosar. Decoct. Lusitan.* cum *Aqua Cinnam.* & *Spir. Lavend. C.* paululo, serum & lactis vinosum tenuissimum, locum habent: nec sitientibus, atque avide desiderantibus, nego subinde vinum *pomaceum* subtepidum: sales *alcalinos volatiles* & *Spiritus*, ut dicuntur, respuo prorsus*, nisi cum *salinis* utor *haustibus*. Hæc, vel similia, præcipio ad febris usque statum; interea vero si vehemens sit insania, cucurbitulas scarificatas humeris cervicibusque applicari jubeo, sæpe dein *epispastica*, maxime si languor opprimit. Blanda porro ecco-

X 5

protica

* Vid. Libr. de Febr. Cap. de putrid. malign.

protica exhibeo tertiis, quartisve diebus, si alvus est dura nimis — in ipsa febris ἀκμῇ parum certe moveo, perspicuens diligenter quid natura faciat, aut ferat.

Si perficca cutis est & aspera, *Camphoram* cum *Theriac.* aut *Mithridat.* nec non *Haust. salinos volatiles*, aut *Jalap. Camphorat.* cum *Aceto*, *Spir. Lavend. C.* & *Syrupo crocino* præscribo; idque ut plurimum bonis avibus, si blandi sudores erumpunt, & floridæ pustulæ urentes — Si parum hæc proficiunt, alia tentanda est via, per alvum nempe ac urinam; adeoque *rhabarbari* paululum cum *sale Succino* & nuce *Myristica* alternis saltem diebus ministro, aut *mannam Calabrinam*, *Cremorem Tartari* & *Tartar. solubil.* — Si liquidus nimium sit venter, compesco fluxum paulatim *Tinct. Rosar. Decoct. alb. Confect. Fracastor.* fortiora opiata suadeo rarissime; si *theriacam* excipias — Jam summa mihi cura est sustentandæ naturæ molli restaurante victu, & medicina idonea; *panatellam*, juscula leniora, panem bis coctum ex vino, *gelatinam C. C. sago*, *salap.* aliaque hujusmodi præcipio — pro medicamento autem maxime *Tinct. Cortic. Alexipharmac.* quæ mihi longo jam tempore, febre putrida declinante, explorata atque probata est; atqui huic semper ferme adjicio *Elixir. Vitrioli* — Hac *methodo* hercle, ac medicina, per plurimos ex ipsis orci faucibus ereptos novi, — surdastros tamen semper, atque stupidos diu; lingua indelebili pene nigrore fucata.

Tota pluviae quantitas, Anno MDCCXLV,
Dig. Dec.
fuit = 35.476.

Nova Luna 10. JANUARIO. *Plena Luna* 26.

Ventus fuit parum constans hoc mense, sæpe frigidus, sæpe nimbosus: ab Oriente spiravit initio, septimo & octavo Libs irrui; a x. ad xvi. Eurus aut Boreas, inde ad vicesimum nonum Corus, aut Libs, hic plerumque furens, ad ipsum finem Boreas.

Pluvia 1. ^u 7. ^u 8. 16. 18. ^u 19. 20. ^u 21. ^u 23. 24. Dig. Dec.
25. 26. 27. 28. Grando 29. Nix 30 = 3.496

Procella 23, Nocte S W b W 4^x — 25. tota die S W b W 4.

— 27. p. m. S W b W 4^x. Circius vehementissimus nocte inter 27 & 28. Rigidum gelu & maxima pruina 5. 6. 13. 14. 15. 29. 31, maximus halo circa Lunam 20 vesperi.

✕ Altitud. maxim. 5. 30,4. N E 1, } media 29,8 $\frac{7}{8}$.
— — minim. 27. 28,8. }
Dies frigid. 31. 70. N E 1. } = 59 $\frac{8}{8}$.
— tepid. 25. 50. }

Variolæ, adhuc *epidemicæ*, plerumque autem *fat*is benignæ; inter nautas tamen & milites haud paucos occidunt: An quod a pravo victu & pessima *spirituum ardentium* ingluvie horum sanguis fit magis acris & putridus? an quod a *scorbutica* lue, imo &c. sæpissime *venerea*, polluatur? — Hoc sane perpetuum est, quod omnis febris *epidemic*a magis est inter hos pestifera, quam vel *opidanos* inter aut *ruricol*as. *Faucium* tumores, & *tusses* undique, *morbilli* plures & *rheumatismi*.

Febris putrida, *nervosa*, maligna usque grassatur, pluresque opprimit, atque multos diu admodum trahit.

Peri-

Peripneumoniæ multæ mali admodum moris cum spirandi difficultate & anxietate maxima, dolore in imo pectoris, atque tussicula perpetua, perpauca sæpe exantlante, sæpe saniosa prorsus. Hæ post tres, quatuorve dies in malignam *nervosam*, aut *petechialem* degenerant, viresque summo-pere deprimunt — Vix sanguinis missionem adeo admittunt, multo minus repetitam aut largam. *

Nova Luna 9. FEBRUARIO. *Plena Luna* 24.

Boreas perflavit sæpissime durante *Februario*, aëremque fecit ficcum & valde frigidum, acri admodum sæviente gelu; altam interea tenuit stationem *Barometer* — interdum vero Libs procellosus *Mercurium* depressit maxime, multamque demisit pluviam.

Pluvia $\frac{.}{7.}$ $\frac{.}{8.}$ 15. $\frac{.}{17.}$ $\frac{.}{18.}$ $\frac{.}{19.}$ $\frac{.}{20.}$ 21. $\frac{.}{24.}$

26. 27. Nix multa $\frac{.}{14.}$ — 28. Grando gravis 18.
Dig. Dec.

Nocte = 2.680.

Procella 18 Nocte S W b W 4x. AB. 9. H.
8. NE 1 — 27 NE 2^x.

♀ Altitud. maxim. 2. 30,6. ENE 1. } media 29.7 $\frac{27}{28}$.
— — minim. 20. 28,4. SWbW 3^x.

Dies frigid. 13. 76. NNE 2. } media 64.
— tepid. 26. 52. NW 1.

Plurimæ adhuc *variolæ*, ut plurimum mitiores, nautis tamen, militibus, atque captivis adhuc valde funestæ; qui quidem evadunt, furunculis & ulceribus maxime vexantur, sæpe *hectica* febre.

Tussis

* Vid. Libr. de Febr. Cap. de Peripneum,

Tussis sævissima, *Asthma* pertinax, anginae, fauciumque tumores permultos cruciant. — *Rheumatismi*, pleuritides, ac *pleuroperipneumoniae* sunt valde frequentes.

Dominatur usque febris quædam peripneumonica, pestilens admodum pluresque opprimit: magna semper adest pectoris oppressio & præcordiorum, vehemens plerumque accedit capitis dolor, vel ipso initio cum gravi vertigine, cui mox delirium: tenuia, cruda, spumosa sæpe expuunt, interdum biliosa valde, fatis liberaliter, at parum aut nil plerumque juvantia, aliquando fœda, subnigra, & saniosa — interea haud multum urgere febris videtur, aut sitis, nec est lingua admodum sicca, muco attamen subatro frequenter perfusa. Si, adveniente morbi statu, urina (fulva prius & turbida) derepente tenuis mingitur & aquosa, sequitur mox semper delirium, brevique post crebro singultus, atque lethalis nervorum distentio — Haud raro hanc febrem solvit *diarrhœa critica*, utcunque in aliis pulmonariis sit pertimescendus (nimis saltem) alvi fluxus. Læti plerumque etiam est ominis pustularum & ulcusculorum eruptio circa labia, licet molesta sit admodum — Papulae porro rubrae, urentes per totum fere corpus, olido succedentes sudori, morbum, præcipue sub declinationem, prorsus judicant tota fere post desquamante cuticula * — Hoc adeo notans iudicium, quibusdam *vesicatoria* a capite pene ad calcem usque applicari jussi; verum enimvero opinione minus jam successit experimentum.

Nova

* Vid. Lib. de Febr. l. c.

Nova Luna 11. MARTIO. *Plena Luna* 26.

Prior *Martii* pars fuit sicca valde & frigida, Borea flante cum rigido sæpe gelu; a XII. ad XXI. Vulturnus plerumque, pluvia frequenter cadente, Libs interdum; ad finem recurrit Boreas.

Pluvia 6. $\frac{1}{7}$. $\frac{1}{14}$. $\frac{1}{16}$. 17. 19. $\frac{1}{20}$. $\frac{1}{21}$. 22. $\frac{1}{23}$.

24. 25. $\frac{1}{26}$. 29. $\frac{1}{30}$. 31. Nix $\frac{1}{8}$. 10. 11.

Dig. Dec.

= 3.072.

AB. 14 vesperi & nocte W N W 1. Peramplus halo circa lunam 15 vesperi W S W 1^x, maxima nebula mane, vento silente.

☿ Altitud. maxim. 3. 30,5. N E 1. } media 29.5 $\frac{27}{30}$.
— — minim. 23. 28,8. S S W 3. }

Dies frigid. 1. 69. N E b E 1. } media 56 $\frac{2}{3}$.
— tepid. 18. 84. S E b E 2 }

Variolæ sporadicæ; morbilli jam iterum sunt valde frequentes, sæpe etiam malæ prorsus naturæ; quippe qui, haud facile erumpentes, luridi sunt, aut lividi, quibus semper accedit tussis sævissima, interdum peripneumonia gravis, aliquando tormenta dira — Tusses, laboriosæ admodum, creberrimæ; angina & *asthma* frequens valde. Plures sanguinis sputo corripuntur: tabidi & pulmonarii jam pessime se habent.

Ubique nunc sæviunt peripneumonix & pleuro-peripneumonix, æque sæpe valde periculosa: sunt, qui nihil omnino expuunt aut difficillime, sunt, qui cruda & tenuia, parum aut nil juvantia, sunt etiam, qui saniosa prorsus ac valde olida: Qui vero cocta, liberalia sputa, pauxillo sanguine tincta extussunt facile, intra perpaucos dies morbo liberantur — atqui priora mali semper sunt ominis,
nec

nec pectus, nec præcordiorum oppressione, nec anxietatem levant, nedum febrem — Sed mox ab initio fere delirant tales, aut enormi debilitante alvi fluxu corripiuntur; qui mox omnino sputa supprimit, pessimo semper eventu — at longe melioris tessera fati est urina copiosa, turbida, plurimum subflavi sedimenti deponens; cruda vero & aquosa est admodum perniciofa, prærubra autem & parca nihil boni denunciat * — Quibus, ingruente morbo, sanguis extractus est, eique superfertur pellicula tenax, pallide flavescens, cito plerumque relevantur; contra vero, ubi solutior est debito cruor, ac vel rutilans valde, vel lividus * — Pluribus erumpunt pustulæ magnæ, urentes, præcipue circa labia; frequenter etiam per humeros, brachia cruraque; idque fere semper bonis cum ægroti rebus.

Nova Luna 9. APRILI. Plena Luna 24.

Initio *Aprilis* frigida tempestas & sicca Euro spirante, die quarto rigidum gelu; post septimum ventus inconstans, plerumque tamen Vulturnus flavit, aut Aquilo; a XIX. ad XXII. Auster nimbofus; maximæ nebulæ exeunte mense.

Pluvia $\frac{11}{5}$. $\frac{1}{7}$. 8. 11. 16. 17. $\frac{111}{19}$. $\frac{1}{20}$. $\frac{1}{21}$. $\frac{1}{22}$.
Dig. Dec.

$\frac{1}{24}$. 26 = 1.960.

Procella 19 nocte S S E 4^x — 20 a. m. S 4 gravis autem media nocte S 4^x.

☿ Altitud. maxim. 27. 30,2. N b E 1. } media 29.5 $\frac{28}{9}$.
— — minim. 20. 28,9. S 4. }
Dies frigid. 4. 62. E b N 1. } media 48 $\frac{18}{9}$.
— tepid. 29. 36. W N W. 1. }

* Vid. Lib. de Febr. l. c.

Vario-

Variolæ plurimæ, morbilli epidemici; morbillis decedentibus sæpius accedit sævissima tussis & affectio peripneumonica, haud raro hæmoptoe, interdum *diarrhœa* profusa & obstinata valde; multos hinc enecant pueros, imo & nonnunquam adultos.

Angina frequens valde, nec non pleuritis, peripneumonix veræ, & *pleuropneumonix* permultæ, æque sane haud raro lethales, maxime cum angina subito in *pulmoniam* mutatur — est etiam & jam passim insolita quædam pleuritis (si sit ita nominanda) ubi inter scutula operta acerrimus sævit dolor, qui ad sternum * usque protenditur, maxima cum gravitate pectoris & spirandi labore, interdum & per totam dorsi spinam & hypochondrium immaniter cruciat, adeo ut vix respirare aut tussire valeant, imo omni molimine tussim aliquando suppressere nituntur ob doloris vehementiam; volunt se subinde in lecto esse erectos, mox vero ejulantes, impatientes, atque prorsus impotentes recumbunt; urget adeo jactatio perpetua, anxietas horrenda, tormentum intolerabile, verbo *Hippocratico*, *δυσφορίᾳ* gravissima; continua vexantur tussicula, at parum aut nil expuunt, vel spumosa & cruda penitus; accedit interdum singultus, quem paulo post sequitur inæqualis, frigidus, oleosus sudor, brevique mors. Est profecto acutissima febris, & intra perpauca dies jugulat: robustum quendam juvenem quarto die inter tussendum violenta nervorum distentione correptum atque abreptum novi. — Estne morbus, quem *Hippocrates* *πλευρίτιν ἐν νῶτῳ*, seu *νωτιάδα* ** vocat, inflammationem nempe vel *diaphrag-*

* Lib. de Febr. Cap. de Pleuritide.

** Sic describitur, Libr. 2. de Morb. Sect. 54. Edit. *Linden.*

phragmatis, vel *mediastini* — Vox *paraphrenitis*, qua denotatur inter recentiores inflammatio *diaphragmatis*, nusquam apud *Hippocratem* legitur.

Summum hic præsidium est in opportuna sanguinis missione, *nitrum* mox & *sperma ceti* cum *camphoræ* paululo opitulantur; porro *oleum lini recens*, sive *amygdalinum* cum *Elixire asthmatico* & *diacodio*, post venæ sectionem admodum juvare videtur, ad relaxanda nimirum vascula nimis contracta, & ad dolorem sedandum — Quibus autem pleuriticis, aut peripneumonicis, sputa copiosa, subflava, & modico sanguine tincta ejiciuntur facile, in vado brevi sunt, idque sæpe intra perpaucos dies — Horum sane vix aliquis perit — Non ita tamen si cruda, tenuia, spumosa, aut mere sanguinea, aut saniosa, aut atra, extussuntur: Hi namque perpetua vexati tussi parum aut nil levantur, tandemque vix undecim elapsis diebus morbo succumbunt, vel purulenti fiunt & tabidi — Pedum tumores aquosi, febricula sub noctem, tussicula sicca & spiritus difficilis, hoc denunciant, quæ profecto jam post febres pulmonarias, multo sunt frequentiora solito.

Alia igitur atque alia in morbis, nunc vulgaribus, tractandis, datur erroris ansa; plures enim ab ipso febrium initio profusis sudoribus corripiuntur, alii *diarrhœa* serosa prælarga — crederes hæc forsan morbi solutionem — minime vero; quid quod, exhausta liquidior sanguinis parte, restant humores magis crassi, confusi, acres —

Fateor

den. Πίγος καὶ πυρετός καὶ βήξ καὶ δύσπνοια λαμβάνει —
πονέει μάλιστα τὸ μετὰφρενον καὶ τοὺς βουβῶνας — rursum
Lib. 3. Sect. 21. τὸν νῶτον ὀδυνᾷται ὡς πληγῆς καὶ σίγει καὶ
ἀναπνέει ἀθρόον — Ὀδύναι δὲ ὁξείαι διὰ τῆς ράχιος ἐς τὸ στή-
θος καὶ εἰς τὸν βουβῶνα τένουσι.

Fateor me nuperrime vidisse duas, tresve febres *mesentericas* (ut cum *Baglivio* loquar) per alvi fluxum judicatas, sed erat sub *diaphragmate* tensio, dolor, gravitas; perperam vero pro peripneumoniacis *epidemicis* habitæ fuerunt; atque in harum una curanda mirabatur maxime *Chirurgo-Pharmacopæus* me potionem *catharticam* imperasse, omiffa venæ fectione; at id ego satis feliciter.

Summa porro opus est cautela in *pulmonaria* quadam notha medenda, quæ jam etiam subinde occurrit; ita lento incedit pede, ita parum doloris urget, dum maxima interim adest oppressio, ut vix de ægritudine querantur priusquam de ægrotis actum est penitus, quos servassent ex facili matura auxilia, scilicet *epispastica* frequentia, lenis alvi ductio, & *emetica* blanda, diluentia insuper idonea, ac detergentia modica; hæc inter serum lactis *sinapium* primum fortasse obtinet locum — Adjiciam vero & hoc obiter, quod perraro sanguis in hoc morbo, nisi cucurbitulis scarificatis, atque ipso initio, detrahatur commodè.

Nova Luna 9. MAIO. *Plena Luna* 23.

Incipiente mense perpulchra & valde calida tempestas, post autem frigidior, aliqua cadente pluvia: ab undecimo ad decimum octavum sudum rursus & fervidum cælum, aspirante Subsolano, maximæ interim rorationes — inde vero pluvia frequens ad finem usque, Africo flante a xxvi. ad xxxi.

Pluvia 4. 5. 7. 12. 17. 19. 20. 21. 25. 27.
 Dig. Dec.
 29. 30. 31 = 1.760.

Fulgur

vere, nihilominus tamen sævissima tussis, interdum peripneumonia vehemens, hos etiam comitatur.

Variolæ quoque plurimæ, eæ autem benignæ sunt ut plurimum, utcunque exitiales sunt pustulosi morbilli — Pleuritides & peripneumoniæ passim; *dysentericæ* aliquæ. *Ophthalmiæ* & lippitudines jam sunt frequentes admodum.

Nova Luna 7. JULIO. *Plena Luna* 21.

Pluvius, algidus & tristis fuit hic mensis, *Decembrem* potius quam *Julium* adesse crederes; venit plerumque ab Occidente ventus, vergens ad Austrum, & sæpe nimbosus; Aër interim nebulosus & maxime humidus — omnes fructus crudi sunt prorsus & plane fatui — Myriades Limacum perreptant undique, vix autem volitat papilio — Omnium arborum frondes foliaque, mare spectantia, nigra sunt & veluti combusta.

Pluvia $\overline{1.}$ $\overline{2.}$ $\overline{5.}$ $\overline{6.}$ $\overline{9.}$ $\overline{10.}$ $\overline{14.}$ — $\overline{16.}$ $\overline{18.}$ $\overline{19.}$ $\overline{20.}$
 $\overline{21.}$ $\overline{22.}$ $\overline{23.}$ — $\overline{24.}$ $\overline{25.}$ $\overline{26.}$ $\overline{28.}$ $\overline{29.}$ $\overline{30.}$

Dig. Dec. $\overline{1.}$ $\overline{2.}$ $\overline{3.}$ $\overline{4.}$ $\overline{5.}$ $\overline{6.}$ $\overline{7.}$ $\overline{8.}$ $\overline{9.}$ $\overline{10.}$

= 3.604.

Fulgur & tonitru 5. p. m. plurima fulgura 18 nocte, levis procella 18 nocte S S E 4x Dies æstuosi 15. 16. 17. 18.

✕ Altitud. maxim. 8. 29,9. W 1. } media 29.5 $\frac{12}{9}$.
 — — minim. 19. 29,2. S W 3x.
 Dies frigid. 24. 38. W b S 3. } media 31.1 $\frac{8}{9}$.
 — fervid. 17. 18. S 1.

Variolæ modo valde *epidemicæ*, magisque etiam funestæ; utpote sæpe confluentes, fessiles & atræ, sæpe crudæ, aquosæ, diffuentes; dira interdum exci-

excitant in faucibus ulcera, & enormem salivæ acris fluxum. — Morbilli adhuc grassantur.

Ophthalmicæ perplurimæ cum *epiphora* maxima atque acerrima, dolor dentium porro plurimos torquet: in utrisque crebra *catharsis* juvat magis quam missio sanguinis — Gravis in pulmones distillatio plures infestat, unde haud pauci in *phthisin* pulmonariam incidunt. — Multi *rheumatismi* & pleuritides incipiente mense, nec non peripneumoniæ aliquando cum *petechiis*.

Non solum *variolæ*, sed & omnes pene morbi, jam peioris sunt indolis quam regnante vere — An ab algida udaeque tempestate cutis meatus occludente, ac perspirantes humores reprimente; unde serosa genita est colluvies, eoque forsan acrior, quo magis bilem sanguinemque adusserat fervor solis immodicus durante *Majo*; qui porro e terra immensam vaporum copiam excitavit, quam & *Junio* & *Julio* mense, sub forma pluviae, ruentem vidimus?

Terribilis jam sævit *scorbutus* inter nautas, præcipue quos secum reduxit *Martin*, classis occidentalis præfectus; excruciantur perplurimi ulceribus fœdis, lividis, sordidis ac valde fungosis: mirum est profecto, & insolitum, quam brevi tempore spongiosa caro, fungi ad instar, his ulceribus succrescit, etsi paulo ante scalpello derafa, eaque interdum ad magnitudinem enormem. — Non solum miseris his, at vere utilibus hominibus, per se infensa est maxime *scorbutica* lues, sed & illos etiam omni pene morbo, qui ab humorum corruptione pendet, obnoxios admodum reddit; febribus nempe putridis, malignis, *petechialibus*, pessimo *variolarum* generi, *dysentericæ* cruentæ, hæmorrhagiæ, &c. — multo magis adeo bonis his fuit exitio quam bellicum fulmen.

Nova Luna 5. AUGUSTO. *Plena Luna* 19.

Favente tandem ter optimo numine effulget apricitas, exoptata diu; læta hinc messis, optimæ segetes. Ventus per initia Septentrionalis, post undecimum deflexit ad Occidentem, at a vicesimo tertio spiravit rursus ab Arcto ad finem usque fere: intervenit sæpe Malacia, Libs raro, aër vero frequenter nebulosus & humidus; maximæ sæpissime rorationes.

Pluvia 8. 14. 15. $\frac{9}{16}$. 18. $\frac{11}{24}$. 25. $\frac{1}{26}$. 30.

Dig Dec.

31 = 0.846.

Fulgur & tonitru 24 primo mane.

♀ Altitud. maxim. 28. 30,0. NNE I. } media 29.7 $\frac{1}{2}$.
— — minim. 16. 29,5. SW 3x. }

Dies frigid. 27. 36. N I. } media 30 $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{8}$.
— calid. 3. 24. N I. }

Variolæ adhuc *epidemicæ*, quædam parvæ, atræ, malignæ, jam sæpe cum enormi alvi fluxu subatro. *Ophthalmicæ* & dentium dolores acerbi usque frequentes. Perpauci aliter morbi.

Læte jam tandem canunt cicadæ, reviviscunt demum papiliones. Nuces avellanæ copiosissimæ.

Nova Luna 4. SEPTEMBRI. *Plena Luna* 18.

Atmosphæra fuit admodum humida, imo & interdum algida hoc mense; Libs sæpe initio, sæpe Corus, medio mense Aquilo, qui paulo sicciorrem & frigidiorrem fecit aërem, adeo ut xiv. & xxi. gelaret.

Pluvia $\frac{11}{2}$. 4. $\frac{11}{4}$. 5. $\frac{1}{7}$. 9. 10. $\frac{1}{12}$. 15. 16. 18.
19.

Dig. Dec.

19. 22 — ^u23. 24. ^{'''}26. [']27. ^{'''}29. 30 = 3.178.
 Procella 5 p. m. S W 4_x — 29 p. m. S W b S 4.

♀ Altitud. maxim. 14. 30,1. N b E 1. } media 29.6 $\frac{5}{30}$.
 — — minim. 29. 29,0. S W b S 4. }
 Dies frigid. 21. 54. N b E 2. } media 39 $\frac{21}{30}$.
 — tepid. 9. 33. W 2. }

Variolæ usque graffantur: *Ophthalmicæ* frequen-
 tes, ut plurimum humidæ. — Tumores faucium,
 capitis, colli cum sævo dentium dolore innume-
 ros vexant; destillationes ac tussis plurimæ —
 Febres miliares compositæ, (nempe ubi cum pa-
 pulis subalbidis commisceantur pustulæ rubræ) cre-
 bræ sunt valde apud *Totness*, & in australi *Devonia*.

Nova Luna 3. OCTOBRI. *Plena Luna* 18.

Frigidus insequitur *October* oriens nimirum Bo-
 reas die quarto, ad vicefimum tertium usque du-
 ravit, si decimum nonum excipias; ficcus hinc
 aër, at frigidus ut plurimum, imo interdum gelu
 haud leve; sub finem prævalebat Vulturnus.

Pluvia [']1. 2. ^u19. 21. ^{'''}23. ^u24. [']25. [']26. 28.
 Dig. Dec.

Nix & Grando 22 = 2.238.

Procella 1. p. m. S W 4 — 23. ab hora 11 a m.
 ad 4 p. m, S W 4, etsi mane acre gelu ventus-
 que N E 1 — 26 a. m. S W 4. *Circius* vehe-
 mens 25 p. m. Fulgura 23 nocte. AB. 7 N N
 E 1.

♀ Altitud. maxim. 6. 30,4. N E 1. } media 29.8 $\frac{10}{28}$.
 — — minim. 24. 28,8. S S W 3. }
 Dies frigid. 23. 64. N E 1. } media 51 $\frac{12}{28}$.
 — tepid. 1. 42. S W 4_x. }

Variolæ adhuc *epidemicæ*, sed paulo mitiores; Plures etiamnum *ophthalmia* vexantur; permulti acutissimo dolore dentium atque aurium, cum faucium ac glandularum colli tumore: tusses vehementissimæ passim, imo haud pauci jam morbis peripneumonicis & *rheumaticis* laborant.

Nova Luna 2. NOVEMBRI. *Plena Luna* 17.

Ab ipso mensis initio ad XVIII. aut Boreas flavit, aut Eurus, isque sæpe perfrigidus, cælum fuit interea frequenter caliginosum, decidente subinde pluvia; post XIX. interdum turbidus Auster, Septentrio interdum.

Pluvia $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ 8, $\frac{11}{10}$ $\frac{11}{11}$ $\frac{11}{12}$ $\frac{1}{13}$ $\frac{1}{14}$ $\frac{1}{18}$ $\frac{0}{20}$.
 $\frac{11}{21}$ $\frac{11}{23}$ $\frac{11}{24}$ $\frac{11}{25}$ $\frac{11}{26}$ $\frac{11}{27}$ $\frac{11}{29}$ $\frac{11}{30}$. Nix & grando
 Dig. Dec.

19. 22 = 3.306.

Procella 20 nocte S 4 — 21 mane S 4_x — 22 vesperi N W 4.

— — 30 p. m. S S E 4. Nebula densissima 8 Malacia.

♀ Altitud. maxim. 4. 30,2. E N E 2_x. } media 29,5 $\frac{26}{8}$.
 — — minim. 21. 28,6. S S W 3_x.

Dies frigid. 7. 68. E N E 2_x. } media 58 $\frac{4}{8}$.
 — tepid. 21. 50.

Variolæ nunc sunt moris plerumque benigni; tusses *convulsivæ* sævissimæ inter pueros undique, plurimæ admodum & vehementes etiam inter adultos cum tumore capitis, colli, faucium, sæpe & cum acerbo dentium dolore. *Ophthalmicæ* passim, nec non anginæ mucosæ: multi *rheumatismo* pertinace atque arthritide laborant.

Gignit

Gignit plerumque gelidum humidumque autumnum cœlum colluviem ferofam, quæ nunc ad caput pectusque ruit, nunc ad artus, fræquenter ad intestina defluit, unde *catarrhi*, tuffes, *rheumatismi*, *arthritidis*, *diarrhæa*, *dysentericæ* tunc temporis ita sunt communes — Quod si æstas fuerit calidior solito, subitoque excipitur frigore, gravissima sæpe mala incautis accidunt.

Nova Luna 1. —

Plena 16.

DECEMBRI. *Plena Luna* 31.

Pluit, quod solet, frequenter hoc mense, aër vero fuit crassissimus ac humidus maxime: Libs fere perpetuus ad vicesimum secundum, postea Vulturnus, aut Boreas frigidissimus ad finem usque. Densitas *Atmosphæræ Barometrum* sustinuit ad altam fatis stationem.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{2}{2}$. 3 — 5. 7 — 9. $\frac{11}{11}$. $\frac{12}{12}$. $\frac{13}{13}$. 14
Dig. Dec.

— 16. $\frac{17}{17}$. 19. 21. $\frac{24}{24}$. $\frac{26}{26}$. 27 = 2.780.

Gravis procella 12 vesperi S W b W 4^x. AB.
28. H. 7. p. m. E N E 2.

♀ Altitud. maxim. 22. 30,3. N N W 1. } media 29,7 $\frac{25}{31}$.
— — minim. 12. 29,0.
Dies frigidiss. 31. 76. N E b E 2. } media 56 $\frac{13}{31}$.
— — tepid. 5. 50. S W 2. }

Peripneumoniæ passim, *ophthalmicæ* plurimæ, tuffes undique, eæque sævissimæ, quibus tamen vexantur maxime pueri, quos non raro distentio etiam nervorum corripit. Arthritis pertinax ac *rheumatismus* multos cruciant.

Variolæ adhuc sæviunt plurimum, multoque magis jam funestæ sunt, confluentes quippe, crudæ, luridæ, aquosæ; quædam diffluunt valde ac nigrescunt. — Per salivæ ductus & alvi quærit plerumque

rumque natura morbi exitum — Urina copiosa *hypostatica* nunquam non juvat — lenia adeo *ecceprotica* cum *diureticis* semper fere exhibeo declinante febre: morbo autem crescente, seu potius ad statum procedente, quæ concoctionem humorum promovent; qualia sunt *Lap. Contrayerv. Myrrh. Mosch. Mithridat. Theriac. Andromach. &c.* — Nec verum tacere debeo eximias *ficuum* & *cicerum* dotes ad *variolas* maturandas, quas tanti fecerunt *Arabes*; apud quos lane prima *variolarum* historia — Imo & ipsa potione *coffee* hunc ad finem utor sæpissime feliciter.

Totius pluvix quantitas, Anno MDCCXLVI,
Dig. Dec.
fuit = 31.990.

Plena Luna 15. JANUARIO. *Nova Luna* 29.

Incipiente anno asperrimum gelu ventusque borealis, post diem quintum Vulturnus pluviaque aliqua, mox Libs perpetuus, atque tristis ac uda tempestas: aer maxime humidus, sol fere nullus, pluvix plus fatis.

Pluvia $\frac{1}{5}$. 6. $\frac{1}{8}$. $\frac{1}{9}$. $\frac{1}{10}$. $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{13}$. $\frac{1}{14}$. $\frac{1}{15}$. $\frac{1}{16}$.
 $\frac{1}{18}$. $\frac{1}{19}$. 20 — $\frac{1}{21}$. $\frac{1}{22}$. 23. $\frac{1}{25}$. $\frac{1}{26}$. 27. $\frac{1}{28}$. 30.
Dig. Dec.

31. Nix 5. Grando 20 = 4616.

Procella 15 nocte S 4. Levis AB. 2 H. 10.
p. m. E N E 2.

♀ Altitud. maxim. 1. 30,2. E N E $3x$. } media 29,4.
— — minim. 16. 28,8. S S W $3x$. }

Dies frigidissim. 1. 78. } media 57.
— tepid. 30. 50. S b E 3. }

Multi *variolis*, plures febre *catarrhali* laborant;
tusses innumeræ, sæpe vehementes; *rheumatismi*
valde

valde frequentes, nec non dentium sævi dolores cum tumore capitis, colli, fauciumque. — Tussis *convulsiva* pessima inter pueros grassatur pluresque strangulat; sanguinem persæpe expuunt, & haud levis interdum accedit febris: His sanguinem mittere necesse est prorsus, imo aliquando bis, terve, etiam bimulis trimulisve; accurata dein institutuenda est *diæta*, blanda porro ventriculi & intestinorum purgatio; quibus peractis corticis peruviani decoctum cum tussilagine & balsamo Tolutano, uno alterove apposito *vesicatorio*, morbum fugat; sed commodum est omnino respirationem expedire & *anacatharsin* solutione Gum. Ammoniac. in expressione. Milleped. ex aqua Hyssopi. Atqui profecto haud pauci exinde in *rachitidem* incidunt — Scabies permultos inter populum atque nautas infestat.

Plena Luna 14. FEBRUARIO. *Nova Luna* 28.

Per initia mensis perflavit Notus, intercurrente subinde Coro; pluvia autem quotidie ad decimum quintum usque, aërque humidissimus: tunc Boreas ficcus & gelidus valde, sub finem Vulturus velox, ac pluviosus.

Pluvia $\frac{u}{1.}$ $\frac{u}{2.}$ $\frac{u}{3.}$ $\frac{u}{4.}$ $\frac{u}{5.}$ $\frac{u}{6.}$ $\frac{u}{7.}$ $\frac{u}{8.}$ $\frac{u}{9.}$ $\frac{u}{10.}$ $\frac{u}{11.}$ $\frac{u}{13.}$

$\frac{u}{14.}$ $\frac{u}{15.}$ $\frac{u}{25.}$ $\frac{u}{26.}$ $\frac{u}{27.}$ $\frac{u}{28.}$ Nix 16 17.

Dig. Dec.

= 2.888.

Procella 5. p. m. W S W 4—8 a. m. S S W 4—13 Nocte S W 4x.

♀ Altitud. maxim. 23. 30, 2. ENE 1^x. } media 29, 6.
— — minim. 14. 29, 0. S W. 3. }

Dies frigid. 18. 73. ENE 2. } media 58 $\frac{2}{3}$.
— tepid. 4. 50. S W b W 2^x. }

Vario-

Variolæ adhuc frequentes: febres aliquæ putridæ, nervosæ, lentæ: gravissimi passim *asthmatis paroxysmi*, tussis admodum sævit. Pleuritide plures aut *pleuroperipneumonia* corripuntur, plurimi *rheumatismo* cruciante: scabies est perfrequens undique.

Colica quædam biliosa jam plurimos torquet, acerbissimus stomachi dolor, ac perpetuæ vomitiones urgent, nunc alvus est citissima, nunc astricta maxime; ne vel *catharticis* fortissimis cedens priusquam missione sanguinis, fotuque emolliente, solvitur nimia intestinorum strictura:— hæret sæpissime in ima parte dextri hypochondrii acutissimus dolor & pertinax admodum, cujus causa plerumque est a stercoribus induratis ad finem *ilei* atque *coli*, principium compactis— vix utique lenitur nisi laxante fomento, & *clysmate* frequente, quæ fæces emolliunt: cave vero ne fomenta sint calida nimium.

Plena Luna 15. MARTIO. *Nova Luna* 29.

Venit ab Oriente ventus ab ipso *Martii* initio ad diem vigesimum tertium fere, ad Septentrionem autem vergens plerumque: siccam hoc fecit *atmosphæram* & frigidam, imo & pulcherrimam sæpe, Libs post, ad finem Aquilo.

Pluvia 1. $\frac{1}{9}$. 10. $\frac{100}{19}$. 23. $\frac{1}{24}$. 25. $\frac{1}{26}$. 27.

Dig. Dec.

Nix 8. 9. Grando 10. 20 = 1.700.

Procella 26 noctu S W 4x. AB. 22. H. 9. p. m. N b E 1.

a 12. ad 18. ad solis occasum nubes pulcherrimæ puniceæ quotidie.

§ Altitud.

☿ Altitud. maxim. 14. 30,4. ENE 1. } media 29.7 $\frac{8}{28}$.
 — — minim. 20. 28,9. N b E 1^x. }
 Dies frigid. 8. 66. N N E 1^x. } media 58 $\frac{10}{28}$.
 — calid. 30. 46. N 1. }

Variolæ passim; fœda scabies ex undique: *asthma* grave multos vehementer premit, tussis sævissima plures.

Haud pauci *apoplexia* *, vel *hemiplegia*, correpti occidunt — Hoc sæpe, notante *Cole de apoplexia*, post diu durans frigus accidit, cui suffragatur experientia: An a densato nimium sanguine? an ab imminuta *perspiratione*, retentis crassioribus? an a magno *atmosphæræ* pondere totum corporis habitum valide premente, unde plus satis sanguinis ad cerebrum ruit, calvaria sustinente aëris pressuram? tali tempestate utique cavendum est hominibus, capite largo, corpore quadrato, collo brevior: parce vivendum est, leniter purgandum: venienti occurrere morbo.

Pleuritides & peripneumoniæ admodum vulgares; sanguis jam fere semper densus est valde, ac tenace obductus glutine; tussis effera, sputa tamen libera satis & plerumque modico sanguine tincta: ubi vero parum aut nihil exantlatur pessimum; nec melius multo si parva, rotunda, vel spumosa tantum. Quæ ex *ficu*, *melle*, *oleo*, *nitro*, *spermate cœci* experior perquam commoda, potionem porro emollientem, liberalem, qualem præbet *decoctum pectorale* dictum, aut *serum lactis herba taraxaco* imbutum, cui inest dissolvendi lentorem sanguinis vis maxima; præsertim si incoquitur
 simul

* *Ramazzini* Apoplexias recenset inter morbos grassantes per valde frigidam & siccam atmosphæram. Vid. *Constitut. Epidem.* 1691. Sect. 3.

simul *radicis graminis* * plurimum & *Eryngii* — Si vis alia, præstat *hedera terrestris*, *tussilago*, *adiantum*, *helenium*, *hyssopus*, *pulegium*, *flos papaveris erratici*. — Utilia hæc sane sunt & contemnenda neutiquam, atavis utique proavisque nostris medicina indigena. — Sed enim hodie homunciones fastidiosi herbas ab Indis *Theam* scilicet, *Sarsam*, *Chinam*, *Ginseng*, & nescio quid ultra expetunt — Ast abitote tandem vos delicatuli nequioris ævi pessima progenies.

Plena Luna 14. APRIL. *Nova Luna* 28.

Hoc quoque mense ventus fuit plerumque orientalis, nunc ad Austrum, nunc ad Arctum flectens, aër interim sæpe tenuis satis; a XIII. autem ad XVII. aut Libs, aut Auster maximæque nebulæ: Malacia XXII.

Pluvia 5. 8. 13. 14. 16. 17. 18. 23. 24. 26.

Dig. Dec.

28 = 3. 100.

♂ Altitud. maxim. 1. 30, 2. E 1. } media 29. 7 $\frac{8}{30}$.
— — minim. 24, 29, 2. E b N 1. }

Dies frigid. 11. 55. N E b N 1^x. } media 43 $\frac{2}{30}$.
— tepid. 31. 36. S S E 1. }

Paucæ nunc *variolæ*; pleuritis & peripneumonia adhuc frequens admodum, indeque quidam in pulmonis vomicam incidunt, unde facti sunt tabidi: hoc his accidit præcipue, qui parum aut nihil expuunt ante diem quintum, aut septi-

— — — — — mum

* Vel ipsi bubulci vim graminis detergentem noscunt, observando enim sterco bubulum notant obstructions, & crustas pene lapideas cum stercore excretas, dum recentia gramina carpunt boves; qui in stabulis detenti diu, languidi fuerunt admodum & ieterici prorsus.

num *, dein cœnosa, subdulcia, vel fœtida. Plurimæ tusses vehementes *asthmaticæ*, plures *phthifici* pereunt.

Febris putrida lenta multum grassatur diuque ægrotis inhæret; pectus atque præcordia vel ab initio valde premuntur, adest tussicula & faucium asperitas, vomitus frequens atque capitis dolor.

Plena Luna 13. MAIO. *Nova Luna* 28.

Incipiente mense ventus borealis, ab octavo ad vicesimum diem Corus sæpe, sæpius Africus, inde Vulturnus ad xxiv, postea Corus rursus: aer fuit initio perficcus.

Pluvia 6. 10. 11. 12. 14. 15. 17. 19. 21. 22.
Dig. Dec.
23. 25. 30. 31 = 2.108.

♂ Altitud. maxim. 7. 30,1. N N E 1^x.
— — minim. 22. 29,2. S S E 2^x. } media 29.5¹⁸/₃₀.
Dies frigid. 1. 42 E N E 1^x.
— calid. 24. 28. S S E 1. } media 35¹⁴/₃₀.

Principio mensis erucæ innumeræ, omnia devorantes jam pluviis demersæ, perimuntur.

Febris lenta putrida adhuc dum haud paucos invadit. *Ophthalmice*, & *rheumatismi* aliqui; morbi *pulmonares* passim: multi *phthifici*.

Plena Luna 11. JUNIO. *Nova Luna* 26.

Humilis fuit *Barometri* statio toto *Junio*, pluvia multa, aer humidus, ventus prorsus inconstans, austrinus tamen prævaluit; interfuit Boreas a xvii. ad xxii.

Pluvia

* Vid. de aëre & morbis epidemicis, Vol. i. p. 76.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{3}{3}$. $\frac{4}{4}$. $\frac{5}{5}$. $\frac{6}{6}$. 9. 11. 14. 16. $\frac{24}{24}$. $\frac{25}{25}$.
 Dig. Dec.
 26. $\frac{27}{27}$. $\frac{28}{28}$. 29. Grando $\frac{1}{9} = 3.372$.
 Fulgur & tonitru e longinquo 11 noctu.

♀ Altitud. maxim. 21. 29,9. NNE 1^x. } media 29.4 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{10}$.
 — — minim. 25. 29,1. S W bW 2. }
 Dies frigid. 1. 42. N 1. } media 32 $\frac{2}{3}$ $\frac{8}{10}$.
 — calid. 12. 24. S. 1. }

Febris pulmonaria jam non ita frequens est, tussi autem & *rheumatismo* plures vexantur; pluviosa hæc & infausta tempestas nocet plurimum tabidis.

Febris putrida lenta * huc usque multum sævit, atque haud paucis funesta est—dolet initio finciput, occiput, dorsum, mox præcordia; adestque fœdus & amarus in ore sapor, nausea, vomitio, lingua valde squalida, tandemque nigra est prorsus, accedit porro sæpe singultus; statu morbi, die sexto, vel septimo puta, fere semper delirant, pauloque post interdum veternosi succumbunt: raro absunt tremores & tendinum subsultus—Urina nunc crassa, parca, rubra, vel subnigra est, nunc cruda valde & aquosa: sæpe flavescit cutis, sæpius oculi album—tumet admodum aliquando & indurescit abdomen; hoc in casu, five arte, five sponte fluit alvus, ægrotantibus levamento est; biliosa namque multa & interdum atra prorsus deijciuntur—hoc vero his præcipue accessit, quibus per initia nullum exhibitum fuit *emeticum*, quod certissime hæc febris desiderat—quid quod post vomitum plerumque erumpit sudor largus, æqua-

* Rectius hanc febrem dixerim biliosam, seu mesentericam; nam etsi diu admodum plerumque trahit ægrotantes, bilis acris & abundantis valde prodit indicia.

æqualis, ingens cum pustulis prurigo, recedente ut plurimum morbo; idque maxime si libere descendit venter, pauloque post turbida, multa, fulva, subsidens urina. Profecto hanc febrem abigit interdum sudor, interdum alvi fluxus: utrum poscit, his notis utor; si pruritus urget & in cute quasi morsus, potissimum si papulæ apparent, moderatis *diaphoreticis* pugno; si ructus, si flatus, si abdominis tumor, leni *cathartico*. — *Pulv. Contrayerv. C. Julep. Camphorat. cum aceto, Theriacæ Andromach. pauxillum* ad sudores eliciendos conferunt; ad alvum movendam *Rhabarbar. Mann. Sal. Mirab. Glauber. Crem. Tart.* — Omnia ex *Aloe* nocent — interea vero sive per alvum, sive per cutim, moveo, multam diluentem demulcentem potionem præcipio, cui admisceo — insuper ad urinam ciendam aliquid, *Sp. Natri* dulc. scilicet, *Sal. Succin. Nitrum*, &c. — vix sane certius signum salutis occurrit quam plurima, lutea, *hypostatica* urina, die nempe undecimo, aut decimo quarto.

Plena Luna 10. *JULIO.* *Nova Luna* 26.

Die *Julii* quinto cessere pluviae, multoque lætior successit tempestas, & sol fervidus valde, flante Coro primum, dein Euro, mox Borea intercurrente, etiam subinde Malacia: sub finem ventus aquilonius dominabat.

Pluvia 1. 2. 3. 5. 16. 28. 29 = 1.142. Dig. Dec.

☿ Altitud. maxim. 21. 29,9. ENE 2^x. } media 29.6 $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{4}$.
— — minim. 3. 29,2. SW 3. }

Dies frigid. 4. 34. WNW 2^x. } media 24.
— fervidiss. 18. 13. ENE 1. }

Febres aliquæ putridæ lentæque adhuc: quædam peripneumoniæ, præcipue nothæ; *rheumatismi* passim, & *ophthalmicæ* humidæ plurimæ — Ex quo autem pulchra calidaque tempestas eluxit, paucissimi, ut solet, apparent morbi hoc anni tempore, modo nempe cælum sit apricum. *

Plena Luna 9. AUGUSTO. *Nova Luna* 24.

Parum elata fuit *Barometri* statio hoc mense, *atmosphæra* autem perficca & fervida maxime; afflavit Eurus sæpissime, Boreas frequenter, Corus sæpe, Libs rarissime.

Dig. Dec.

Pluvia 2. 3. 15. 16. 17. 25. 28 = 0.564.

Maximæ rorationes creberrime: fulgur & tonitru e longinquo 25.

Infinitæ muscæ, vespæ, & papiliones omnigeni, erucarum vis immensa, cicadæ undique lætissime garriunt. Omnes rivuli & omnes fere putei arescunt ob æstum enormem.

§ Altitud. maxim. 30. 29,9. N N E 1. } media 29.6.
— — minim. 15. 29,2. W b S 2. }

Dies frigid. 16. 30. N W 2. } media $21\frac{1}{3}$.
— fervidiff. 23. 12. N N E 1. }

Pauci jam morbi, plures attamen *diarrhæa* corripuntur, imo & sæpe valde profusa: per plurimos *ophthalmia* aut lippitudo vexat. Ex ore aliqui, quidam ex naribus, plures ab *hæmorrhoidalibus* venis fundunt sanguinem: mulieres largissime menstrua profundunt: totum hoc a rarefacto admodum sanguine.

Plena Luna 7. SEPTEMBRI. *Nova Luna* 23.

Per hunc mensem ventus fuit plerumque ab Occidente, nunc ad Austrum, nunc ad Septentrio-

* *Hippocr.* Aphorism. 15. Sect. 3.

trionem tendens; Aquilo etiam aliquando intervenit: aër sæpe ficcus & tenuis, sæpe autem nebulosus; initio quidem calidus.

Pluvia $\frac{''}{5.}$ $\frac{'}{6.}$ 7. 10. 12. $\frac{'}{14.}$ $\frac{'''}{15.}$ $\frac{'}{16.}$ $\frac{'}{17.}$ 20.

Dig. Dec.

$\frac{''}{21.}$ $\frac{''}{25.}$ $\frac{''}{27.}$ 28. 30 = 2.516.

Immensæ sæpe rorationes, imo interdum pruinae.

§ Altitud. maxim. 24. 30,1. Nb E1. } media 29.5 $\frac{5}{8}$.
— — minim. 16. 29,0. W 1^x. }

Dies frigid. 19. 46. NN W 1^x. } media 38 $\frac{9}{8}$.
— calid. 4. 24. Malacia. }

Febris putrida lenta passim, cui jam accedit frequenter icterus, & magnus virium languor, interdum tumor abdominis atque pedum. Alvus torminosa per plurimos ubique infestat, cholera sævissima multos, plures autem *dysenteria* mucosa ac biliosa, imo & aliquando cruenta, febre haud raro comitante; sub finem crebro erumpunt pustulae mordentes per universum fere corpus. — Adeo pene in omnibus dominari videtur acris & biliosa colluvies, quæ plerumque per alvum felicissime deicitur: per paucis nunc profecto alvi fluxus exitio est, quanquam sæpe diu admodum durat, modo diluitur probe & temperatur acrimonia, atque blande dein expurgatur saburra intestinorum. Atqui alibi, præcipue apud *Bristolienfes* & *Bathonienfes*, multo magis fuit funesta *dysenteria*.

Post fervidam æstatem constanter fere sequuntur cholerae, *dysenteriae*, alvi fluxus; perdurante enim longo ac intenso solis ardore torretur san-

guis, exaltatur bilis *, magis acres fiunt indies animalium sales (ipsum viperæ virus longe longeque magis veneficum est per calores æstivos, quam dum omnia torpent hyeme frigida.) Quandoquidem vero huic succedit frigidus humidusque autumnus, constipata cute, ad interiora ruunt acres humores, multos ideo gignit atque varios morbos, quos inter supra descriptos—cave igitur ne præpostere sistas eorum exitum per vias cuti vicarias; maximus nempe consensus cutim inter & intestina datur certissime.

Monstrat aliquatenus ideo, quod dixi supra, viam, qua in morbis autumnalibus curandis incedendum est: vernæ quippe febres plus sanguinis missionem poscunt, autumnales vero magis leni catharsi levantur—Magnus profecto ac diuturnus æstatis calor non tantum vim fibrarum enervat, sed & sanguinis compagem laxat nimis, sales autem reddit acriores atque olea animalia rancida; verbo, vasa facit debilia, humores acres, bilem abundantem & corruptam—adeoque magnus medicinæ parens dixit τῷ δὲ θέρους—ἡ χολὴ αἰεῖται ἐν τῷ σώματι, subjungit ἡ δὲ χολὴ τὴν θερμὴν κατέχει τὸ σῶμα καὶ τὸ φθινόπωρον, & paulo infra, ἡ δὲ μέλαινα χολὴ τῷ φθινοπώρῃ πλείστη τὴ καὶ ἰσχυροτάτη ἐστίν, Lib. de natur. homin. Sect. 14. Edit. *Lindeni*. Ubi vero acris & biliosa colluvies exundat, aut per vomitum, aut per alvum, rectissime expurganda est; nam hujus præcipua sedes est in primis viis, visceribus abdominis, ac vasis *mesentericis*. Fateor equidem, quod & tota sanguinis massa hac quoque scatet sæpissime, sed ne sic quidem indicatur venæ sectio, quæ nimiam sanguinis

* Ideo *Hippocrat.* τὸ θέρους χολαποιοὺν vocat, Lib. de humoribus, Sect. 8. Edit. *Linden*.

nis quantitatem utique minuere potest, acrimoniam ejus corrigere non potest: Quod cum ita sit, detrahendo cum sanguine vires, non acrimoniam, officit. Ideoque *Hippocrates* * veteresque medici, ubi bilis abundat, acrimonia scilicet biliosa, sanguinis missionem prohibent: nec video ego utique, cui bono hoc in casu mittatur, nisi adsit *plethora* aut inflammatio vehemens: turpissimos sane errores atque immedicabiles hac in re vidi; imo & plus vice simplice perdolui.

Plena Luna 7. OCTOBRI. *Nova Luna* 22.

Altam tenuit stationem *Barometer* toto fere *Octobri*, flante sæpissime Borea, vel Coro; Libs tamen interdum, nonnunquam Euro-notus spiravit; *atmosphæra* fuit multo humidior, at plerumque satis tepida.

Pluvia 1—3. $\frac{n}{4}$. 10. 14. 16. $\frac{r}{26}$. $\frac{n}{27}$. 28. 29.
 $\frac{n}{31}$ Dig. Dec.
 31 = 1.596.

Levis procella 4. S W 4_x — 31. p. m. S. W 4_x
 Maximæ pruinae medio mense.

✂ Altitud. maxim. 6. 30,3. E N E 1. } media 29.9 $\frac{7}{30}$.
 — — minim. 29. 29,5. SWbW 3. }
 Dies frigid. 20. 54. E N E 1. } media 46 $\frac{4}{30}$.
 — tepid. 1. 38. W S W 1. }

Rheumatismus passim; febres putridæ frequentes, quibus haud raro, sub finem, accedit icterus — Coryzæ atque dentium dolores multos vexant, tussis sævæ plures — alvi fluxus creber adhuc, *dy-senteria* tamen rarior — *variola* jam derepente factæ sunt *epidemicæ*, eæque quidem male moratæ

Z 3

& sæpe

* Lib. de humoribus, ad finem.

& sæpe lethales; quippe quæ parvæ & nigrae, aut crudo prorsus diffuentes *ichore* ad finem usque; sæpe cum ipsis *variolis* erumpunt *petechiæ*, quod pessimum: interdum cutis sub vesiculis aquosis *necrosi* afficitur.

Plena Luna 6. NOVEMBRI. *Nova Luna* 21.

Densa fuit admodum ac humida *atmosphæra* hoc mense, quæ *Mercurium baroscopicum* in alto sustinuit loco, etsi multo rarior erat ab Oriente ventus quam *Octobri* elapso: Corus quidem aderat sæpe, sed & Libs haud raro — Ad ipsum finem, gravis ab Austro procella *Barometrum* deturbat maxime.

Pluvia $\overset{.}{1}$. 9 — 11. $\overset{.}{15}$. $\overset{.}{16}$. 17. 18. $\overset{.}{20}$. 22.

Dig. Dec.

23. 24. 27. $\overset{.}{29}$. $\overset{.}{30}$. Grando 16 = 2.078.

Procella 16 nocte — 20 p. m. S W 4 — 29. p. m. S S W 4^x.

Magna AB. 21 H. 9. p. m. N W 1^x.

☿ Altitud. maxim. 4. 30.3. N 1. } media 29.9.
— — minim. 30. 28.6. S W 3. }

Dies frigid. 25. 62. N b E 1. } media 50 $\frac{6}{8}$.
— tepid. 10. 42. SW b W 2^x. }

Variolæ adhuc *epidemicæ*. sed jam majore ex parte paulo mitiores, sæpissime tamen fluxus *salivæ* prælargus profluit, etiam in distinctis.

Diarrhæa serosa plures adhuc exercet — *Catarrhi* & *rheumatismi* plurimi, nec non tussis acerbæ — Morbi pulmonum acuti haud pauci.

Plena Luna 5. DECEMBRI. *Nova Luna* 20.

En tandem corruunt vapores, per *atmosphæram* congesti diu, delabente plurimum *Baroscopio*: per initia

initia mensis Vulturū perflavit, dein Libs furens, intercurrente subinde Cauro. — Duravit pluviosa hæc & misera tempestas ad XXI. usque; tunc venit ab Oriente ventus, qui ad Septentrionem vergens rigidam valde brumam intulit, & *Barometrum* erexit maxime.

Pluvia	$\frac{''' }{1.}$	$\frac{'' }{3.}$	$\frac{' }{4.}$	$\frac{''' }{5.}$	7.	8.	$\frac{''' }{9.}$	$\frac{'' }{10.}$	$\frac{''' }{11.}$	$\frac{'' }{12.}$	$\frac{'' }{13.}$
	Dig. Dec.										
	$\frac{'' }{14.}$	$\frac{' }{15.}$	$\frac{''' }{17.}$	$\frac{' }{18.}$	$\frac{' }{19.}$	20.	24.	Nix 2 = 6.566.			

Maxima diluvia medio mense. *Atmosphæra* fuit densissima & longe humidissima ante XXIV: crassissimæ & valde foetidæ nebulæ a XX. ad XXII.

Procella 2. E S E 4^x — 9 nocte S W 4 — 10 S W 4 — 11 vesperi & nocte S W 4^x — 14 W S W 4 . Amplissimus halo circa Lunam 3. Maxima lucida, ignea, punicea AB. 6. H. 8. N E 1^x .

§ Altitud. maxim. 31. 30, 5. (N E 2^x . } media 29.4 $\frac{2}{3}$.
 — — minim. 11. 28, 4. S W 4^x . }
 Dies frigid. 31. 73. N E 2^x . } media 56 $\frac{2}{3}$.
 — tepid. 5. 46. Malacia. }

Variolæ jam sunt magis benignæ, licet adhuc *epidemicæ*; atqui etiam in distinctis profusus est admodum salivæ cursus; porro frequenter etiam maculæ quædam rubræ sed coloris vividi, erumpentibus *variolis* intersunt, quæ brevi plerumque vanescunt.

Pleuritides & peripneumoniarum haud raræ, sæpe nothæ; tussis & *catarrhi* plurimi: alvi fluxus usque creberrimus — Vides sane, in omnibus fere morbis, colluviem serosam adhuc dominantem.

Dig. Dec.

Tota pluvia Anno MDCCXLVII = 32.246.

Plena Luna 4. JANUARIO. *Nova Luna* 19.

Præalta fuit hoc mense *Barometri* statio, ventus ut plurimum ab Oriente, multum per initia flectens ad Septentrionem; a XIX. autem plerumque ad Austrum, aër sæpe crassus erat, interdum nebulosus, semper frigidus. — Gelu valde rigidum ineunte anno.

Pluvia 5. 8. 9. 11. 14. 15. 17. 21. 23. 26.
Dig. Dec.
27. 28. 30. Nix 7. = 1.718.

Levis *AB.* 22. H. 9. p. m. N N W 1. *Procella* 27 nocte S E b S 4x.

Nebula densissima, ac foetida admodum, diu durans 31.

♀ Altitud. maxim. 1. 30,5. E N E 2. } media 29.9 $\frac{2}{3}$.
— — minim. 28. 29,3. S E b S 3x. }
Dies frigid. 2. 74. E N E 2. } media 62.
— tepid. 30. 53. S S E 2. }

Ut solet fere semper, sic quoque nunc, tusses movet Boreas & laterum dolores; * idque sane jam vehementer, pleuritides nempe, peripneumoniæ, atque tusses gravissimæ, modo sunt valde frequentes: multos porro premit asthma sævissimum & contumax; parce nimis plerumque in his morbis expuitur, quanquam distillationes profusæ, coryzæ **, anginæ mucosæ, raucedines atque faucium tumores per plurimos vexant; crasso nimirum ac perfrigido aëre cutis meatus occludente, unde serosa colluvies accumulatur. *Rheumatismi* plurimi. — *Variolæ* undique jam epidemicæ, nec profecto ita clementes.

Plena

* Vid. Lib. de Febr. Cap. I. de Pleuritide.

** — *Cels.* Lib. 4. C. 4.

Plena Luna 3. FEBRUARIO. *Nova Luna* 17.

Perfrigida jam regnat tempestas & ficca valde, Borea sæpissime perflante, hinc gelu asperrimum, & tenuis admodum aër, at pluviae parum; nix autem & grando nonnunquam: *Baroscopium* plerumque sublime.

Pluvia 21. $\frac{''}{23}$. $\frac{'}{28}$. Nix 16. 24. Grando 21.
Dig. Dec.

29. = 0.598.

Acre gelu 12. 15. 16. 19. 25. 26. Denfissimæ foetidæ nebulæ 9. 10. 12.

§ Altitud. maxim. 9. 30,3. N E, 1.	} media 29,8 $\frac{17}{8}$.
— — minim. 23. 29,2. S W 2.	
Dies frigidissim. 16. 77. N E b E 2 ^x .	} media 64 $\frac{12}{8}$.
— — tepid. 29. 58. W N W 2.	

Variolæ longe lateque sunt *epidemicæ*, passim funestæ, parvæ, atræ; jam nunc *salivatio* est parrior debito, ut ut nuperis mensibus perfusa nimis. — *Febriculæ catarrhales* valde frequentes, nec non tussés sævissimæ; gravissimi *asthmatis paroxysmi* & diu gravantes — Tempestas est *exitialis* admodum pulmonariis, moriuntur plurimi. *Pleuritides* & *peripneumoniæ* perplurimæ, crassa perquam ac glutinosa sunt sputamina sæpe, interdum tenuia valde, horum neutra facile ejiciuntur, licet tussis plus satis urget; imo rupto nonnunquam pulmone purus putus sanguis expuitur. Utcunque viscida nunc sunt in *peripneumonicis* sputa, cruorem extractum multo minus tenacem sæpe sæpius notavi. — Post *pleuritides* aliquando maxime pertinaces laterum dolores cruciant; qui multo melius emplastris *anodynis* aut *epispasticis* cedunt, quam sanguinis missioni, quantumcunque fuerat

fuerat necessaria morbi initio. *Odontalgiae* acerbissimæ & *rheumatismi* permultos laceffunt.

Plena Luna 4. MARTIO. *Nova Luna* 18.

Algida tempestas toto fere *Martio*, pluviae abundantes, procellæ interdum: medio mense autem gelu, nix, grando, ventus aquilonius, aër ficcus valde & frigidus; sub finem vero erat multo tepidior, ac humidior longe.

Pluvia $\frac{''' }{2.}$ $\frac{'' }{3.}$ $\frac{'' }{4.}$ $\frac{'' }{6.}$ $\frac{'' }{7.}$ $\frac{'' }{8.}$ $\frac{'' }{10.}$ $\frac{'' }{11.}$ $\frac{'' }{21.}$ $\frac{''' }{24.}$ $\frac{'' }{25.}$

$\frac{'' }{26.}$ $\frac{'' }{27.}$ $\frac{'' }{28.}$ $\frac{'' }{29.}$ $\frac{'' }{31.}$ Grando 8. 12. 15. Nix
Dig. Dec.

12. 13. 14. 18 = 4.280.

Procella 2. nocte W S W 4x — 25 a. m. S W
4 — 27 a primo mane ad H. 10. a. m. S W b W 4.

♀ Altitud. maxim. 20. 30, 1. N E 1. } media 29.7.
— — minim. 27. 29, 0. S W b W 4.

Dies frigid. 15. 73. E N E 2^x. } media 58 $\frac{2}{9}$.
— tepid. 29. 50. W S W 2.

Variolæ adhuc, sed multo pauciores, & minus periculosæ: pleuritides & peripneumonix frequentes; jam facilius expuitur, sæpe coctum, & aliquo sanguine tinctum, sæpe tamen perliquidum & acre. Tusses innumeræ & plerumque vehementes; Labe ideo pulmonum affectis tempestas est infensa maxime, & haud raro funesta: gravissimi *asthmatis paroxysmi* — *Rheumatismi* multi — Haud pauci *apoplexia* & *paralyfi* perculsi sunt; quod quidem per frigidas valde tempestates accidit frequenter*: notavit etiam magnus *Hippocrates* *paraplegias* fuisse *epidemicas* aspera durante hyeme

* Vid. quæ supra dixi mense *Martio*, 1747.

hyeme *, Lib. 1. epidem. Constit. 3. quod quoque memoravit Cole in Lib. de Apoplexia.

Plena Luna 2. APRILI. Nova Luna 16.

Ad decimum nonum Aprilis frigida fuit atmosphaera, flante ut plurimum vento Orientem inter & Arctum; gelu interdum, aliquando nix; post vicesimum Libs praevalebat subfidente Baroscopio.

Pluvia $\frac{''}{1}$. $\frac{'}{7}$. $\frac{'''}{10}$. $\frac{''}{12}$. $\frac{'}{17}$. $\frac{'}{19}$. $\frac{''}{20}$. $\frac{''}{25}$. 26. 27.

Dig. Dec.

$\frac{''}{28}$. $\frac{''}{29}$. $\frac{'}{30}$. Nix 1. 11. 15 = 3.080.

Haud leve gelu 18, maximæ sæpe hoc mense pruinae; nix super montes permanfit ad xxiv. usque.

Levis procella 11. nocte E b S 4x. — quam maximus halo subluteus, at vividus, circa Lunam 22. H. 10. S W 2.

☿ Altitud. maxim. 9. 30,2. N 1. } media 29.5 $\frac{27}{30}$.
— — minim. 28. 29,0. S W 3. }

Dies frigid. 3. 64. E b N 1. } media 50 $\frac{18}{30}$.
— tepid. 26. 40. S W b S. 2. }

Perpaucae jam *variolae*, at morbi adhuc pectoris acuti frequentes, sputa tamen largissima nunc ex facili prodeunt maximo cum levamine. Tussis humidæ, innumeræ, ac sæpe vehementes: tabidi plurimi occidunt, sævitia tussis, alvi fluxu, aut sudoribus penitus confecti. — Febres aliquæ putridæ, nec non intermittentes, sed rure potissimum. Multi *rheumatismo* cruciante diutissime torquentur; vix utique sine magno sanguinis dispendio

* Sic describitur χαμῶν βόρσος, αὐχμοί, ψυχρὰ πνεύματα, μεγάλαι χιόνες, περὶ δὲ ἰσημερίην χαμῶνες μέγιστοι. — παραπληγίαι πολλοῖσιν ἐγίνοντο, καὶ τίνες αὐτέων ἐθνήσκον διὰ ταχέων.

pendio levantur, qui profecto haud parum est viscidus. — Haud raro etiam ipsa venæ sectio ter, quaterve repetita, incassum tentatur, nec cedunt dolores acerbi nisi *deobstruentibus*, *diaphoreticis*, *purgantibus*, & *anodynis*, tandemque aliquando fugantur solum balneo frigido.

Cæterum hic annotabo obiter, quod, dum ab acri & serosa colluvie pendeat *rheumatismus*, multo magis obest, quam prodest, larga sanguinis extractio; id ipsum notante *Sydenhamo*: * in hoc etenim casu certe, quæ blande sudores movent, quæ acres edulcorant humores, eosque expurgant commode, interposito subinde papavereo doloris lenimine, longe feliciores edunt effectus — Usus sum profecto sequentibus, multos per annos satis feliciter.

Tertia, vel quarta, quaque nocte *Calomelan. Grana* aliquot cum *pilul. Mathæi*, seu *saponaceis* exhibeo, mane autem proximo *cathartica* leniora, omnia dein sub noctem compesco *anodynis* — est & etiam ubi per initia morbi vomitus excito.

Diebus attamen intermediis suadeo sequentia, aut his similia & Pulp. Prunor. dulc. Æthiop. minor. aa ʒvi. Gum. Guiac. ʒii. Cremor. Tartari. Nuc. Myristic. Pulv. a ʒiii. Syrup. Croci. q. s. m. f. Elect. cujus cap. Q. N. Moschat. seu Juglandis, bis saltem de die cum haustu largiore Aq. Calcis, in qua rasum Lignum *Guaiacum* & *Sassafras* sint infusæ; cui adjicio insuper Aq. *Absinth. C.* aliquid cum *Elix. paregoric.* & *Essent. Antimon.* aa ʒss, vel ʒi — (*Aquam Calcis* vero præparatam esse vellem *Testis Ostrear.* aut *Cochlear.* probe *calcinat.*) nam & magis dulcem hanc & magis efficacem judico — Victu interim ex media materia utendum est, pro
potu

* Epist. I. responsoria ad Doct. Brady.

potu autem fero lactis tenuissimo sinapi imbuto, infuso Lign. *Sassafr.* ex Aq. bulliente, aquis demum *Pyrmontanis*, *Spadanis*, aut *Scarburienf.* — Locis atqui pertinaciter dolentibus idonea admoveo fomenta, mox dein *vesicatoria*.

Sed quid ego hæc tanto molimine, cum quilibet *medicaster* triobolaris verbosis populo strophis* *antirheumatica* venditet, fallere nescia?

Plena Luna 2.

Nova Luna 16.

MAIO. *Plena Luna* 31.

Ineunte & exeunte: hoc mense pluvia haud parca, ventus australis, aërque crassus, medio autem tenuis valde; per totum equidem blanda fuit fatis tempestas: maximæ interdum rorationes.

Pluvia $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{5}$. 6. 7. $\frac{1}{10}$. 11. 22. 25. $\frac{1}{26}$. $\frac{1}{28}$.
Dig. Dec.
 $\frac{1}{29}$. 31 = 2.250,

☿ Altitud. maxim. 14. 30,2. N 1. } media 29.6 $\frac{2}{3}$.
— — minim. 2. 29,2. S S W 2. }
Dies frigid. 8. 44. W N W 2. } media 35.2 $\frac{5}{8}$.
— calid. 20. 28. N 1 $\frac{1}{2}$. }

Variolæ passim; pleuritis & peripneumonia frequens, *rheumatismi* levi cum febre, at sævo admodum dolore plures discruciant: non solum ipso initio venæ sectionem poscunt largiorem, sed & multa porro post *diluentia*, *cathartica antiphlogistica*, nec non *anodyna liberalia*, inter quæ commodissimum est *Elixir paregoricum*: quod & salubres movet sudores, lenitque dolorem, ex fero lactis tenuissimo datum: inservit hoc serum insuper utilissime pro potu communi; diuque haustum, ac
copio-

* Quorum stultitia quæstus impudentiæ est *Phædr.* L. 1. Fab. 14.

copiose, ipsum tandem solvit morbum, præcipue si *nitri* aliquid sit adjectum — Opportuna sane, & repetita sanguinis missio æque *rheumatismo* calido, in junioribus & robustis, medetur, ac ipsi pleuritidi.

Febres putridæ passim, vix jam video intermittentem. Tussis plurimæ, & coryzæ acres admodum cum tumore faucium, labiorum, oculorum, &c. adeo falsus destillat humor, qui non tantum vellicat, sed etiam, sit venia verbo, *vesicat* nares, atque in pulmonem irruens sævissimam excitat tussim, ipsamque *Tracheæ* membranam erodit: multi hinc *phthysici* certe ad plures abeunt.

Nova Luna 14. JUNIO. *Plena Luna* 29.

Incipiente *Junio* aër valde crassus, frigidus, & humidus; post diem decimum septimum vero fervida admodum & fuda tempestas.

Pluvia 1. 2. 4. — 6. 8. 10. 12. 14. 15. 29.
Dig. Dec.

= 1.102.

Dies fervidissim. 20. 21. 22. 24. 26. 27.

✕ Altitud. maxim. 17. 29,9. NNW 1. } media 29,6 $\frac{2}{3}$.
— — minim. 29. 29,3. S b E 2. }

Dies frigid. 4. 40. WNW 2. } media 28 $\frac{2}{3}$.
-- fervidiff. 27. 15. S b E 2 $\frac{1}{2}$. }

Variolæ sparsæ; aliquæ putridæ & lentæ febres. *Tabes pulmonaria* ubique frequens est, haud pauci pereunt — Vox rauca, tussis clangosa, sputa viridia, cœnosa, purulenta, graveolentia. dorsi dolor, ac debilitas, sudores profusi, atque alvi fluxus, subinde se excipientes, accedente crurum pedumque tumore, cum ingrato quodam in pectore sibilo, & spiritu difficili, haud dubia fuere immi-

imminentis lethi præfagia; rupta interdum in pulmone vomica.

Salubris aura ruris, equitatio quotidiana, bene curata e lacte diætâ, & potio lenis demulcens, *emulſio* ſcilicet *amygdalina* ex decocto *Rad. Eryng. condit.* & id genus alia, multo magis tabidis his proficere videntur, quam operoſa medicamento- rum farrago, quæ ſemper imbecillo ſtomacho nocet; *opiat*is autem idoneis compescenda eſt ſubinde tuſſis vehementia, ſiſtenda porro eſt alvus, ſi cita nimis, reprimendi etiam ſunt profuſi ſudores: cave autem ſemper, ex divini ſenis conſilio, ne noceas, ſi non poſſis opitulari. *

Nova Luna. 14. JULIO. *Plena Luna* 28.

Julii initio ficca fuit & calida tempeſtas, varia poſt, & multo frigidior, pluviæ frequentes, ventus inconfans, ab Austro sæpius; factus hinc aër eſt humidus atque craſſus: ſub finem apricitas, æſtusque haud levis, Corus mollis.

Pluvia 1. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 13 — 15. 19.

Dig. Dec.

23. 24. 25. 31 = 4. 134.

Fulgur, cum tonitru, graviffimum, ac immenſis pluviis 23. 24. 31. Procella 24. p. m. S W 4.

♀ Altitud. maxim. 28. 29,9. NW 1. } media 29,4 $\frac{28}{31}$.
— — minim. 24. 29,0.

Dies frigid. 25. 38. WSW 3^x. } media 29 $\frac{16}{31}$.
— fervid. 30. 16. NW 1. }

Variolæ paſſim, ut plurimum blandæ ſatis; quædam tamen furunculis, carbunculis, & diris ulceribus ſtipatæ. Febres aliquæ putridæ; colica bilioſa frequens.

Nova

* *Hippocr. Epidem. Lib. 1. Conſtitut. 2. ſub finem.*

Nova Luna 13. AUGUSTO. *Plena Luna* 27.

Haud parum torruit messes hoc mense canicula, maximæ tamen subinde rorationes, medio autem *Augusto* pluviae satis; aër inde crassus valde & humidus: a quarto ad decimum quartum ventus Subsolanus, ad finem dein usque varius.

Pluvia 2. 4. $\frac{1}{14}$. $\frac{1}{15}$. 16. $\frac{1}{17}$. 18—20. $\frac{1}{31}$.
Dig. Dec.

= 1.256.

Fulgura perplurima 12, gravis procella 15 E S E 4, sævum fulgur cum tonitru 31 ad Occidentem. Maxima AB. 28. H. 8. p. m. E N E 2, trabes rutilæ, vividæ, plurimæ, ab ipso horizonte, ad angulos pene rectos, per lucidissimam quasi iridem jaculatae sunt, more velut ex arcu sagittæ.

☿ Altitud. maxim. 7. 30,0. E 2. } media 29.6 $\frac{2}{27}$.
— — minim. 15. 29,2.

Dies frigid. 19. 36. W N W 1^x. } media 28 $\frac{2}{27}$.
— fervid. 5. 20. E b S 2.

Variolæ sparsæ, sed parum funestæ; his tamen exarescentibus furunculi plurimi, valde dolentes, tandemque suppurantes, sæpe sæpius erumpunt: *cholerae*, ac *dysenteriae* haud raræ, *ophthalmiæ* aliquæ, & faucium tumores.

Pleuriperipneumoniæ passim inter agricolas sæviunt, a frigida frequenter potione, ac aura, dum sudoribus inter opera diffuunt: grata sane utraque, sed periculosa valde: ratione adeo semper obsecundandum est naturæ incitamentis.

Nova Luna 11. SEPTEMBRI. *Plena Luna* 25.

Perficcus atque tepidus fuit hic mensis, *atmosphæra* tamen plerumque valde crassa, ventus inconstans, at lenis; Boreas per initia, ac sol fervidus, sub finem Libs: plurimus sæpissime ros.

Pluvia

Pluvia $\frac{''}{7}$. $\frac{'}{11}$. 12. 13. 16. 19. 20. 21. 24.
Dig. Dec.

27 — 29 = 0.914.

☿ Altitud. maxim. 3. 30, 1. ENE 1. } media 29, 7 $\frac{2}{9}$.
— — minim. 8. 29, 2. ESE 2^x. }

Dies frigid. 31. 44. SW 3. } media 34.
— calid. 1. 28. W.N.W. 1. }

Variolæ adhuc, ut plurimum benignæ, pustulis tamen ulcerosis, & furunculis usque stipatæ; sub morbi finem nempe; accedunt sæpe sævæ *ophthalmiæ*, ac cruciantes artuum dolores, nisi mature & probe purgantur. — *Diarrhææ* & *dysentericæ*, per plurimos exercent; raro tamen cruentus est alvi fluxus, nihilominus autem aliquando lethalis, obrepente singultu, & perpetua desidendi cupiditate; quod nihil levat æque ac clyster noster *anodynus**, qui, & *diarrhæam* quoque profusam, irritis aliis omnibus, sæpe felicissime sistit.

Nova Luna. 11. OCTOBRI. *Plena Luna* 25.

Sicca duravit tempestas, cum alta Barometri statione, ad diem usque decimum *Octobris*, adeo ut, per initia mensis, putei atque rivuli plures defecerint prorsus; post autem imbrica valde & multo gelidior: Aquilo prævaluit ad decimum octavum, inde vero Libs.

Pluvia $\frac{'}{10}$. $\frac{''}{11}$. $\frac{''}{12}$. 13 — 16. $\frac{''}{17}$. $\frac{'}{19}$. 20. $\frac{''}{21}$.

$\frac{''}{22}$. $\frac{''}{24}$. $\frac{''}{25}$ — $\frac{'}{26}$. $\frac{''}{27}$. $\frac{''}{28}$. $\frac{'}{29}$. $\frac{''}{30}$. Grando 10.

Dig. Dec.

Nix 11 = 3.696.

Gelu 3. 12. 13. Fulgur & tonitru 29. nocte:

Procella 30 nocte, ac mane 31 SW b W 4 —

Maximæ pruinae mensis initio.

☿ Alti-

* Vid. supra mens. April. 1743.

☿ Altitud. maxim. 2. 30,3. NE 1. } media 29.6 $\frac{2}{3}$.
 — — minim. 22. 28,7. SE b S 3. }

Dies frigid. 12. 61. N 1^x. } media 48 $\frac{6}{10}$.
 — tepid. 5. 34. N b W 1. }

Multæ hic *variolæ*, aliquibus in locis sunt *epidemicæ*; Morbus colicus creberrimus, plures jam a pomaceo novello. *Pleuriperipneumoniæ* passim, medio præsertim mense; Sanguis extractus autem haud valde densus est. — Dentium dolores, destillationes, tussis sævissimæ, per plurimæ; inter pueros ferina tussis grassatur — *Catarrhalis* quædam *febricula* porro frequens est admodum, cum magna pectoris oppressione, tussi humida permolesta, ventriculi dolore, ac cruciatibus *rheumaticis*; brevi tamen evanescit, accedente alvo cita, atque torminosa paululum.

Non tantum ab impedita *perspiratione* oriri videntur febres *catarrhales*, sed etiam ab ipso gelido *atmosphærae* vapore per varios corporis meatus irruente; humidis igitur, frigidisque temporibus, invadunt maxime; huic inesse porro salem quendam aëreum *, & acrem judico, qui fundit quodammodo sanguinem, vellicat nervorum propagines, totamque humorum massam conturbat. Neque enim aliter est facile dictu, unde tam subita sæpe subeat commotio hominibus, algido udoque aëri expositis, tam immensa destillatio humoris per nares, oculos fauces; adeo acris sæpe ut vel ipsam cutim erodat, ac tussis vehementes moveat & sternutamenta perpetua: Neque hæc in paucis duntaxat, sed & per innumeros undique simul, & semel, dispergitur morbus. Mihi igitur probabile videtur, quod, quo major sit aërei hujus salis copia per *atmosphæram* diffusa, eo acrior sæviat *catarrhus*; in quibusdam enim *febriculis catarrhalibus* longe magis

* Vid. Prolegom. Vol. I. de aëre & morb. epidemicis.

gis blanda est destillatio quam in aliis; plerumque vero pluviis, nivosis & frigidis, tempestatibus acerrima.

Sin autem his generatur acris, & serosa, in sanguine colluvies, multo melius discutitur sudoribus, & blandis *catarthicis*, quam prodiga sanguinis missione, quam vix sane deposcit unquam, nisi forsitan ipso initio, & ubi febris haud leviter ardet.

Nova Luna 9. NOVEMBRI. Plena Luna 23.

Pluviae perpaululum hoc mense, *Baroscopii* statio præalta, medio præsertim; ventus sæpissime ab Oriente, ad Septentrionem deflectens plerumque; aer fuit majore ex parte valde crassus; interdum vero tenuis admodum, ac frigidus, maximæ pruinae frequenter, gelu haud raro.

Pluvia 1. 15. 17. 18. 19. 20. 22. 24. 25. 29.

Dig. Dec.

30. Nix 21 = 0.906.

✕ Altitud. maxim. 14. 30,6. NE b E 1. } media 30,0 $\frac{3}{8}$.

— — minim. 2. 29,3. S W 2.

Dies frigidiss. 21. 68. NE 1^x. rigidum gelu. } media 54.

— — tepid. 2. 42.

Variolæ undique fere, fatis tamen clementes, scilicet distinctæ ut plurimum: peripneumoniæ & pleuritides passim. Tussés, *κοιζαί*, & leves anginae frequentes; febres aliquæ lentæ, & putridæ morbi colici, & *rheumatismi* plurimi.

Nova Luna 9. DECEMBRI. Plena Luna 23.

Tristissima jam ingruit tempestas, pluvia constans, Libs perpetuus fere, isque subinde procellosus admodum; hinc facta est *atmosphæra* longe humidissima; sub finem mensis diluvia maxima ubique: ne vel minimum gelu toto *Decembri*, sol rarissime.

Pluvia

Pluvia ^{'''}1. 2—4. 6. 8, 9. 10—14. 15. 16.

17. ^{''}18. [']19. [']20—21. [']23. ^{'''}24. ^{''}25. ^{'''}26. 27. 28.

^{'''}30. ^{''}31 = 6.746. Dig. Dec.

Procella 1. nocte W S W 4^x. — 14. nocte W S W 4 — gravissima 15 tota nocte S W 4^x, quæ porro duravit ad horam quartam pomeridianam diei 16, atque Mercurium barometricum quam maxime depressit, ad 28. 1. nempe, 16 H. 10. a. m. S W b S 4^x — 23 nocte SS W 4 — 24 mane S W 4^x — 25 S W 4 Ventus nimbosus omni nocte ab 8, ad 13, haud magnus tamen inde Barometri lapsus. — Iris lunaris perillustis 15 H. 10. p. m. W S W 3^x Fulgur & tonitru 16 mane. Magna AB. 4 H. 8. p. m. N W 2^x.

♀ Altitud. maxim. 7. 30,2. W N W 1. } media 29,4.
— — minim. 16. 28,1.

Dies frigid. 17. 60. W N W 2. } media 52⁴/₃₀.
— tepid. 3. 44. S W 3.

Variolæ adhuc passim, mites autem plerumque; in distinctis tamen, si paulo sint confertiores, & largissima profluunt sputamina, & copiosæ admodum & crassæ urinæ; quod faustum semper. Morbi colici perplurimi, ex pomacei novelli potu permulti: haud pauci & colica vehemente, & acerbissimo artuum dolore, anguntur, unde sæpe brachiorum *parefis*, & generalis membrorum debilitas, miseros * diu admodum trahit.

Tota pluvix quantitas, Anno MDCCXLVIII,
Dig. Dec.
= 30.680.

* De his, eorumque medicina, vid. Opuscul. nostr. de morbo colico, Vol. III.

